

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tablete

perindopril-tert-butilamin/indapamid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Co-Perineva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Co-Perinevu
3. Kako uzimati Co-Perinevu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Co-Perinevu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Co-Perineva i za što se koristi

Co-Perineva je fiksna kombinacija dviju djelatnih tvari: perindopril-tert-butilamina i indapamida. Ona je antihipertenziv i koristi se za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzija).

Perindopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori). Djeluju tako da proširuju krvne žile, što Vašem srcu olakšava pumpanje krvi kroz njih.

Indapamid je diuretik. Diuretici povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diureтика jer uzrokuje samo malo povećanje količine proizvedene mokraće.

Svaka od djelatnih tvari snižava krvni tlak, a djelujući zajedno kontroliraju Vaš krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Co-Perinevu

Nemojte uzimati Co-Perinevu

- ako ste alergični na perindopril ili bilo koji drugi ACE inhibitor, na indapamid ili bilo koji drugi sulfonamid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
- ako ste imali simptome poput piskanja pri disanju, oticanja lica ili jezika, intenzivan svrbež ili jak kožni osip uz prethodno liječenje ACE inhibitorima ili ako ste Vi ili član Vaše obitelji imali ove simptome u bilo kojim drugim okolnostima (stanje koje se naziva angioedem),
- ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka koji sadrži aliskiren,
- ako imate tešku bolest jetre ili bolujete od stanja koje se zove hepatička encefalopatija (degenerativna bolest mozga),
- ako imate tešku bolest bubrega, kada je smanjena njihova opskrba krvlju (stenoza bubrežne arterije),
- ako primate dijalizu ili bilo kakvu drugu vrstu filtracije krvi. Ovisno o aparatu koji se koristi, ovaj lijek možda nije prikladan za Vas.
- ako imate nisku razinu kalija u krvi,

- ako postoji sumnja da imate neliječeno dekompenzirano zatajenje srca (jako zadržavanje vode, otežano disanje),
- ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati ovaj lijek u ranoj trudnoći, vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“),
- ako ste uzimali ili trenutno uzimate sakubitril/valsartan, lijek koji se koristi za liječenje dugoročnog (kroničnog) zatajivanja srca u odraslih, jer je u tom slučaju povećan rizik od angioedema (naglo oticanje potkožnog tkiva na području kao što je vrat).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Co-Perinevu:

- ako imate stenozu aorte (suženje glavne krvne žile koja izlazi iz srca) ili hipertrofičnu kardiomiopatiju (bolest srčanog mišića) ili stenozu bubrežne arterije (suženje arterije koja opskrbljuje bubreg krvlju),
- ako imate zatajenje srca ili bilo koje druge probleme sa srcem,
- ako imate poteškoće s bubrežima ili ako idete na dijalizu,
- ako imate poremećaje mišića, uključujući bolove u mišićima, osjetljivost, slabost ili grčeve
- ako imate povišenu razinu hormona aldosterona u krvi (primarni aldosteronizam),
- ako imate probleme s jetrom,
- ako imate kolagensku bolest (kožna bolest) kao što je sistemski lupus eritematosus ili sklerodermiju,
- ako imate aterosklerozu (otvrđivanje arterija),
- ako imate hiperparatiroidizam (previše aktivne paratiroidne žlijezde),
- ako imate giht (ulog),
- ako imate šećernu bolest (dijabetes),
- ako ste na dijeti s ograničenim unosom soli ili koristite nadomjeske soli koje sadrže kalij,
- ako uzimate litij, lijekove koji štene kalij (spironolakton, triamteren) ili dodatke kalija budući da se njihova primjena s lijekom Co-Perineva treba izbjegavati (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Co-Perineva“),
- ako ste stariji,
- ako ste imali reakcije osjetljivosti na svjetlo,
- ako imate ozbiljnu alergijsku reakciju s oticanjem lica, usana, usta, jezika ili grla koji može uzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju (angioedema). To se može pojaviti bilo kada tijekom liječenja. Ako dobijete te simptome prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite svog liječnika.
- ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka:
 - blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću,
 - aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Co-Perinevu“.

- ako ste pripadnik crne rase možete imati veći rizik za nastanak angioedema i ovaj lijek može biti manje učinkovit u smanjenju Vašeg krvnog tlaka nego u pripadnika drugih rasa,
- ako idete na hemodializu koja koristi visokopropusne membrane,
- ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, rizik od angioedema može biti povećan:
 - racekadotril, koji se koristi za liječenje proljeva,
 - lijekove koji se koriste za sprječavanje odbacivanja presađenih organa i za liječenje raka (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus i ostali lijekovi koji pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju inhibitori mTOR-a),
 - sakubitril (dostupan u fiksnoj kombinaciji s valsartanom), koji se koristi za liječenje dugotrajnog zatajenja srca,
 - linagliptin, saksagliptin, sitagliptin, vildagliptin i druge lijekove koji pripadaju skupini koja se naziva gliptini (za liječenje šećerne bolesti).

Angioedem

Angioedem (teška alergijska reakcija s oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa smetnjama pri gutanju ili disanju) je zabilježen u bolesnika liječenih ACE inhibitorima, uključujući Co-Perinevu. Može se pojaviti bilo kada tijekom liječenja. Ako razvijete takve simptome, trebate odmah prestati uzimati ovaj lijek i odmah se javiti liječniku. Pogledajte također dio 4.

Obavezno recite svom liječniku ako mislite da ste trudni ili biste mogli biti trudni. Co-Perineva se ne preporučuje u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca, jer može ozbiljno našteti Vašem djetetu ako se primjenjuje u tom stadiju trudnoće (vidjeti dio „Trudnoća i dojenje“).

Kada uzimate ovaj lijek, obavezno o tome obavijestite svog liječnika ili medicinsko osoblje:

- ako ćete biti podvrgnuti anesteziji i/ili kirurškom zahvatu,
- ako ste nedavno imali proljev ili povraćali ili ste dehidrirani,
- ako ćete biti podvrgnuti dijalizi ili LDL aferezi (uklanjanje kolesterola iz Vaše krvi pomoću uređaja),
- ako ćete biti podvrgnuti desenzibilizacijskom tretmanu radi smanjivanja učinaka alergije na ubod pčele ili ose,
- ako ćete biti podvrgnuti medicinskoj pretrazi koja zahtijeva primjenu injekcije kontrastnog sredstva koje sadrži jod (tvar koja omogućava da organi poput bubrega ili želuca budu vidljivi na rendgenu),
- ako primijetite slabljenje vida ili osjetite bol u očima. To mogu biti simptomi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili povećanja tlaka u oku, a mogu nastupiti u roku od nekoliko sati do tjedana nakon uzimanja Co-Perineve. Ako se ne liječi, to može dovesti do trajnog gubitka vida. Ako ste ranije imali alergiju na penicilin ili sulfonamid možete biti izloženi većem riziku razvoja toga stanja. Morate prekinuti liječenje Co-Perinevom i potražiti liječničku pomoć.

Sportaši trebaju imati na umu da ovaj lijek sadrži djelatnu tvar (indapamid) koja može dati pozitivnu reakciju na doping testu.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek se ne smije davati djeci i adolescentima.

Drugi lijekovi i Co-Perineva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trebate izbjegavati primjenu lijeka Co-Perineva s:

- litijem (koristi se za liječenje manije ili depresije),
- aliskirenom (lijek za liječenje visokog krvnog tlaka) čak i ako nemate šećernu bolest ili poteškoće s bubrežima,
- diureticima koji štede kalij (npr. triamteren, amilorid), solima koje sadržavaju kalij i drugim lijekovima koji mogu povisiti razinu kalija u Vašoj krvi (poput heparina, lijeka koji se koristi za razrjeđivanje krvi; trimetoprima i kotrimoksazola koji je također poznat kao trimetoprim/sulfametoksazol za liječenje infekcija uzrokovanih bakterijama),
- drugim lijekovima koji se koriste za liječenje visokog krvnog tlaka: inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima i blokatori angiotenzinskih receptora,
- estramustinom (koristi se u liječenju raka).

Na liječenje Co-Perinevom mogu utjecati drugi lijekovi. Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza. Obavezno obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova, jer to može zahtijevati posebnu skrb:

- drugi lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka, uključujući neke blokatore angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod naslovima „Nemojte uzimati Co-Perinevu“ i „Upozorenja i mjere opreza“) ili diuretici (lijekovi koji povećavaju količinu mokraće koju proizvode bubrezi),

- lijekovi koji štede kalij, a koji se koriste u liječenju zatajenja srca: eplerenon i spironolakton pri dozama između 12,5 mg i 50 mg na dan,
- sakubitril/valsartan (koristi se za liječenje dugoročnog zatajivanja srca),
- lijekovi koji se najčešće primjenjuju u liječenju proljeva (racekadolir) ili za sprječavanje odbacivanja presađenih organa (sirolimus, everolimus, temsirolimus i drugi lijekovi koji pripadaju skupini koja se naziva inhibitori mTOR-a). Vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“.
- prokainamid (za liječenje nepravilnosti otkucaja srca),
- anestetici,
- jodirana kontrastna sredstva,
- antibiotici koji se koriste u liječenju bakterijskih infekcija (npr. moksifloksacin, sparfloksacin, eritromicin u obliku injekcija),
- metadon (koristi se u liječenju ovisnosti),
- allopurinol (za liječenje gihta (uloga)),
- antihistaminici koji se koriste u liječenju alergijskih reakcija poput peludne groznice (npr. mizolastin, terfenadin, astemizol),
- kortikosteroidi koji se primjenjuju u liječenju različitih stanja uključujući tešku astmu i reumatoидni artritis,
- imunosupresivi koji se primjenjuju u liječenju autoimunih poremećaja ili nakon transplantacije kako bi se sprječilo odbacivanja organa (npr. ciklosporin, takrolimus),
- halofantrin (koristi se za liječenje određenih vrsta malarije),
- pentamidin (koristi se za liječenje upale pluća),
- zlato koje se daje u obliku injekcije (koristi se u liječenju reumatoidnog poliartritisa),
- vinkamin (koristi se u liječenju kongenitivnih poremećaja u starijih osoba, uključujući gubitak paméjenja),
- bepridil (koristi se za liječenje angine pektoris),
- lijekovi za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. kinidin, hidrokinidin, disopiramid, amiodaron, sotalol, ibutilid, dofetilid, digitalis, bretilij),
- cisaprid ili difemanil (koriste se za liječenje probavnih smetnji),
- digoksin ili drugi srčani glikozidi (za liječenje srčanih problema),
- baklofen (za liječenje ukočenosti mišića koja se javlja u bolestima poput multiple skleroze),
- lijekovi koji se koriste za liječenje šećerne bolesti (dijabetesa) kao što su inzulin, metformin ili gliptini,
- kalcij, uključujući dodatke kalcija,
- stimulirajući laksativi (npr. sena),
- nesteroidni protuupalni lijekovi (npr. ibuprofen) ili visoke doze salicilata (npr. acetilsalicilatna kiselina - prisutna u mnogim lijekovima koji se koriste za ublažavanje bolova i snižavanje vrućice, kao i za sprečavanje zgrušavanja krvi),
- amfotericin B koji se daje injekcijom (za liječenje teških gljivičnih bolesti),
- lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja poput depresije, tjeskobe, shizofrenije (npr. triciklički antidepresivi i neuroleptici (kao što su amisulprid, sulpirid, sultoprid, tiaprid, haloperidol, droperidol),
- tetrakozaktid (za liječenje Crohnove bolesti),
- trimetoprim (za liječenje infekcija),
- vazodilatatori uključujući nitrate (lijekovi koji šire krvne žile),
- lijekovi koji se koriste za liječenje niskog krvnog tlaka, šoka ili astme (primjerice efedrin, noradrenalin ili adrenalin).

Co-Perineva s hranom, pićem i alkoholom

Preporučuje se uzeti lijek prije obroka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Morate obavijestiti svog liječnika ako mislite da ste trudni ili da biste mogli postati trudni.

Liječnik će Vam u pravilu savjetovati da prestanete uzimati ovaj lijek prije nego što zatrudnите ili čim sazname da ste trudni te će Vam savjetovati da uzmete drugi lijek umjesto Co-Perineve.

Ovaj lijek ne preporučuje se u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni više od 3 mjeseca jer može prouzročiti ozbiljna oštećenja u Vašeg djeteta ako se primjenjuje nakon trećeg mjeseca trudnoće.

Dojenje

Ne preporučuje se uzimanje ovog lijeka ako dojite. Odmah obavijestite liječnika ako dojite ili planirate dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek obično ne utječe na pozornost, međutim različite reakcije poput omaglice ili slabosti, povezane sa sniženjem krvnog tlaka mogu se javiti u određenih bolesnika. Ako do toga dođe, Vaša sposobnost upravljanja vozilima i strojevima može biti oslabljena.

Co-Perineva sadrži laktozu i natrij

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tabletu, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Co-Perinevu

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno. Vaš liječnik može odlučiti povisiti dozu na dvije tablete ili prilagoditi doziranje lijeka ako imate oštećenje bubrega.

Uzmite tabletu ujutro prije obroka. Progutajte tabletu s čašom vode.

Ako uzmete više Co-Perineve nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, odmah se javite svom liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice. Najvjerojatniji učinak u slučaju predoziranja je nizak krvni tlak. Ako dođe do značajnog pada krvnog tlaka (povezano s mučninom, povraćanjem, grčevima, omaglicom, pospanošću, zbunjenošću, promjenama u količini mokraće koju proizvedu bubrezi), može pomoći postavljanje u ležeći položaj s podignutim nogama.

Ako ste zaboravili uzeti Co-Perinevu

Važno je da svoj lijek uzimate svaki dan jer je redovito liječenje učinkovitije. Međutim, ako zaboravite uzeti jednu dozu lijeka, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Co-Perinevu

Budući da liječenje visokog krvnog tlaka obično traje cijeli život, obavezno se savjetujte s liječnikom prije prestanka uzimanja ovog lijeka.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i obratite se odmah svom liječniku ako se kod Vas pojave sljedeće nuspojave koje mogu biti ozbiljne:

- teška omaglica ili nesvjestica kao posljedica niskog krvnog tlaka (često - može se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- bronhospazam (stezanje u prsimu, piskanje pri disanju i kratkoća daha (manje često - može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
- oticanje lica, usnica, usta, jezika ili grla, otežano disanje (angioedem) (vidjeti dio 2. „Upozorenja i mjere opreza“) (manje često - može se javiti u manje od 1 na 100 osoba)
- teške kožne reakcije, uključujući multiformni eritem (kožni osip koji obično počinje s crvenim mrljama na licu, rukama ili nogama koji jako svrbe) ili intenzivni kožni osip, koprivnjača, crvenilo kože po cijelom tijelu, jak svrbež, pojave mjeđura, ljuštenje i oteklinu kože, upala sluznice (Stevens-Johnsonov sindrom) ili druge alergijske reakcije (vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
- srčani poremećaji (nepravilan rad srca, angina pektoris (bolovi u prsimu, vilici i leđima koji se javljaju pri fizičkom naporu), infarkt) (vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
- slabost u rukama i nogama ili poteškoće s govorom koji mogu biti znak moždanog udara (vrlo rijetko - može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
- upala gušterice što može uzrokovati jaku bol u trbuhi i leđima povezano sa općim lošim osjećajem (vrlo rijetko - mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
- žutilo kože ili očiju (žutica) koji može biti znak hepatitisa (vrlo rijetko - mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)
- nepravilan rad srca koji je životno ugrožavajući (nepoznato - učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
- bolest mozga uzrokovana bolešću jetre (hepatička encefalopatija) (nepoznato - učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)
- slabost u mišićima, grčevi, osjetljivosti ili bol, osobito ako pritom osjećate slabost ili imate povišenu temperaturu, moguće je da je uzrokovano neuobičajenim oštećenjem mišića (nepoznato - učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Prema padajućem redoslijedu učestalosti, nuspojave mogu uključivati:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- kožne reakcije preosjetljivosti u osoba predisponiranih za alergijske i astmatične reakcije
- glavobolja, omaglica, vrtoglavica, osjećaj trnjenja, bockanja
- poremećaji vida
- zujanje u ušima (tinnitus)
- kašalj, kratkoća daha (dispneja)
- mučnina, povraćanje, bolovi u trbuhi, poremećaj okusa, loša probava, proljev, zatvor
- alergijske reakcije poput kožnog osipa i svrbeža
- grčevi mišića
- osjećaj kroničnog umora
- niska razina kalija u krvi

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- promjene raspoloženja, poremećaji spavanja
- depresija
- koprivnjača (urtikarija)
- crvene točkice na koži (purpura)
- nakupina mjeđurića na koži (pemfigoid)
- problemi s bubrezima
- impotencija (nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije)
- prekomjerno znojenje
- prekomjeren broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica)
- promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina kalija u krvi koja se vraća u normalu nakon prekida liječenja, niska razina natrija u krvi koja može dovesti do dehidracije i niskog krvnog tlaka
- jaka pospanost
- nesvjestica
- palpitacije (osjećaj lupanja srca)

- tahikardija (ubrzani rad srca)
- hipoglikemija (vrlo niska razina šećera u krvi) u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti
- vaskulitis (upala krvnih žila)
- suhoća usta
- pojačana osjetljivost kože na sunce
- artralgija (bolovi u zglobovima)
- mijalgija (bolovi u mišićima)
- bol u prsima
- malaksalost
- oticanje ruku i nogu
- vrućica
- povišena razina ureje u krvi, povišena razina kreatinina u krvi
- padovi

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- pogoršanje psorijaze
- promjene u laboratorijskim nalazima: povišena razina jetrenih enzima, povišena razina bilirubina u serumu, niska razina klorida u krvi, niska razina magnezija u krvi
- umor
- smanjena količina mokraće ili prestanak mokrenja
- navale crvenila
- akutno zatajenje bubrega
- tamna mokraća, mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, smetenost i napadaji. To mogu biti simptomi stanja koje se naziva neodgovarajuće izlučivanje antidiuretskog hormona (SIADH).

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- smetenost
- eozinofilna pneumonija (rijetka vrsta upale pluća)
- začepljenje ili curenje iz nosa (rinitis)
- promjene u krvnim pretragama kao što je mali broj bijelih i crvenih krvnih stanica, niska vrijednost hemoglobina, mali broj trombocita, povišena razina kalcija u krvi
- poremećena funkcija jetre
- anemija uzrokovana malim brojem crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)
- anemija uzrokovana malim brojem crvenih i bijelih krvnih stanica i trombocita (aplastična anemija).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- promjene u EKG-u
- promjene u laboratorijskim nalazima: visoka razina mokraćne kiseline i visoka razina šećera u krvi
- kratkovidnost (miopija), zamagljen vid, oštećenje vida, oslabljen vid ili bol u očima zbog visokog tlaka (mogući znakovi nakupljanja tekućine u sloju oka u kojem su smještene krvne žile (efuzija žilnice) ili akutnog glaukoma zatvorenog kuta)
- promjena boje, utrnulost i bol u prstima ruku ili nogu (Raynaudov fenomen)
- ako bolujete od sistemskog lupusa eritematozusa (vrsta bolesti kolagena), Vaše se stanje može pogoršati.

Mogu se javiti poremećaji krvi, funkcije bubrega, jetre ili gušterače, a rezultati pretraga krvi mogu biti promijenjeni. Vaš liječnik možda će Vas uputiti na ispitivanje krvi kako bi kontrolirao Vaše stanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Co-Perinevu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Co-Perineva sadrži

- Djelatne tvari su perindopril-tert-butilamin i indapamid.
Jedna Co-Perineva 2 mg/0,625 mg tableta sadrži 2 mg perindopril-tert-butilamina i 0,625 mg indapamida.
- Drugi sastojci su kalcijev klorid heksahidrat, laktosa hidrat, krospovidon, mikrokristalična celuloza, natrijev hidrogenkarbonat, koloidni bezvodni silicijev dioksid i magnezijev stearat.
Vidjeti dio 2. „Co-Perineva sadrži laktuzu i natrij“.

Kako Co-Perineva izgleda i sadržaj pakiranja

2 mg/0,625 mg tablete su bijele do gotovo bijele boje, okrugle, blago bikonveksne, s ukošenim rubovima i s urezanom kratkom crtom na jednoj strani.

Co-Perineva tablete su dostupne u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 30 ili 60 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođači

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2022.