

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Damklin 100 mg vagitoriji klindamicin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je lijek Damklin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Damklin
3. Kako primjenjivati lijek Damklin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Damklin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je lijek Damklin i za što se koristi

Lijek Damklin su polučvrsti vagitoriji koji sadrže djelatnu tvar klindamicinfosfat. Ovaj lijek pripada skupini lijekova koji se nazivaju antibiotici. Lijek Damklin se koristi u liječenju bakterijskih infekcija rodnice, koje se zovu bakterijske vaginoze.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Damklin

Nemojte primjenjivati lijek Damklin

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako ste alergični na antibiotik koji se zove linkomicin.
- ako ste prije imali upalu debelog cijeva (kolitis) prilikom uzimanja antibiotika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite lijek Damklin.

- ako imate proljev ili obično dobijete proljev kada uzimate antibiotike.
- ako ste imali upalne bolesti crijeva kao što je Crohnova bolest ili ulcerozni kolitis.

Ukoliko tijekom ili nakon primjene lijeka Damklin razvijete teški, dugotrajni ili krvavi proljev, odmah se posavjetujte s liječnikom jer će možda biti potrebno prekinuti liječenje. Ovo može biti znak upale crijeva (pseudomembranozni kolitis) koja se može pojaviti tijekom liječenja antibioticima.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom možete li koristiti ovaj lijek:

- ako imate problema s bubrezima, jetrom ili imunološkim sustavom.
- ako ste mlađi od 16 godina ili stariji od 65 godina.

Lijek Damklin se ne preporučuje koristiti u djevojaka mlađih od 16 godina.

| |
|--------------------|
| H A L M E D |
| 06 - 05 - 2024 |
| ODOBRENO |

Kao i kod svih vaginalnih infekcija, ne preporučuje se spolni odnos tijekom liječenja lijekom Damklin. Lijek Damklin može oslabiti djelovanje kondoma i vaginalnih (kontracepcijskih) dijafragmi. Nemojte se oslanjati na djelotvornost kondoma ili kontracepcijske dijafragme tijekom 72 sata nakon primjene lijeka Damklin. Ne preporučuje se upotreba drugih proizvoda namijenjenih za vaginalnu primjenu, kao što su tamponi ili otopine za ispiranje rodnice, tijekom liječenja vagitorijima.

Drugi lijekovi i lijek Damklin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebno obavijestite svog liječnika ako uzimate:

- lijekove za opuštanje mišića jer lijek Damklin može pojačati djelovanje takvih lijekova.
- varfarin ili slične lijekove – koji se koriste za razrjeđivanje krvi. Kod Vas postoji veća opasnost da dođe do krvarenja. Vaš liječnik može provoditi redovite krvne pretrage da provjeri kako Vam se zgrušava krv.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Primjena lijeka Damklin u prva tri mjeseca trudnoće se ne preporučuje jer nema dovoljno dokaza o sigurnosti primjene.

Ako ste trudni, lijek Damklin smijete koristiti samo nakon pažljivog razgovora sa svojim liječnikom koji će odlučiti je li ovaj lijek prikladan za Vas.

Ako dojite, Vaš liječnik će odlučiti je li lijek Damklin prikladan za Vas budući da djelatna tvar može prijeći u majčino mlijeko.

Iako nije vjerojatno da će dojenče putem majčinog mlijeka unijeti veliku količinu djelatne tvari lijeka, ukoliko primijetite kod Vašeg djeteta krvavi proljev ili bilo koji znak bolesti, odmah obavijestite svojeg liječnika. U tom slučaju trebali biste prestati dojiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će ovaj lijek utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

3. Kako primjenjivati lijek Damklin

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nemojte koristiti ovaj lijek ako je strip s vagitorijima oštećen, otvoren ili nepotpuno zatvoren. Treba paziti da se vagitoriji ne izlažu toplini jer bi ih toplina mogla omekšati i deformirati.

Preporučena doza ovog lijeka je jedan vagitorij koji treba staviti duboko u rodnicu, neposredno prije spavanja tijekom tri uzastopne večeri. Nakon umetanja vagitorij će se otopiti.

Stavljanje vagitorija:

- Izvadite vagitorij iz stripa.
- Lezite na leđa i privucite koljena prema prsima.

- Stavite vagitorij u rodnicu vrhom trećeg (srednjeg) prsta što je moguće dublje, bez izazivanja nelagode.

Uvijek operite ruke prije i poslije stavljanja vagitorija.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako primijenite više lijeka Damklin nego što ste trebali

Obavijestite o tome svog liječnika. Nemojte više koristiti vagitorij dok Vam liječnik to ne kaže.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Damklin

Ako je od propuštanja primjene vagitorija prošlo samo nekoliko sati, odmah ga primijenite. Međutim, ako se približilo vrijeme za primjenu sljedećeg vagitorija, nemojte uzimati propušteni vagitorij, već nastavite s primjenom lijeka u uobičajeno vrijeme.

Ukoliko progutate lijek Damklin

Ako se vagitorij pojede ili proguta, obratite se svom liječniku. Vagitorij vjerojatno neće uzrokovati nikakvu štetu, ali liječnik će Vam moći dati savjet o tome što trebate učiniti.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika:

- ako dobijete teški, dugotrajni ili krvavi proljev (koji može biti povezan s boli u trbuhu ili povišenom tjelesnom temperaturom). Ovo je manje česta nuspojava koja se može pojaviti nakon liječenja antibioticima i može biti znak ozbiljne upale crijeva ili upale sluznice debelog crijeva (pseudomembranozni kolitis).
- ako dobijete vrlo jaku alergijsku ili kožnu reakciju. Ovo su vrlo rijetke nuspojave.

Česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

- gljivične infekcije, infekcije kvasnicom (kandidom);
- glavobolja;
- bol u trbuhu, proljev, mučnina;
- svrbež;
- gljivična infekcija stidnice i rodnice (kandidijaza), bol stidnice i rodnice, poremećaj stidnice i rodnice.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

- povraćanje;
- osip;
- bol u leđima;
- zimica, mučnina;
- gnojna upala bubrega, bolno mokrenje, infekcija rodnice, iscjedak iz rodnice, poremećaji mjesečnice;
- bol, povišena tjelesna temperatura;
- na mjestu primjene lijeka: bol, svrbež, oticanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).*
Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Damklin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što lijek Damklin sadrži

- Djelatna tvar je klindamicinfosfat. Jedan vagitorij sadrži 100 mg klindamicina, u obliku klindamicinfosfata.
- Drugi sastojak je: čvrsta mast.

Kako lijek Damklin izgleda i sadržaj pakiranja

Vagitoriji su gotovo bijele do žućkaste boje, duljine 21,2 mm i širine 13,1 mm. PVC-PE strip pakiranje koje sadrži 3 vagitorija, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Makpharm d.o.o.
Trnjanska cesta 37/1
10000 Zagreb
Hrvatska

Proizvođač:

Help S.A.
Pedini Ioanninon
Ioannina 455 00
Grčka

Qualimetrix S.A.
579 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi
Atena 15343
Grčka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2024.

| |
|-----------------------|
| H A L M E D |
| 06 - 05 - 2024 |
| ODOBRENO |

H A L M E D
06 - 05 - 2024
ODOBRENO