

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Diuver 5 mg tablete Diuver 10 mg tablete

torasemid

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Diuver i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Diuver
3. Kako uzimati Diuver
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Diuver
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Diuver i za što se koristi

Djelatna tvar Diuver tableta je torasemid. Pripada skupini lijekova pod nazivom „diuretici“ koji povećavaju izlučivanje mokraće iz organizma („lijekovi za mokrenje“).

Diuver 5 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije).

Diuver 5 mg i 10 mg tablete upotrebljavaju se za liječenje prekomjernog nakupljanja tekućine u organizmu (edema).

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Diuver

##### Nemojte uzimati Diuver

- ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste alergični (preosjetljivi) na slične lijekove pod nazivom „sulfonilureje“ koji se koriste za liječenje dijabetesa (visoka razina šećera u krvi). Ti lijekovi uključuju klorpropamid, glibenklamid, glipizid i tolbutamid
- ako imate tegobe s bubrezima (zatajenje bubrega s izrazito smanjenim mokrenjem (anurija))
- ako imate bolest jetre
- ako imate smanjen volumen krvi u krvotoku (hipovolemija)
- ako imate nizak krvni tlak (hipotenzija).

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Diuver:

- ako imate niske razine kalija ili natrija u krvi
- ako imate smetnje mokrenja
- ako ste dehidrirani
- ako imate smanjenu funkciju bubrega
- ako imate nepravilan srčani ritam.
- ako imate šećernu bolest (dijabetes)

- ako imate cirozu jetre ili tekućinu u abdomenu (ascites).

### **Djeca i adolescenti**

Diuver ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina.

### **Drugi lijekovi i Diuver**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Diuver tablete mogu utjecati na učinak nekih lijekova, a isto tako neki lijekovi mogu utjecati na učinak Diuver tableta.

Diuver tablete mogu stupiti u interakcije sa slijedećim lijekovima:

- probenecidom (za liječenje gihta)
- salicilatima (za liječenje temperature i bolova)
- lijekovima koji se koriste za razrjeđivanje krvi kumarinskog tipa (npr. varfarin)
- za liječenje bolesti srca kao npr. glikozidi digitalisa i ACE inhibitori
- antidijabeticima za liječenje šećerne bolesti (dijabetesa)
- kolestiraminom (za liječenje povišenih masnoća)
- antibakterijskim lijekovima kao što su gentamicin, tobramicin i cefalosporini (za liječenje bakterijskih infekcija)
- nesteroidnim protuupalnim antireumaticima (za liječenje boli, temperature i upale)
- cisplatinom (citostatik)
- litijem (za liječenje psihičkih poremećaja)
- laksativima (za liječenje zatvora)
- glukokortikoidima i mineralokortikoidima
- teofilinom (za npr. astmu).

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Diuver tablete se smiju upotrebljavati samo u slučajevima kad potencijalna dobit premašuje postojeći rizik.

Nije poznato prelazi li Diuver u majčino mlijeko. Stoga se prije upotrebe tijekom dojenja posavjetujte s liječnikom.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Diuver može oslabiti sposobnost reagiranja. To prije svega vrijedi na početku liječenja ili kada se liječenje promijeni.

### **Diuver sadrži laktozu**

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

### **Natrij**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

## **3. Kako uzimati Diuver**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

*Odrasli i djeca starija od 12 godina*

Liječenje hipertenzije (visoki tlak): Preporučena doza je 2,5 mg (1/2 tablete od 5 mg) torasemida jednom dnevno. Prema potrebi doza se može povećati do 5 mg jednom dnevno. Lijek postiže najveći učinak nakon otprilike 12 tjedana kontinuiranog liječenja.

Edemi: Uobičajena doza je 5 mg jednom dnevno. Ako je potrebno, doza se postupno može povećavati do 20 mg jednom dnevno. Maksimalna doza u pojedinačnim slučajevima može iznositi do 40 mg torasemida na dan.

#### *Starije osobe*

Nije potrebno prilagođavanje doze.

#### **Primjena u djece**

Diuver tablete ne smiju uzimati djeca mlađa od 12 godina.

#### *Oslabljena funkcija jetre i bubrega*

Postoje ograničeni podaci o doziranju kod bolesnika s oslabljenom funkcijom jetre i bubrega. Potreban je oprez kod bolesnika s oštećenom jetrom, zbog mogućnosti od povećanja koncentracija lijeka u krvi.

#### Način primjene

Tablete trebete uzimati ujutro, bez žvakanja s malom količinom vode.

Diuver tablete se uobičajeno koriste u dugotrajnom liječenju sve do nestanka edema.

5 mg i 10 mg tablete se mogu razdijeliti na jednake doze.

#### **Ako uzmete više lijeka Diuver nego što ste trebali**

Previše tableta odjedanput može vam naškoditi. U slučaju predoziranja odmah se javite svom liječniku kako bi mogao poduzeti odgovarajuće mjere.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Diuver**

Ako ste zaboravili uzeti dozu Diuver tableta uzmite je čim se sjetite. Međutim ako je prošlo dosta vremena i blizu je vrijeme za sljedeću dozu, propuštenu dozu ne uzimajte, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4.    Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Ako primijetite bilo koju navedenu nuspojavu ili neku drugu nuspojavu koja nije ovdje navedena odmah se obratite svom liječniku.

Prestanite uzimati Diuver i odmah se obratite svom liječniku ili otidite u najbližu ambulantu hitne službe ako osjetite sljedeće simptome:

- zabilježene su iznimno jake i ozbiljne kožne reakcije poput Stevens-Johnsonovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize (koje se javljaju kod nepoznatog broja bolesnika) kod primjene Diuvera. Kožne nuspojave mogu se sastojati od osipa sa ili bez mjehurića. Također se može pojaviti crvenilo kože, ranice ili otekline u ustima, grlu, očima, nosu i oko genitalija, kao i groznica i simptomi slični gripi. Kožni osip može se razviti u ozbiljno rašireno oštećenje kože (odvajanje epidermisa i površinskih sluznica) s posljedicama opasnim po život.

Druge nuspojave koje se mogu pojaviti:

**Često** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- glavobolja
- omaglica

- umor.

**Manje često** (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- tegobe mokraćnog mjehura (zadržavanje mokraće)
- smanjena količina kalija u krvi
- povišena razina šećera u krvi
- povećane vrijednosti jetrenih enzima
- povećane vrijednosti mokraćne kiseline, šećera i masnoća u krvi
- gubitak apetita, slabost, problemi sa želucem ili mišićima, povraćanje, proljev, zatvor, mučnina, grčevi u mišićima.

**Rijetko** (mogu se javiti u od 1 na 1000 osoba):

- srčani udar,
- nepravilan srčani ritam,
- angina pectoris (pojava boli u području srca, s osjećajem pritiska, žarenja i nelagode, koja se širi)
- promjene u razinama kreatinina, uree i natrija u krvi,
- poremećaji krvnih pretraga kao posljedica poremećenog rada bubrega,
- preosjetljivost na sunčevu svjetlost,
- svrbež, koprivnjača,
- gubitak sluha, zujanje/zvonjava u ušima s,
- trnci u rukama i nogama,
- suha usta.

**Nepoznato** (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- moždani udar (moždani infarkt), krvni ugrušak, upala gušterače, poremećaji vida, nesvjestica, stanje konfuzije.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

## **5. Kako čuvati Diuver**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji ili blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Diuver sadrži**

- Djelatna tvar je torasemid.  
Jedna Diuver 5 mg tableta sadrži 5 mg torasemida.  
Jedna Diuver 10 mg tableta sadrži 10 mg torasemida.
- Drugi sastojci su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, natrijev škroboglikolat, vrste A, silicijev dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijev stearat.

**Kako Diuver izgleda i sadržaj pakiranja**

Diuver 5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom 915 na drugoj strani.

Diuver 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom 916 na drugoj strani.

Diuver tablete dostupne su u pakiranju od 20 ili 30 tableta u blisteru, u kutiji.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25

10 000 Zagreb

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je posljednji put revidirana u svibnju 2024.**