

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Dormicum 15 mg filmom obložene tablete midazolam

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što su Dormicum tablete i za što se koriste?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dormicum tablete?
3. Kako uzimati Dormicum tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Dormicum tablete?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što su Dormicum tablete i za što se koriste?**

Dormicum tablete sadrže midazolam, djelatnu tvar iz skupine benzodiazepina s brzim i kratkotrajnim učinkom.

Dormicum tablete prvenstveno djeluju umirujuće (sedativni učinak) i uspavljujuće (hipnotički učinak), a osim toga sprječavaju ili prekidaju napadaje (antikonvulzivni učinak) te smanjuju mišićni tonus (miorelaksacijski učinak).

Dormicum tablete se koriste za:

- kratkotrajno liječenje nesаницe kada su smetnje tako teške da osobu onesposobljuju ili joj stvaraju izrazitu neugodu
- umirenje i uvođenje u anesteziju prije kirurških ili dijagnostičkih zahvata.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Dormicum tablete?**

##### **Nemojte uzimati Dormicum tablete**

- ako ste alergični na midazolam, druge benzodiazepine ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.),
- kod teških bolesti dišnog sustava,
- kod teških bolesti jetre,
- ako tijekom spavanja privremeno prestanete disati (tzv. sindrom apneje u snu),
- ako bolujete od miastenije gravis (bolest koju obilježava slabost mišića),
- ako se istodobno liječite ketokonazolom, itrakonazolom, vorikonazolom (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija), inhibitorima HIV proteaze (lijekovi za liječenje HIV infekcije), pa i onda kada se oni uzimaju zajedno s potpornom terapijom ritonaviro, ili inhibitorima HCV proteaze boceprevirom i telaprevirom (lijekovi za liječenje hepatitisa C) (pogledajte i odlomak 'Drugi lijekovi i Dormicum tablete' u nastavku).
- Dormicum tablete ne smiju se davati djeci mlađoj od 12 godina jer dostupne jačine tableta ne omogućuju odgovarajuće doziranje u toj populaciji bolesnika.

## Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Dormicum tablete.

Tijekom uzimanja benzodiazepina, kao što su Dormicum tablete, mogu se razviti:

- **Tolerancija:** nakon nekoliko tjedana liječenja može se razviti tolerancija na lijek (smanjenje učinkovitosti pojedinačnih doza). Morate posjetiti liječnika ako osjećate da ste postali neosjetljivi na učinke lijeka i mislite da je potrebno povećati dozu;
- **Povratna nesаница:** može se javiti nakon prestanka uzimanja lijeka i može biti teža od one prije početka liječenja. Takva je nesаница prolazna, a mogu je pratiti promijenjeno raspoloženje, tjeskoba, smetnje spavanja i nemir. Rizik od povratne nesаницe veći je kod naglog prekida liječenja pa se preporučuje postupno smanjivanje doze (pogledajte i odlomak 'Ako prestanete uzimati Dormicum tablete' u dijelu 3.).
- **Gubitak pamćenja (amnezija):** benzodiazepini mogu prouzročiti anterogradnu amneziju (gubitak pamćenja za događaje koji se dogode nakon buđenja), koja je osobito izražena prvih nekoliko sati po uzimanju lijeka. Kako biste umanjili vjerojatnost te pojave, morate si po uzimanju tablete osigurati najmanje 7 do 8 sati neprekinutog sna (pogledajte i dio 4.).
- **Psihijatrijske i 'paradokсне' reakcije** (*iznenađujuće, prividno besmislene reakcije*): osobito u starijih bolesnika benzodiazepini mogu prouzročiti paradokсне reakcije kao što su nemir, uznemirenost, razdražljivost, nervoza, hiperaktivnost, agresivnost, tjeskoba i rjeđe lažna uvjerenja (deluzije), ljetnja, noćne more, neuobičajeni snovi, priviđenja (halucinacije), psihoze, neprilagođeno ponašanje i druge nuspojave koje se odražavaju na ponašanje. U takvim slučajevima treba prekinuti liječenje.
- **Ovisnost:** primjena Dormicum tableta može uzrokovati tjelesnu i psihičku ovisnost. Rizik od razvoja ovisnosti povećava se kod uzimanja većih doza i dugotrajnijeg liječenja. Rizik je veći i u bolesnika koji su u prošlosti imali problema sa zluporabom alkohola ili psihoaktivnih tvari. Morate posjetiti liječnika ako osjećate da postajete ovisni o lijeku.
- **Simptomi ustezanja** (*koji se mogu pojaviti po prestanku uzimanja lijeka*) mogu uključivati glavobolju, proljev, bolove u mišićima, izrazitu tjeskobu, napetost, nemir, smetenost i razdražljivost. U težim slučajevima mogu se pojaviti i sljedeći simptomi: poremećaj samosvijesti (derealizacija), gubitak svjesnosti o vlastitoj osobnosti (depersonalizacija), pojačana osjetljivost na normalan zvuk (hiperakuzija), utrnulost i trnci u udovima, osjetljivost na svjetlost, buku ili fizički dodir, priviđenja (halucinacije) i napadaji (konvulzije). Rizik od razvoja simptoma ustezanja veći je kod naglog prekida liječenja pa se preporučuje postupno smanjivanje doze (pogledajte i dio 4.).

### VAŽNO:

**Ako ste ovisni o alkoholu, lijekovima ili drogama, izbjegavajte uzimati Dormicum tablete.**

Isto tako, morate izbjegavati istodobno uzimanje Dormicum tableta i alkohola ili lijekova koji djeluju na središnji živčani sustav. Istodobna primjena može pojačati učinke Dormicum tableta i dovesti do prekomjerne sedacije ili čak do kočenja dišnog i srčanožilnog sustava. Pogledajte i odlomke 'Drugi lijekovi i Dormicum tablete' te 'Dormicum tablete s hranom, pićem i alkoholom'.

Budite oprezni pri uzimanju Dormicum tableta i u sljedećim slučajevima:

- ako ste stariji i oslabjeli. Liječnik će Vam možda morati smanjiti dozu.
- ako imate oštećenje jetre ili bubrega, ili tegobe s dišnim sustavom, srcem ili krvnim žilama. Liječnik će Vam možda morati smanjiti dozu.

### Drugi lijekovi i Dormicum tablete

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Zbog međusobnog djelovanja s nekim drugim lijekovima, učinak Dormicum tableta ili tih lijekova može se pojačati ili smanjiti.

Istodobno s Dormicum tabletama **NE SMIJETE** uzimati ketokonazol, itraconazol, vorikonazol (lijekove za liječenje gljivičnih infekcija), inhibitore HIV proteaze (lijekove za liječenje HIV infekcije, npr. sakvinavir, ritonavir, delavirdin, nelfinavir) ni inhibitore HCV proteaze boceprevir i telaprevir (lijekove za liječenje hepatitisa C) (pogledajte i odlomak 'Nemojte uzimati Dormicum tablete').

**Lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav** mogu pri istodobnoj primjeni pojačati učinke Dormicum tableta (pogledajte i odlomak 'Upozorenja i mjere opreza'). Među njim se ubrajaju:

- lijekovi za smirenje (sedativi). U bolesnika koji istodobno uzimaju sedative povećan je rizik od padova i prijeloma.
- lijekovi protiv bolova (opijati)
- lijekovi za liječenje psihoza (antipsihotici)
- lijekovi koji ublažavaju strah i uznemirenost (anksiolitici)
- sredstva za spavanje
- lijekovi za liječenje epilepsije (antiepileptici)
- neki lijekovi za anesteziju pri kirurškim zahvatima, neki lijekovi za liječenje depresije (antidepresivi), lijekovi za ublažavanje alergija (antihistaminici) te lijekovi za snižavanje krvnog tlaka

Ako niste sigurni uzimate li neki od navedenih lijekova, obratite se svom liječniku.

Učinci Dormicum tableta mogu se pojačati i trajati dulje ako istodobno uzimate lijekove kao što su:

- flukonazol, posakonazol (lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija)
- klaritromicin, telitromicin, eritromicin, roksitromicin (lijekovi za liječenje nekih bakterijskih infekcija)
- diltiazem, verapamil (lijekovi za liječenje srčanih bolesti)
- nefazodon, fluvoksamin (lijekovi za liječenje depresije)
- aprepitant, netupitant, kasopitant (lijekovi koji sprječavaju povraćanje)
- tabimorelin (lijek koji potiče lučenje hormona rasta)
- imatinib, everolimus (lijekovi za liječenje određenih vrsta raka)
- lapatinib (lijek za liječenje određenih tipova raka dojke)
- idelalizib (lijek za liječenje nekih vrsta leukemije i limfoma)
- raloksifen (lijek za liječenje i prevenciju osteoporoze u žena u postmenopauzi)
- fentanil (vrlo snažan lijek protiv bolova, opioidni analgetik)
- cimetidin, ranitidin (lijekovi za liječenje čira na želucu)
- klorzoksazon (lijek za liječenje nelagode koju uzrokuju grčevi mišića),
- bikalutamid (lijek za liječenje raka prostate)
- propiverin (lijek za liječenje poteškoća u kontroli mokraćnog mjehura)
- ciklosporin (imunosupresijski lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa)
- simeprevir (lijek za liječenje hepatitisa C)
- pripravci koji sadrže sok od grejpa
- biljni lijekovi i pripravci koji sadrže ehinaceju ili berberin (koji se nalazi u biljci kanadska žutika)

Liječnik će Vam možda propisati manju dozu Dormicum tableta.

Učinci Dormicum tableta mogu se umanjiti i trajati kraće ako istodobno uzimate lijekove kao što su:

- karbamazepin, fenitoin, klobazam (lijekovi za liječenje epilepsije)
- rifampicin (lijek za liječenje nekih bakterijskih infekcija)
- enzalutamid (lijek za liječenje raka prostate)
- mitotan (lijek za liječenje raka kore nadbubrežne žlijezde)
- efavirenz (lijek za liječenje HIV infekcije)
- tikagrelor (lijek za sprječavanje događaja izazvanih krvnim ugrušcima)

- vemurafenib (lijek za liječenje melanoma)
- kvercetin (dodatak prehrani koji se nalazi u biljci ginko)
- pripravci koji sadrže azijski ginseng
- pripravci koji sadrže gospinu travu (biljni lijek za liječenje depresije)

Liječnik će Vam možda propisati veću dozu Dormicum tableta.

Ako niste sigurni uzimate li neki od navedenih lijekova, obratite se svom liječniku.

Istodobna primjena lijeka Dormicum i opioda (jakih lijekova protiv bolova, lijekova za zamjensku terapiju i nekih lijekova protiv kašlja) povećava rizik pojave omamljenosti, otežanog disanja (respiratorne depresije) i kome te može biti opasna po život. Zbog toga istodobnu primjenu treba razmotriti samo kada nije moguća nijedna druga terapija.

Međutim, ako Vam liječnik ipak propiše Dormicum zajedno s opiodima, ograničit će dozu i trajanje istodobnog liječenja.

Obavijestite svog liječnika o svim opiodima koje uzimate i pažljivo se pridržavajte doza koje Vam je liječnik preporučio. Možda bi bilo dobro da zamolite prijatelje ili članove obitelji da pripaze na pojavu gore navedenih znakova i simptoma. Obratite se svom liječniku ako se pojave takvi simptomi.

### **Dormicum tablete s hranom, pićem i alkoholom**

Dormicum tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.

Morate izbjegavati istodobno uzimanje Dormicum tableta i alkohola jer njihova istodobna primjena može pojačati učinke Dormicum tableta i dovesti do prekomjerne sedacije ili čak do kočenja dišnog i srčanožilnog sustava. U bolesnika koji istodobno uzimaju alkoholna pića povećan je rizik od padova i prijeloma.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

O sigurnosti korištenja midazolama tijekom trudnoće i dojenja još nema dovoljno podataka. Postojeći podaci ukazuju na povećan rizik od prirođenih mana povezanih s primjenom benzodiazepina, uključujući midazolam, tijekom prvog tromjesečja trudnoće. Tijekom trudnoće treba izbjegavati primjenu benzodiazepina, osim ako nema sigurnije mogućnosti liječenja.

**Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.**

Uzimanje midazolama u posljednjem tromjesečju trudnoće može naškoditi djetetu. Ako je majka zadnjih mjeseci prije poroda redovito uzimala benzodiazepine, kod novorođenčeta se ubrzo nakon poroda mogu javiti simptomi ustezanja (koji se inače javljaju kod prestanka uzimanja lijeka).

Budući da se midazolam izlučuje u majčino mlijeko, ne smijete uzimati Dormicum tablete dok dojite.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Dormicum tablete uzrokuju umirenje (sedaciju), gubitak pamćenja (amneziju), smanjuje koncentraciju i mišićnu snagu pa time znatno smanjuje sposobnosti upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Stoga ne smijete upravljati vozilima ni raditi sa strojevima dok se potpuno ne oporavite. Odluku o tome kada možete nastaviti s takvim aktivnostima donijet će Vaš liječnik.

Vjerojatnost smanjene pozornosti veća je ako niste dovoljno dugo spavali ili ako ste konzumirali alkohol. Ako se jave takvi simptomi, ne smijete upravljati vozilima ni raditi sa strojevima.

### **Dormicum tablete sadrže laktozu**

Jedna Dormicum tableta sadrži 84 mg bezvodne laktoze. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

### 3. Kako uzimati Dormicum tablete?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

**Tabletu uzmite cijelu s nešto tekućine neposredno prije spavanja. Po uzimanju tablete osigurajte si najmanje 7 do 8 sati neprekinutog spavanja.**

Preporučena doza za odrasle je jedna tableta od 15 mg.

Dozu lijeka i trajanje liječenja odredit će liječnik. **Ni u kom slučaju ne smijete sami povećati propisanu dozu lijeka.**

Kod operativnog ili dijagnostičkog zahvata lijek Dormicum ćete primiti 30 do 60 minuta prije zahvata. Lijek ćete dobiti u obliku tablete, osim u slučajevima kada je primjerenija primjena lijeka u venu.

#### *Posebne skupine bolesnika:*

U sljedećim skupinama bolesnika Dormicum tablete treba primjenjivati vrlo oprezno i razmisliti o smanjivanju doze: starije i onemoćale osobe, bolesnici s oštećenjem funkcije jetre ili bubrega i bolesnici s dišnim, srčanim ili krvožilnim tegobama. U tih se bolesnika ne smije prekoračiti doza od 7,5 mg.

#### *Trajanje liječenja*

Liječenje neka bude što kraće, obično od nekoliko dana do najviše dva tjedna. Pred kraj liječenja treba postupno smanjivati dozu, što će liječnik prilagoditi posebno Vama. Liječenje Dormicum tabletama ne smijete prekinuti odjednom. Liječnik Vam iznimno može produljiti liječenje samo nakon prethodne temeljite procjene.

#### **Ako uzmete više Dormicum tableta nego što ste trebali**

- **Odmah potražite liječničku pomoć ili otidite u bolnicu.** Po mogućnosti ponosite sa sobom pakiranje lijeka.
- Benzodiazepini često uzrokuju omamljenost, smetnje mišićne koordinacije (ataksiju), smetnje govora zbog oštećenja mozga ili živaca (dizartriju) i nevoljne ritmične pokrete zjenica (nistagmus). Prevelike doze rijetko mogu biti opasne po život ako se uzima samo ovaj lijek.
- **Ako se benzodiazepini uzimaju u kombinaciji s drugim lijekovima koji djeluju na središnji živčani sustav**, uključujući alkohol, učinci tih lijekova su pojačani. Prevelika doza može dovesti do gubitka refleksa (arefleksije), privremenog prestanka disanja (apneje), gubitka mišićnog tonusa (hipotonije), niskog krvnog tlaka, zastoja disanja i rada srca, a u rijetkim slučajevima i do kome.
- Liječnik će uvesti odgovarajuće liječenje ovisno o Vašem stanju. Možda ćete uzimati aktivni ugljen ili lijekove protiv trovanja, u nekim slučajevima trovanja većim brojem različitih lijekova možda će se primijeniti ispiranje želuca.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Dormicum tablete**

**Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.**

#### **Ako prestanete uzimati Dormicum tablete**

#### **VAŽNO:**

**Liječenje ne smijete prekinuti ako se o tome prije niste posavjetovali s liječnikom.** Nakon naglog prekida uzimanja Dormicum tableta može se pojaviti prolazna povratna nesanica, koja može biti još teža nego prije početka liječenja. Mogu je pratiti i promijenjeno raspoloženje, tjeskoba, smetnje spavanja i nemir. Stoga daljnje liječenje treba postupno ukidati. Slijedite naputke svog liječnika.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

#### 4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

##### **Važne nuspojave na koje morate posebno obratiti pozornost:**

###### **Alergijske reakcije**

Ako se pojave simptomi alergijske reakcije, **odmah** potražite liječničku pomoć. U osjetljivih pojedinaca mogu se pojaviti reakcije preosjetljivosti te oticanje lica, usana, jezika i drugih dijelova tijela (angioedem).

Primijećen je bol u prsnom košu kao znak ozbiljne alergijske reakcije koja se zove Kounisov sindrom.

###### **Gubitak pamćenja**

Anterogradna amnezija (gubitak pamćenja za događaje koji se dogode nakon buđenja) može se javiti kod primjene terapijskih doza, no rizik se povećava uz veće doze. Može biti povezana s neprilagođenim ponašanjem. Pogledajte i odlomak 'Upozorenja i mjere opreza' u dijelu 2.

###### **Paradokсне reakcije**

Ako se pojavi neki od sljedećih simptoma, posavjetujte se sa svojim liječnikom jer ćete možda morati prestati uzimati Dormicum tablete:

- nemir, uznemirenost, hiperaktivnost, nervoza, tjeskoba, razdražljivost, agresivnost
- priviđenja (halucinacije), ljutnja, noćne more, neuobičajeni snovi, neprilagođeno ponašanje i druge nuspojave koje se odražavaju na ponašanje.

Paradokсне reakcije se češće javljaju u starijih bolesnika.

Pogledajte i dio 'Upozorenja i mjere opreza' u dijelu 2.

###### **Ovisnost**

Dormicum tablete čak i pri uobičajenim dozama može izazvati fizičku ovisnost. Nagli prekid terapije može izazvati simptome ustezanja ili fenomene povrata, kao što su povratna, još teža nesanica, promjene raspoloženja, tjeskoba i nemir. Može doći do psihološke ovisnosti o lijeku. Primijećena je zlouporaba u osoba koje zlorabe više vrsta lijekova. Pogledajte i odlomak 'Upozorenja i mjere opreza' u dijelu 2.

###### **Padovi i prijelomi**

U bolesnika koji istodobno uzimaju sedative (uključujući alkoholna pića) i u starijih bolesnika koji se liječe benzodiazepinima povećan je rizik od padova i prijeloma.

###### **Ostale nuspojave**

Nuspojave koje se javljaju **osobito na početku liječenja** su:

- smetenost, dezorijentiranost, emocionalni poremećaj i poremećaji raspoloženja
- omamljenost tijekom dana, glavobolja, omaglica, smanjena budnost, nekoordinirani mišićni pokreti
- dvoslike
- mišićna slabost
- umor

Navedene nuspojave obično nestanu same od sebe s nastavkom liječenja.

###### **Sljedeće nuspojave mogu se pojaviti bilo kada tijekom liječenja Dormicum tabletama**

- promjene libida, depresija (može se otkriti otprije postojeća depresija)
- zatajenje srca, uključujući zastoj srca
- sedacija (poslijeoperacijska)
- smetnje disanja (zbog kočenja centra za disanje u mozgu)

- probavne smetnje
- kožne reakcije
- zlouporaba lijeka

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V](#)**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Dormicum tablete?**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Dormicum tablete sadrže?**

Djelatna tvar je midazolam. Jedna tableta sadrži 15 mg midazolama u obliku midazolammaleata. Drugi sastojci u jezgri tablete su: bezvodna laktoza, mikrokristalična celuloza, kukuruzni škrob i magnezijev stearat. Film ovojnica sadrži hipromelozu, poliakrilat 30 postotnu raspršinu, makrogol 6000, makrogol 400, talk, titanijev dioksid (E171), karmelozunatrij i indigotin (E132).

### **Kako Dormicum tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?**

Ovalne, sivoplave tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom "15" na drugoj strani. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Jedna kutija sadrži 10 tableta u blisteru (PVC/PVDC//Al).

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH  
Ziegelhof 24  
17489 Greifswald  
Njemačka

#### **Proizvođač**

Recipharm Leganés S.L.U.  
Calle Severo Ochoa, 13  
Leganés  
28914 Madrid  
Španjolska

**Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61

10 000 Zagreb

Tel: 01 2396900

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

**Ova uputa je posljednji puta revidirana u kolovozu 2023.**