

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast

eukaliptusovo eterično ulje; eterično ulje bijelog bora; racemični kamfor

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast
3. Kako primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast i za što se koristi

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast koja sadrži eterično ulje eukaliptusa, eterično ulje bijelog bora i racemični kamfor koristi se za ublažavanje simptoma bolesti dišnog sustava povezanih s prehladom kao što je prehlada bez komplikacija i bronhijalni katar bez komplikacija.

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast namijenjena je za vanjsku uporabu na kožu u djece starije od 4 godine, adolescenata i odraslih i za inhaliranje u djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast

Nemojte primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast:

- ako ste alergični na eterično ulje eukaliptusa ili bijelog bora, kamfor ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- u djece mlađe od 30 mjeseci
- u djece s povećanim rizikom od epileptičkih napada
- u slučaju bronhijalne astme, hripavca, pseudokrupa i drugih bolesti dišnog sustava koje su povezane s preosjetljivošću dišnih putova.
- kao inhalacijsku terapiju kod akutne upale dišnih putova ili akutne upale pluća.
- za vanjsku uporabu na koži kod pedijatrijskih bolesti s osipom kao što su vodene kozice i ospice.
- na ozlijeđenoj, oboljeloj ili opečenoj koži.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast.

Kamfor i 1.8 cineol mogu izazvati grčenje bronhijalnih mišića i spazam grkljana s posljedicom poremećaja disanja ili apneje (povremeni prekid disanja u snu) u dojenčadi i djece mlađe od 2 i pol godine.

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast ne smije se nanositi na sluznice uključujući nos i područje oko očiju. Ne smije se nanositi na lice. Ruke treba pažljivo oprati nakon uporabe. Koristiti samo na zdravoj koži.

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast smije se koristiti samo za vanjsku uporabu na kožu i inhaliranje.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 5 dana ili u slučaju smetnji disanja (nedostatak daha/otežano disanje), glavobolje, vrućice (povišene temperature) kao i gnojnog/krvavog iskašljaja ili nosnog sekreta.

Djeca

Primjena na koži se ne preporučuje u djece mlađe od 4 godina starosti. Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast se ne preporuča za inhalaciju kod djece mlađe od 6 godina.

Djeca školske dobi (starija od 6 godina) smiju inhalirati lijek samo pod nadzorom odraslih osoba.

Drugi lijekovi i Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Eukaliptus potiče rad enzima u jetri, uslijed toga se može smanjiti učinkovitost lijekova (osobito aminopirina, amfetamina i fenobarbitala) ili skraćuje vrijeme djelovanja. To se ne može isključiti i za primjenu velike količine djelatne tvari kroz kožu na velikoj površini i/ili dugotrajnu primjenu.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast se ne smije koristiti tijekom razdoblja trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema dostupnih informacija.

3. Kako primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Za vanjsku primjenu na kožu:

Ovu mast namijenjenu za lokalnu primjenu nanijeti u tankom sloju i utrljati na prsa i leđa 2 do 3 puta dnevno, naročito prije odlaska na spavanje, a zatim mjesta prekriti toplom flannelskom ili vunenom tkaninom ili se toplo obući.

Za inhalaciju:

Grudicu masti veličine graška otopiti u vrućoj vodi. Staviti ručnik preko glave i inhalirati 5 do 10 minuta. Mast je prikladna za inhaliranje bez inhalatora (inhaliranjem vodene pare nakon otapanja masti u posudi vruće vode te stavljanjem ručnika preko glave), ali može se primijeniti i jednostavan neelektrični inhalator. U slučaju primjene inhalatora potrebno je slijediti uz njega priloženu uputu.

Primjena u djece

Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast se ne smije koristiti za djecu mlađu od 2 i pol godine starosti.

Primjena na koži se ne preporučuje u djece mlađe od 4 godina i za inhalaciju kod djece mlađe od 6 godina starosti.

Molimo osigurajte da djeca ne dodiruju rukama područje kože na koje je utrljan lijek.

Ako primijenite više Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusove masti nego što ste trebali

U slučaju slučajnog gutanja Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusove masti od strane djeteta, važno je konzultirati liječnika bez odgađanja kako bi proveo potrebno liječenje. Nemojte pokušati izazvati povraćanje.

Ako ste zaboravili primijeniti Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Učestalost nuspojava definira se na sljedeći način:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

Vrlo rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

Poremećaji imunološkog sustava:

Nepoznato: Moguća je iritacija kože i sluznica.

Psihijatrijski poremećaji:

Nepoznato: Halucinacije.

Poremećaji živčanog sustava:

Nepoznato: Vanjska uporaba na velikom području kože može izazvati oštećenje središnjeg živčanog sustava (na primjer, nakon korištenja kamfora).

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:

Nepoznato: Udisanje (uključujući vanjsku uporabu na kožu) može izazvati simptome kao što je stridor (piskanje), otežano disanje i opstruktivna bolest pluća. Može doći do refleksnog spazma bronhija i grkljana po kojem slijedi stanje slično astmi i prekidi disanja u snu (apneja).

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Nepoznato: Iritacija kože i sluznice.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava:

Nepoznato: Vanjska uporaba na velikom području kože može izazvati simptome trovanja bubrega (na primjer, nakon korištenja kamfora).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusovu mast

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i bočici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek se smije upotrijebiti 6 mjeseci nakon prvog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije:

Što Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova mast sadrži

- Djelatne tvari su eterično ulje eukaliptusa, eterično ulje bijelog bora i racemični kamfor.
1 g masti sadrži 75 mg eteričnog ulja eukaliptusa, 75 mg eteričnog ulja bijelog bora i 50 mg racemičnog kamfora.
- Pomoćne tvari su rafinirano ulje kukuruznih klica, žuti pčelinji vosak i tvrda mast

Kako Dr. Theiss Mucoplant Eukaliptusova izgleda i sadržaj pakiranja

Dr. Theiss Eukaliptusova mast je svijetlo žute boje. U kartonskoj kutiji nalazi se smeđa staklena posuda (staklo tip III) s plastičnim zatvaračem s navojem s 20 g ili 50 g masti, te uputa o lijeku. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Dr. Theiss Naturwaren GmbH
Michelinstraße 10
66424 Homburg
Njemačka

logo nositelja odobrenja

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Naturprodukt d.o.o.
Franje Lučića 23
10 090 Zagreb
Hrvatska
Telefon: 01/3498 603

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

Ova uputa je posljednji put revidirana 02. rujna 2021.