

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Edoksaban STADA 15 mg filmom obložene tablete
Edoksaban STADA 30 mg filmom obložene tablete
Edoksaban STADA 60 mg filmom obložene tablete
edoksaban

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Edoksaban STADA i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edoksaban STADA
3. Kako uzimati Edoksaban STADA
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Edoksaban STADA
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Edoksaban STADA i za što se koristi

Edoksaban STADA sadrži djelatnu tvar edoksaban i pripada skupini lijekova koji se zovu antikoagulansi. Ovaj lijek pomaže u sprječavanju stvaranja krvnih ugrušaka. Djeluje tako što blokira djelovanje faktora Xa, koji je važna komponenta zgrušavanja krvi.

Edoksaban STADA se primjenjuje u odraslih za:

- **sprječavanje nastanka krvnih ugrušaka u mozgu** (moždani udar) **i drugim krvnim žilama u tijelu** ako imaju vrstu nepravilnog srčanog ritma koji se zove nevalvularna fibrilacija atrijske i još barem jedan dodatni čimbenik rizika, kao što su zatajenje srca, prethodni moždani udar ili visoki krvni tlak
- **liječenje krvnih ugrušaka u venama nogu** (duboka venska tromboza) **i krvnim žilama pluća** (plućna embolija) **te za sprječavanje ponovnog nastanka krvnih ugrušaka** u krvnim žilama nogu i/ili pluća

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Edoksaban STADA

Nemojte uzimati Edoksaban STADA

- ako ste alergični na edoksaban ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
- ako aktivno krvarite
- ako imate bolest ili stanje koje povećava rizik od ozbiljnog krvarenja (npr. vrijed želuca, ozljedu mozga ili krvarenje u mozak ili nedavni kirurški zahvat na mozgu ili očima)
- ako uzimate druge lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (npr. varfarin, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban ili heparin), osim kod promjene antikoagulacijske terapije ili kod primanja heparina kroz vensku ili arterijsku liniju da bi ostala prohodna
- ako imate bolest jetre zbog koje je povećan rizik od krvarenja
- ako imate nekontrolirani povišeni krvni tlak
- ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Edoksaban STADA:

- ako imate povećan rizik od krvarenja, što bi moglo biti u slučaju da imate neko od sljedećih stanja:
 - završni stadij bolesti bubrega ili ako ste na dijalizi
 - tešku bolest jetre
 - poremećaj krvarenja
 - tegobe s krvnim žilama u pozadini oka (retinopatija)
 - nedavno krvarenje u mozak (intrakranijalno ili intracerebralno krvarenje)
 - tegobe s krvnim žilama u mozgu ili kralježnici
- ako imate mehanički srčani zalistak

Edoksaban STADA 15 mg smije se primjenjivati samo kad se Edoksaban STADA 30 mg zamjenjuje antagonistom vitamina K (npr. varfarinom) (vidjeti dio 3. Kako uzimati Edoksaban STADA).

Budite posebno oprezni s lijekom Edoksaban STADA;

- ako znate da imate bolest koja se naziva antifosfolipidni sindrom (poremećaj imunološkog sustava koji uzrokuje povećani rizik od nastanka krvnih ugrušaka), obavijestite o tome svog liječnika koji će odlučiti postoji li potreba za izmjenom terapije.

Ako morate ići na operaciju;

- jako je važno da uzmete lijek Edoksaban STADA prije i poslije operacije točno u vrijeme kada Vam je odredio liječnik. Po mogućnosti, lijek Edoksaban STADA treba prestati uzimati najmanje 24 sata prije operacije. Liječnik će odrediti kada ćete ponovno početi uzimati lijek Edoksaban STADA.
U hitnim situacijama, liječnik će pomoći u određivanju odgovarajućih mjera u vezi s lijekom Edoksaban STADA.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka Edoksaban STADA u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Edoksaban STADA

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate nešto od sljedećeg:

- neke lijekove protiv gljivičnih infekcija (npr. ketokonazol)
- lijekove za liječenje poremećaja otkucaja srca (npr. dronedaron, kinidin, verapamil)
- druge lijekove za smanjenje zgrušavanja krvi (npr. heparin, klopidoogrel ili antagoniste vitamina K kao što su varfarin, acenokumarol, fenpropakumon ili dabigatran, rivaroksaban, apiksaban)
- antibiotike (npr. eritromicin, klaritromicin)
- lijekove za sprječavanje odbacivanja organa nakon transplantacije (npr. ciklosporin)
- protuupalne lijekove i lijekove protiv bolova (npr. naproksen ili acetilsalicilatnu kiselinu)
- lijekove za liječenje depresije koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina.

Ako nešto od gore navedenog vrijedi za Vas, obavijestite svog liječnika prije nego što uzmete lijek Edoksaban STADA, zato što ovi lijekovi mogu pojačati učinke lijeka Edoksaban STADA i vjerojatnost neželjenog krvarenja. Vaš će liječnik odlučiti smijete li se liječiti lijekom Edoksaban STADA i morate li biti pod nadzorom.

Ako uzimate nešto od sljedećeg:

- neke lijekove za liječenje epilepsije (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital)
- gospinu travu, biljni pripravak koji se primjenjuje kod tjeskobe i blage depresije
- rifampicin, antibiotik.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obavijestite o tome svog liječnika prije nego što uzmete lijek Edoksaban STADA, jer učinak lijeka Edoksaban STADA može biti smanjen. Vaš će liječnik odlučiti smijete li se liječiti lijekom Edoksaban STADA i trebate li biti pod nadzorom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, nemojte uzimati lijek Edoksaban STADA. Ako postoji mogućnost da zatrudnite dok uzimate lijek Edoksaban STADA, koristite pouzdanu kontracepciju. Ako zatrudnite dok uzimate lijek Edoksaban STADA, odmah obavijestite liječnika, koji će odlučiti kako Vas liječiti.

Upravljanje vozilima i strojevima

Edoksaban STADA ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako uzimati Edoksaban STADA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko uzeti

Preporučena doza je jedna tableta od **60 mg** jedanput na dan.

- **Ako imate oštećenu funkciju bubrega**, liječnik Vam može sniziti dozu na jednu tabletu od **30 mg** jedanput na dan.
- **Ako imate tjelesnu težinu od 60 kg ili nižu**, preporučena doza je jedna tableta od **30 mg** jedanput na dan.
- **Ako Vam je liječnik propisao lijekove koji su poznati inhibitori P-gp-a**: ciklosporin, dronedaron, eritromicin ili ketokonazol, preporučena doza je jedna tableta od **30 mg** jedanput na dan.

Kako uzeti tabletu

Progutajte tabletu po mogućnosti s vodom.

Edoksaban STADA se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako Vam je teško progutati cijelu tabletu, obratite se liječniku za savjet o drugim načinima na koje možete uzimati lijek Edoksaban STADA. Tabletu možete zdrobiti i izmiješati sa 75 ml vode ili s 2 žlice (30 ml) pirea od jabuka neposredno prije primjene. Ako je potrebno, liječnik Vam može primijeniti zdrobljenu tabletu lijeka Edoksaban STADA kroz cjevčicu koja se u želudac uvodi kroz nos (nazogastrična sonda) ili kroz cjevčicu uvedenu izravno u želudac (želučana sonda). U tom slučaju, tablete se smiju zdrobiti i izmiješati sa 75 ml vode i odmah primijeniti kroz nazogastričnu sondu ili želučanu sondu nakon čega je sondu potrebno isprati s 55 ml vode.

Liječnik Vam može promijeniti antikoagulacijsku terapiju na sljedeći način:

Zamjena antagonista vitamina K (npr. varfarina) lijekom Edoksaban STADA

Prestanite uzimati antagonist vitamina K (npr. varfarin). Liječnik će Vam morati napraviti krvne pretrage i onda će Vam dati uputu kada da počnete uzimati lijek Edoksaban STADA.

Zamjena oralnih antikoagulansa koji nisu antagonisti vitamina K (dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) lijekom Edoksaban STADA

Prestanite uzimati prethodne lijekove (npr. dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) i počnite uzimati lijek Edoksaban STADA u vrijeme kad ste prema rasporedu trebali uzeti sljedeću dozu.

Zamjena parenteralnih antikoagulansa (npr. heparina) lijekom Edoksaban STADA

Prestanite uzimati antikoagulans (npr. heparin) i počnite uzimati lijek Edoksaban STADA u vrijeme kad ste prema rasporedu trebali uzeti sljedeću dozu antikoagulansa.

Zamjena lijeka Edoksaban STADA antagonistima vitamina K (npr. varfarinom)

Ako trenutno uzimate lijek Edoksaban STADA u dozi od 60 mg:

Liječnik će Vam reći da snizite dozu lijeka Edoksaban STADA na 30 mg jedanput na dan i da je uzmete zajedno s antagonistom vitamina K (npr. varfarinom). Liječnik će morati napraviti krvne pretrage i onda će Vam dati uputu kada da prestanete uzimati lijek Edoksaban STADA.

Ako trenutno uzimate lijek Edoksaban STADA u dozi od 30 mg (sniženu dozu): Liječnik će Vam reći da snizite dozu lijeka Edoksaban STADA na 15 mg jedanput na dan i da je uzmete zajedno s antagonistom vitamina K (npr. varfarin). Liječnik će morati napraviti krvne pretrage i onda će Vam dati uputu kada da prestanete uzimati lijek Edoksaban STADA.

Zamjena lijeka Edoksaban STADA oralnim antikoagulansima koji nisu antagonisti vitamina K (dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban)

Prestanite uzimati lijek Edoksaban STADA i počnite uzimati antikoagulans koji nije antagonist vitamina K (npr. dabigatran, rivaroksaban ili apiksaban) u vrijeme kad ste prema rasporedu trebali uzeti sljedeću dozu lijeka Edoksaban STADA.

Zamjena lijeka Edoksaban STADA parenteralnim antikoagulansima (npr. heparinom)

Prestanite uzimati lijek Edoksaban STADA i počnite uzimati parenteralni antikoagulans (npr. heparin) u vrijeme kad ste prema rasporedu trebali uzeti sljedeću dozu lijeka Edoksaban STADA.

Bolesnici koji će biti podvrgnuti kardioverziji:

Ako je potrebno poremećene otkucaje srca vratiti u normalne provedbom postupka koji se naziva kardioverzija, uzmite lijek Edoksaban STADA u vrijeme koje Vam odredi liječnik kako biste spriječili nastanak krvnih ugrušaka u mozgu i drugim krvnim žilama u tijelu.

Ako uzmete više lijeka Edoksaban STADA nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta lijeka Edoksaban STADA, odmah obavijestite liječnika. Ako uzmete više lijeka Edoksaban STADA nego što je preporučeno, možete imati povećan rizik od krvarenja.

Ako ste zaboravili uzeti Edoksaban STADA

Trebali biste odmah uzeti tabletu i nastaviti sljedeći dan s uzimanjem tablete jedanput na dan prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu istog dana kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek Edoksaban STADA

Nemojte prestati uzimati lijek Edoksaban STADA a da niste prethodno o tome razgovarali s liječnikom, zato što Edoksaban STADA liječi i sprječava ozbiljna stanja.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kao i drugi slični lijekovi (lijekovi koji smanjuju zgrušavanje krvi), Edoksaban STADA može uzrokovati krvarenje koje potencijalno može ugroziti život. U nekim slučajevima krvarenje ne mora biti vidljivo.

Ako Vam se dogodi bilo kakvo krvarenje koje ne prestaje samo od sebe ili se pojave znakovi opsežnog krvarenja (iznimna slabost, umor, bljedilo, omaglica, glavobolja ili neobjašnjeno oticanje), odmah potražite savjet liječnika.

Liječnik može odlučiti hoće li Vas zadržati pod pažljivim nadzorom ili će Vam promijeniti lijek.

Ukupni popis mogućih nuspojava:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

- bol u trbuhu
- poremećeni krvni testovi jetrene funkcije
- krvarenje iz kože ili potkožno
- anemija (nizak broj crvenih krvnih stanica)
- krvarenje iz nosa
- krvarenje iz vagine
- osip
- krvarenje u crijeva
- krvarenje iz usta i/ili grla
 - krv u mokraći
- krvarenje nakon ozljede (uboda)
- krvarenje u želudac
- omaglica
- mučnina
- glavobolja
- svrbež

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

- krvarenje u oči
- krvarenje iz kirurške rane nakon operacije
- krv u iskašljaju
- krvarenje u mozak
- druge vrste krvarenja
- smanjen broj trombocita u krvi (što može utjecati na zgrušavanje krvi)
- alergijska reakcija
- koprivnjača

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

- krvarenje u mišiće
- krvarenje u zglobove
- krvarenje u abdomen
- krvarenje u srce
- krvarenje u lubanji
- krvarenje nakon kirurškog zahvata
- alergijski šok
- oticanje bilo kojeg dijela tijela zbog alergijske reakcije

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- krvarenje u bubregu, ponekad uz prisutnost krvi u mokraći, zbog čega bubrezi ne mogu pravilno raditi (nefropatija povezana s primjenom antikoagulanasa).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Edoksaban STADA

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i svakom blisteru ili bočici iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Edoksaban STADA sadrži

- Djelatna tvar je edoksaban (u obliku edoksabantosilat hidrata).

Edoksaban STADA 15 mg filmom obložene tablete

Jedna tableta sadrži 15 mg edoksabana (u obliku edoksabantosilat hidrata).

Edoksaban STADA 30 mg filmom obložene tablete

Jedna tableta sadrži 30 mg edoksabana (u obliku edoksabantosilat hidrata).

Edoksaban STADA 60 mg filmom obložene tablete

Jedna tableta sadrži 60 mg edoksabana (u obliku edoksabantosilat hidrata).

- Drugi sastojci su:

Edoksaban STADA 15 mg filmom obložene tablete

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, djelomično supstituirana hidroksipropilceluloza, krospovidon, hidroksipropilceluloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat.
Film ovojnice: hipromeloza 2910 (E464), talk (E553b), makrogol 8000 (E1521), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172).

Edoksaban STADA 30 mg filmom obložene tablete

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, djelomično supstituirana hidroksipropilceluloza, krospovidon, hidroksipropilceluloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat.
Film ovojnice: hipromeloza 2910 (E464), talk (E553b), makrogol 8000 (E1521), titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172).

Edoksaban STADA 60 mg filmom obložene tablete

Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza, djelomično supstituirana hidroksipropilceluloza, krospovidon, hidroksipropilceluloza, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat.
Film ovojnice: hipromeloza 2910 (E464), talk (E553b), makrogol 8000 (E1521), titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172).

Kako Edoksaban STADA izgleda i sadržaj pakiranja

Edoksaban STADA 15 mg filmom obložene tablete su narančaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete promjera 6,7 mm, s utisnutom oznakom „15“ na jednoj strani te bez oznake na drugoj strani.

Dolaze u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima u kutijama s 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmom obloženih tableta ili u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima s jediničnim dozama u kutijama s 10 x 1, 50 x 1, 100 x 1 filmom obloženih tableta.

Edoksaban STADA 30 mg filmom obložene tablete su ružičaste, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete promjera 8,5 mm, s utisnutom oznakom „30“ na jednoj strani te bez oznake na drugoj strani.

Dolaze u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima u kutijama s 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmom obloženih tableta ili u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima s jediničnim dozama u kutijama s 10 x 1, 50 x 1, 100 x 1 filmom obloženih tableta ili u bijelim bočicama od polietilena visoke gustoće (HDPE), zatvorenim s bijelim plastičnim zatvaračem s navojem koje sadrže 90 filmom obloženih tableta.

Edoksaban STADA 60 mg filmom obložene tablete su žute, okrugle, bikonveksne filmom obložene tablete promjera 10,5 mm, s utisnutom oznakom „60“ na jednoj strani te bez oznake na drugoj strani. Dolaze u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima u kutijama s 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98, 100 filmom obloženih tableta ili u PVC/Al, PVC/PVDC/Al i Al/Al blisterima s jediničnim dozama u kutijama s 10 x 1, 50 x 1, 100 x 1 filmom obloženih tableta ili u bijelim bočicama od polietilena visoke gustoće (HDPE), zatvorenim s bijelim plastičnim zatvaračem s navojem koje sadrže 90 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Stada d.o.o.
Hercegovačka 14
10 000 Zagreb

Proizvođači

Geneparm S.A.
18th km Marathonos Avenue
15351 Pallini
Grčka

Olpha AS
5 Rupnicu Iela, Olaine
Olaines Novads
LV-2114
Latvija

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2 - 18
61118 Bad Vilbel
Njemačka

Stada M&D S.R.L. (Turda)
Trascăului street nr. 10
401135 Turda
Rumunjska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Hrvatska:	Edoksaban STADA 15 mg filmom obložene tablete Edoksaban STADA 30 mg filmom obložene tablete Edoksaban STADA 60 mg filmom obložene tablete
Češka, Grčka:	Edoxaban STADA
Mađarska:	Edoxaban STADA 15 mg filmtabletta Edoxaban STADA 30 mg filmtabletta Edoxaban STADA 60 mg filmtabletta
Malta:	Edoxaban Clonmel 15 mg film-coated tablet Edoxaban Clonmel 30 mg film-coated tablet Edoxaban Clonmel 60 mg film-coated tablet
Litva:	Edoxaban STADA 15 mg plėvele dengtos tabletės Edoxaban STADA 30 mg plėvele dengtos tabletės Edoxaban STADA 60 mg plėvele dengtos tabletės
Latvija:	Edoxaban STADA 15 mg apvalkotās tabletes Edoxaban STADA 30 mg apvalkotās tabletes Edoxaban STADA 60 mg apvalkotās tabletes

Rumunjska: Edoxaban Stada 15 mg comprimate filmate
Edoxaban Stada 30 mg comprimate filmate
Edoxaban Stada 60 mg comprimate filmate
Slovačka: Edoxaban STADA 15 mg filmom obalené tablety
Edoxaban STADA 30 mg filmom obalené tablety
Edoxaban STADA 60 mg filmom obalené tablety

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2025.