

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Exoderil 10 mg/ml otopina za kožu

naftifinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 tjedna.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Exoderil otopina za kožu i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Exoderil otopinu za kožu
3. Kako primjenjivati Exoderil otopinu za kožu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Exoderil otopinu za kožu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Exoderil otopina za kožu i za što se koristi

Exoderil otopina za kožu sadrži djelatnu tvar naftifinklorid, a namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija na koži. Exoderil otopina za kožu djeluje na kožne gljivice, kvasnice, plijesni i druge gljivice.

Exoderil otopina za kožu koristi se za liječenje gljivičnih infekcija kože stopala.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Exoderil otopinu za kožu

Nemojte primjenjivati Exoderil otopinu za kožu:

- ako ste preosjetljivi na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Exoderil otopinu za kožu.

Kod prvih znakova nuspojava, javite se svom liječniku. Nemojte primjenjivati Exoderil otopinu za kožu ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas (pogledajte dio „Nemojte primjenjivati Exoderil otopinu za kožu“).

Exoderil otopina za kožu je namijenjena samo za vanjsku uporabu i ne smije doći u doticaj s očima. Ako Vam otopina slučajno dođe u doticaj s očima, temeljito ih isperite mlazom vode. Otopinu nemojte nanositi na ozlijeđenu kožu, jer alkohol koji sadrži može izazvati bolno pečenje.

Ako su simptomi i dalje prisutni nakon 4 tjedna, ili ako liječenje nije uspješno kako se očekivalo, posavjetujte se s liječnikom.

Drugi lijekovi i Exoderil otopina za kožu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Pri pravilnoj primjeni ne očekuju se štetni učinci na plod ili dojenče, ali se iz predostrožnosti ne preporučuje primjena ako to nije izričito neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznat utjecaj Exoderil otopine za kožu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Exoderil otopina za kožu sadrži etanol i propilenglikol.

1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola. Propilenglikol može nadražiti kožu. Budući da ovaj lijek sadrži propilenglikol, nemojte ga primjenjivati na otvorenim ranama ili velikim područjima raspucale ili oštećene kože (poput opekline) bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.

Ovaj lijek sadrži 400 mg alkohola (etanola) u 1 ml otopine.

Etanol može izazvati osjećaj pečenja na oštećenoj koži.

3. Kako primjenjivati Exoderil otopinu za kožu

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Exoderil otopinu za kožu treba nanijeti jedanput na dan na očišćeno i pažljivo osušeno oboljelo i okolno područje kože. Otopinu možete nanijeti na kožu izravno iz bočice ili pomoću jastučića vate.

Djeca i adolescenti

Nema dostupnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti Exoderil otopine u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu.

Način primjene

Pažljivo slijedite navedene upute:

- očistite i osušite oboljele dijelove kože i okolna područja, te operite ruke
- na oboljelo i okolno područje kože nanosite dovoljno otopine kako bi dio koji mažete bio potpuno vlažan
- nakon nanošenja otopine dobro operite ruke kako ne biste proširili infekciju na sebi i na druge.

Pažljivo se pridržavajte sljedećih preporuka za što brže izlječenje gljivičnih infekcija (medicinski izraz: mikoze):

1. Mikroorganizmi odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prijanjati za odjeću koja je u doticaju s oboljelom kožom, zbog čega je treba svakodnevno mijenjati.

2. Zdrava i prije svega suha površina kože najbolja je zaštita od gljivičnih infekcija. Zbog toga, treba izbjegavati tijesnu odjeću koja sprječava cirkulaciju zraka (npr. čarape od sintetičkog materijala u tijesnoj obući). Nakon pranja pažljivo osušite područje oboljele kože. Krpice za pranje kože i ručnike mijenjajte svakodnevno.
3. Ako imate gljivičnu infekciju na stopalima, ne hodajte bosu u kupaonici ili npr. u hotelskoj sobi. To će spriječiti daljnje širenje infekcije kao i ponovnu pojavu infekcije.
4. Ne posjećujte saune ili kupelji prije nego što izliječite gljivičnu infekciju.

Trajanje liječenja

Kod liječenja kožnih gljivičnih infekcija, važno je nastaviti liječenje najmanje dva tjedna nakon nestanka svih znakova bolesti, čak i u slučaju brzog poboljšanja simptoma (svrbeža, žarenja) kako bi se održao dugotrajni učinak liječenja.

Obavezno kontaktirajte liječnika ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4 tjedna.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Moguće nuspojave:

Nepoznato (*učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka*):

- kontaktni dermatitis (kožni osip ili nadraženost na mjestu primjene)
- eritem (crvenilo kože).

Navedene nuspojave su rijetko razlog za prekid liječenja. Nuspojave nestaju nakon završetka liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Exoderil otopinu za kožu

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 30 °C.

Rok valjanosti nakon prvog otvaranja bočice je 6 mjeseci na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Exoderil otopina za kožu sadrži

Djelatna tvar je naftifinklorid.

1 ml otopine za kožu sadrži 10 mg naftifinklorida.

Pomoćne tvari su: etanol, pročišćena voda, propilenglikol.

1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola.

Kako Exoderil otopina za kožu izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra, bezbojna do blago žuta otopina s karakterističnim mirisom etanola.

20 ml otopine za kožu u smeđoj staklenoj bočici s plastičnim zatvaračem na navoj i plastičnim nastavkom za kapanje, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d, Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2024.