

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

natrijev alginat, natrijev hidrogenkarbonat, kalcijev karbonat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje
3. Kako uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje i za što se koriste

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje stvaraju zaštitni sloj koji pluta na površini želučanog sadržaja. Ovaj zaštitni sloj sprječava povratak želučane kiseline iz želuca u jednjak te tako ublažava osjećaj pečenja kod žgaravice i osjećaj nelagode u ždrijelu i ustima. Žgaravica se može pojaviti nakon obroka (npr. nakon obroka masne ili začinjene hrane), tijekom trudnoće ili u bolesnika sa simptomima povezanim s upalom sluznice jednjaka (npr. otežano i/ili bolno gutanje, ranice u ustima, povraćanje).

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje se koriste za ublažavanje simptoma gastroezofagealnog refluksa poput vraćanja želučane kiseline, žgaravice i loše probave (povezane s refluksom), koji se mogu pojaviti nakon obroka ili tijekom trudnoće te u bolesnika sa simptomima povezanim s upalom jednjaka (ezofagitom).

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

Nemojte uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje :

- ako znate da ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje te ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka.

Djeca i adolescenti

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje nisu za primjenu u djece budući sigurnost i djelotvornost u djece mlađe od 12 godina nisu još ustanovljene. Djeca mlađa od 12 godina lijek smiju koristiti samo prema preporuci liječnika.

Drugi lijekovi i Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

Ovaj lijek se ne smije primijeniti unutar dva sata nakon uzimanja nekog drugog lijeka za oralnu primjenu, s obzirom na to da može utjecati na učinkovitost drugih lijekova.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Lijek se smije koristiti tijekom trudnoće i dojenja, ako je to klinički potrebno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje sadrže aspartam.

Sadrži izvor fenilalanina. Može naškoditi osobama koje boluju od fenilketonurije.

Ovaj lijek sadrži 3,75 mg aspartama u jednoj tabletici.

Aspartam je izvor fenilalanina. Može Vam naškoditi ako bolujete od fenilketonurije, rijetkog genetskog poremećaja kod kojeg dolazi do nakupljanja fenilalanina jer ga tijelo ne može ukloniti na odgovarajući način.

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje sadrže natrij (iz natrijevog alginata i natrijevog hidrogenkarbonata).

Ovaj lijek sadrži 63,16 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednoj tabletici. To odgovara 3,2% preporučenog maksimalnog dnevног unosa soli za odraslu osobu.

Najveća preporučena dnevna doza ovog lijeka sadrži 1011 mg natrija (nalazi se u kuhinjskoj soli). To je ekvivalent 50,5% preporučenog maksimalnog dnevног unosa natrija za odrasle osobe.

Obratite se svom ljekarniku ili liječniku ako trebate uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje svakodnevno tokom dužeg vremenskog razdoblja, posebno ako su vam savjetovali dijetu sa malim unosom soli.

Ovaj lijek sadrži natrij (5,5 mmol u dozi od 2 tablete) i kalcij (1,6 mmol u dozi od 2 tablete).

Ukoliko Vam je preporučena dijeta s ograničenim unosom bilo koje od ovih soli, molimo da se obratite svom liječniku prije primjene lijeka.

Također se obratite svom liječniku vezano uz sadržaj soli ako bolujete ili ste bolovali od teških bolesti bubrega ili srca, s obzirom na to da određene vrste soli mogu utjecati na tijek bolesti.

3. Kako uzimati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za primjenu kroz usta. Prije gutanja tabletu dobro prožvačite.

Odrasli, uključujući starije osobe i adolescenti stariji od 12 godina: kod pojave simptoma uzmite 2 do 4 tablete nakon obroka i prije spavanja, do najviše 4 puta na dan.

Djeca mlađa od 12 godina lijek ne smiju koristiti, osim prema preporuci liječnika.

Ako uzmete više Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje nego što ste trebali

Ako ste uzeli previsoku dozu lijeka, možete osjetiti nadutost. Iako nije vjerojatno da će Vam visoka doza lijeka naškoditi, molimo da se obratite liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu. Iduću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Ukoliko primijetite navedene nuspojave, prekinite primjenu lijeka i odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Vrlo rijetko (u manje od 1 na 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek) zabilježena je pojava alergijskih reakcija na sastojke lijeka uključujući anafilaktičke i anafilaktoidne reakcije. Simptomi mogu uključivati osip na koži, svrbež, otežano disanje, omaglicu te oticanje lica, usana, jezika ili grla.

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje sadrže

- Djelatne tvari su natrijev alginat, natrijev hidrogenkarbonat i kalcijev karbonat. Jedna tableta sadrži 250 mg natrijevog alginata, 133,5 mg natrijevog hidrogenkarbonata i 80 mg kalcijevog karbonata.
- Pomoćne tvari su manitol (E421), makrogol 20 000, kopovidon, aspartam (E951), okus peperminta, magnezijev stearat i acesulfamkalij.

Ove tablete ne sadrže šećer niti gluten.

Kako Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje izgledaju i sadržaj pakiranja

Gaviscon s okusom peperminta 250 mg/133,5 mg/80 mg tablete za žvakanje su okrugle tablete, gotovo bijele do krem boje, lagano prošaranog izgleda, nominalnog promjera 13,00 mm, debljine 4,7 mm.

16 tableta za žvakanje

24 tablete za žvakanje

U prometu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 269 D,
10 000 Zagreb

Proizvođač

RB NL Brands B.V.,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana 08. lipnja 2021.