

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Geonistin 100 mg/100 000 IU tablete za rodnicu oksitetraciklin, nistatin

#### **Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### **Što se nalazi u ovoj uputi:**

1. Što je Geonistin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Geonistin
3. Kako uzimati Geonistin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Geonistin tablete za rodnicu
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### **1. Što je Geonistin i za što se koristi**

Geonistin se koristi za lokalno liječenje infekcije rodnice, vulve i grlića maternice uzrokovane gljivicom *Candidom albicans* i ostalim gljivicama i bakterijama osjetljivim na nistatin i oksitetraciklin (djelatne tvari Geonistina).

Geonistin se koristi i za sprječavanje infekcije rodnice, vulve i grlića maternice nakon ginekoloških zahvata (npr. kauterizacije), te za sprječavanje naknadnih gljivičnih infekcija kod već postojećih bakterijskih upala sluznice rodnice.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

#### **2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Geonistin**

##### **Nemojte uzimati Geonistin:**

- ako ste alergični na neku od djelatnih tvari lijeka (nistatin i/ili oksitetraciklin) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

##### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ili prije nego uzmete Geonistin.

- Liječenje se ne smije prekidati tijekom menstruacije.
- Ako se na sluznici pojavi lokalni nadražaj koji nije postojao prije liječenja, preporučuje se prekinuti liječenje.
- Tijekom liječenja treba se pridržavati higijenskih mjera, suzdržavati se od spolnog odnosa ili koristiti kondom kako bi se izbjegla infekcija partnera ili ponovna infekcija.
- Partner se istodobno treba liječiti nekom od protugljivičnih krema, zbog njegove i Vaše zaštite (moguća ponovna infekcija).

##### **Drugi lijekovi i Geonistin**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Za sada nisu poznate interakcije (međudjelovanja) između Geonistina i drugih lijekova.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Tijekom trudnoće i dojenja nisu uočeni štetni učinci Geonistina. Međutim, tablete za rodnicu se primjenjuju tijekom trudnoće samo ako Vam je to savjetovao Vaš liječnik.

### **3. Kako uzimati Geonistin**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Svake večeri navlažite vodom jednu tabletu i stavite je što dublje u rodnicu.

Liječenje obično traje 6 uzastopnih dana.

### **Ako uzmete više Geonistina nego što ste trebali**

Obratite se za savjet Vašem liječniku.

### **Ako ste zaboravili uzeti Geonistin**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Obratite se za savjet Vašem liječniku.

### **Ako prestanete uzimati Geonistin**

Geonistin uzimajte onoliko dugo koliko Vam je to preporučio Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Pri primjeni ovoga lijeka zabilježene su sljedeće nuspojave:

**Vrlo rijetke nuspojave** (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- iritacija vaginalne sluznice

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

### **5. Kako čuvati Geonistin**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

### **Što Geonistin sadrži**

- Djelatne tvari su oksitetraciklin i nistatin.

- Jedna Geonistin tableta za rodnicu sadrži 100 mg oksitetraciklina u obliku oksitetraciklinklorida i 100 000 IU (internacionalnih jedinica) nistatina.

Druge pomoćne tvari su: laktoza hidrat; kukuruzni škrob; hidroksipropilceluloza; dekstrin; hidrogenirano biljno ulje, vrst I; mikrokristalična celuloza; natrijev stearilfumarat; hipromeloza; umrežena karmelozanatrij,

### **Kako Geonistin izgleda i sadržaj pakiranja**

Geonistin tablete za rodnicu su svijetlo žute marmorirane tablete s natpisom PLIVA s jedne strane tablete, dimenzija 23 mm x 13,3 mm.

Geonistin tablete za rodnicu dostupne su u pakiranju od 6 tableta za rodnicu u blisteru, u kutiji.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

PLIVA HRVATSKA d.o.o.

Prilaz baruna Filipovića 25 10 000 Zagreb

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana 30. studenog 2020.**