

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Iberogast oralne kapi, tekućina

9 biljnih pripravaka

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Iberogast i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Iberogast
3. Kako uzimati Iberogast
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Iberogast
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Iberogast i za što se koristi

Iberogast je biljni lijek za probavne poremećaje.

Iberogast se koristi za simptomatsko liječenje funkcionalnih i motilitetom uvjetovanih probavnih smetnji, primjerice funkcionalne dispepsije i sindroma nadražnog crijeva, uključujući probavne grčeve kao i za potporno simptomatsko liječenje gastritisa.

Smetnje se uglavnom manifestiraju simptomima poput bolova u želucu, osjećaja punoće, meteorizma (nadutosti), probavnih grčeva, mučnine i žgaravice.

Iberogast je namijenjen za primjenu u djece starije od 6 godina, adolescenata i odraslih.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Iberogast

Nemojte uzimati Iberogast

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- djeca mlađa od 6 godina
- ako imate ili ste imali bolest jetre ili uzimate lijekove s nuspojavom oštećenja jetre navedenom u uputi o lijeku. Ako ste u nedoumici pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Iberogast.

U slučaju poznate bolesti jetre ili sumnje na bolest jetre potražite savjet liječnika prije nego uzmete Iberogast. Ukoliko istodobno uzimate lijekove koji mogu oštetiti jetru potražite savjet liječnika prije nego uzmete Iberogast.

Ako primijetite žutilo kože ili očiju, tamnu mokraću, stolicu svijetle boje, bol u gornjem dijelu trbuha, trebate odmah prestati uzimati lijek Iberogast i obratiti se liječniku. To mogu biti simptomi oštećenja jetre.

Ako u slučaju prve primjene lijeka Iberogast simptomi i dalje traju nakon tjedan dana primjene lijeka potrebno je savjetovati se s liječnikom. Ako se simptomi pogoršaju za vrijeme uzimanja lijeka Iberogast ili primijetite nove simptome, morate potražiti savjet liječnika.

Djeca

Iberogast se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako se Vaši simptomi ne poboljšaju u roku od 7 dana ili se pogoršaju, posjetite liječnika kako biste isključili druge ozbiljne bolesti.

Drugi lijekovi i Iberogast

Dosad nema poznatih interakcija.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Iberogast s hranom i pićem

Dosad nema poznatih interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje podaci, ili su ograničeni, o primjeni lijeka Iberogast u trudnica. Ispitivanja na životinjama ne ukazuju na izravne ili neizravne štetne učinke u odnosu na reproduktivnu toksičnost.

Kao mjera opreza ne preporučuje se primjena lijeka Iberogast tijekom trudnoće.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o izlučivanju lijeka Iberogast / njegovih metabolita u ljudsko mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Obratite se liječniku koji će donijeti odluku o prestanku dojenja ili prestanku uzimanja lijeka Iberogast uzimajući u obzir korist dojenja djeteta i korist terapije za ženu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ukoliko se primjenjuje u skladu s uputama i preporučenom dozom, ne očekuje se da Iberogast smanjuje sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rada na strojevima.

Iberogast sadrži etanol

Ovaj lijek sadrži 31 vol % etanola (alkohola) tj. do 240 mg po dozi, što odgovara 6,2 ml piva, 2,6 ml vina po dozi. Štetno za osobe koje pate od alkoholizma. Treba uzeti u obzir u trudnica ili dojilja, djece i visokorizičnih skupina kao što su pacijenti s bolešću jetre ili epileptičari.

3. Kako uzimati Iberogast

Doziranje i način uporabe


Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Protresti prije uporabe!

Držati bočicu s kapaljkom pod kutem od 45° prilikom kapanja. Zatvoriti čvrsto zelenim čepom nakon primjene.

Iberogast se uzima prije ili tijekom obroka u malo tekućine.

Upute za prvo korištenje kapaljke



1. Skinuti poklopac i ukloniti bijeli dio.
2. Zeleni poklopac zavrnuti i stegnuti rukom kako bi se umetnula kapaljka.
3. Osigurati da je kapaljka dobro umetnuta.

Preporučena doza je:

odrasli i adolescenti stariji od 12 godina: 3 puta dnevno po 20 kapi
djeca od 6 do 12 godina: 3 puta dnevno po 15 kapi

Iberogast se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Duljina primjene lijeka nije ograničena i ovisi o vrsti, ozbiljnosti i tijeku bolesti.

Ako u slučaju prve primjene lijeka Iberogast simptomi i dalje traju nakon tjedan dana primjene lijeka potrebno je savjetovati se s liječnikom. Ako se simptomi pogoršaju za vrijeme uzimanja lijeka Iberogast ili primijetite nove simptome, morate potražiti savjet liječnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više lijeka Iberogast nego što ste trebali

Do sada nije bilo slučajeva akutnog predoziranja. Međutim, potreban je oprez zbog sadržaja alkohola.

Ako slučajno uzmete 1 do 2 pojedinačne doze (40 do 60 kapi) lijeka Iberogast više od propisane, u pravilu to neće imati nikakvo negativno djelovanje. Sljedeći put uzmite lijek prema uputi ili kako vam je liječnik odredio.

Ako uzmete veću dozu od preporučene obavijestite liječnika, koji će donijeti odluku o mjerama koje su potrebne.

Ako ste zaboravili uzeti Iberogast

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Ako ste zaboravili uzeti Iberogast nastavite uzimati lijek sljedeći put kako je navedeno u uputi o doziranju ili kako Vam je propisao liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

U vrlo rijetkim slučajevima mogu se javiti alergijske reakcije poput svrbeža, otežanog disanja ili kožne reakcije.

Učestalost nepoznata: zabilježeni su slučajevi oštećenja jetre (povećanje vrijednosti jetrenih enzima, žutica povezana s lijekom, hepatitis i zatajenje jetre); ako primijetite simptome poput žute boje kože ili očiju, tamne mokraće i stolice svijetle boje, trebate odmah prestati uzimati lijek Iberogast i obratiti se liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Iberogast

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati pri temperaturi do 25 °C.

Flokulacija ili zamućenost lijeka Iberogast nemaju učinak na njegovu djelotvornost.

Nakon otvaranja bočice Iberogast se može čuvati najviše osam tjedana.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Iberogast sadrži

100 mL oralnih kapi, tekućine sadrži tekuće ekstrakte iz:

<i>Iberis amara</i> L., totum (gorka ognjica)	(1 : 1,5-2,5)	15 ml
--------------------------------------------------	---------------	-------

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 50 % V/V

<i>Angelica archangelica</i> L. (<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.), radix (anđelikin korijen)	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------

<i>Matricaria recutita</i> L. (<i>Chamomilla recutita</i> (L.) Rauschert), flos	(1 : 2-4)	20 ml
----------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------

(kamiličin cvijet)		
<i>Carum carvi</i> L., fructus	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
(kimov plod)		
<i>Silybum marianum</i> L. Gaertner, fructus	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
(sikavičin plod)		
<i>Melissa officinalis</i> L., folium	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
(matičnjakov list)		
<i>Mentha x piperita</i> L., folium	(1 : 2,5-3,5)	5 ml
(list paprene metvice)		
<i>Chelidonium majus</i> L., herba	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
(zelen običnog rosopasa)		
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L., radix	(1 : 2,5-3,5)	10 ml
(sladićev korijen)		
Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % V/V		

Kako Iberogast izgleda i sadržaj pakiranja

Oralne kapi, tekućina. Bistra do slabo zamućena tekućina, tamnosmeđe boje.

Iberogast oralne kapi, tekućina je dostupan u pakiranjima od 20 ml, 50 ml i 100 ml u smeđoj staklenoj cilindričnoj bočici zatvorenoj dvodjelnim bijelo-zelenim plastičnim zatvaračem s plastičnim umetkom za kapanje, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Bayer d.o.o.
Radnička cesta 80
10000 Zagreb

Proizvođač

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5
64295 Darmstadt, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana 18. kolovoza 2022.