

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

ISOPTO TEARS 5 mg/ml kapi za oko, otopina hipromeloza

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Isopto Tears i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Isopto Tears
3. Kako primjenjivati Isopto Tears
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Isopto Tears
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Isopto Tears i za što se koristi

Isopto Tears kapi sadrži tvar pod nazivom hipromeloza koja djeluje kao umjetne suze.

Liječnik ili ljekarnik će Vam preporučiti ovaj lijek u slučaju da imate poremećaj suhog oka ili osjećate iritacije koje su uzrokovane nedostatkom suza u oku. Isopto Tears koristi se kao lubrikantno sredstvo kod umjetnih očiju.

Isopto Tears sadrži tvar koja čini lijek malo gušćim od vode i omogućuje lijeku da podmazuje oko.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Isopto Tears

Nemojte primjenjivati Isopto Tears:

- ako ste alergični na hipromelozu ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Isopto Tears.

- ako osjetite glavobolju, bol u oku, promjene vida, iritaciju u očima, crvenilo koje ne prestaje, ili se stanje pogoršava ili nastavlja, prekinite primjenu i potražite savjet liječnika.

Drugi lijekovi i Isopto Tears

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vid Vam može biti zamagljen neko vrijeme nakon primjene Isopto Tears. Nemojte upravljati vozilom ili strojevima dok Vam se ne razbistri vid.

Isopto Tears sadrži benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0.0035 mg benzalkonijevog klorida u jednoj kapljici, što odgovara 0.1 mg/ml.

Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća. Benzalkonijev klorid može također uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaje rožnice (prozirni sloj prednjeg dijela oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

Isopto Tears sadrži fosfatne pufere:

Ovaj lijek sadrži 0.24 mg fosfata u svakoj kapi, što je ekvivalentno 6.73 mg / ml.

Ako bolujete od teškog oštećenja prozirnog sloja prednjeg dijela oka (rožnice), u vrlo rijetkim slučajevima fosfati mogu uzrokovati mutne mrlje na rožnici zbog nakupljanja kalcija tijekom liječenja.

3. Kako primjenjivati Isopto Tears

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nakon skidanja zatvarača, ukoliko je zaštitni obruč s evidencijom otvaranja klimav, uklonite ga prije primjene lijeka.

Isopto Tears upotrebljavajte samo kao kapi za oko.

Odrasli (uključujući starije osobe) i djeca


Uobičajeno doziranje je jedna ili dvije kapi u oboljelo oko/oči 3 – 4 puta dnevno ili prema preporuci liječnika ili ljekarnika.

Ako se iritacija u oku ne poboljša ili se pogorša nakon 3 dana, potrebno je prekinuti primjenu lijeka i obavijestiti liječnika.


Isopto Tears je pakiran u posebno dizajniranom pakiranju s kapaljkom zbog lakše primjene. Slijedite niže navedene upute za pravilnu primjenu ovog lijeka.

Da bi spriječili kontaminaciju sadržaja ne dodirujte kapaljkom okolne površine.


Praćenjem slijedećih 10 koraka osigurat ćete pravilnu primjenu i najbolju djelotvornost lijeka.



1



2



3

1. Prije ukapavanja dobro oprati ruke.
2. Uzmite bočicu lijeka i ogledalo.
3. Otvorite poklopac.
- 4. Izbjegavajte dodir kapaljke s okom, prstima ili drugom površinom.**
5. Bočicu držite okrenutu naopako, između palca i srednjeg prsta.
6. Donju vjeđu lagano povucite prema dolje, tako da nastane spojnični džep između očne jabučice i same donje vjeđe.
7. Vrh kapaljke približite oku. Laganim pritiskom kažiprsta na dno okrenute bočice istisnite po jednu kapljicu lijeka.
8. Nakon ukapavanja lijeka otpustite donju vjeđu, zatvorite oko i trepnite nekoliko puta da otopina prekrije površinu cijelog oka.
9. Ako primjenjujete kapljice na oba oka, ponovite ove korake na drugom oku.
10. Bočicu dobro zatvorite nakon primjene.

Ako kap promaši oko, pokušajte ponovno.

Ako primijenite više Isopto Tears kapi nego što ste trebali, nisu očekivane dodatne nuspojave.

Ako koristite i druge kapi ili masti za oko, pričekajte najmanje 5 minuta između primjene svakog lijeka. Masti za oko trebaju se primijeniti zadnje.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s Isopto Tears. Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

- Nuspojave na oku: zamagljen vid, bol u oku, osjećaj stranoga tijela u oku, iritacija oka, crvenilo oka, alergija oka i svrbež oka.
- Nuspojave na tijelu: alergijska reakcija (preosjetljivost).

U vrlo rijetkim slučajevima, neki bolesnici s teškim oštećenjem bistrog sloja prednjeg dijela oka (rožnice), razvili su mrlje na rožnici zbog ugradnje kalcija tijekom liječenja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Isopto Tears

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Bočicu držite dobro zatvorenom.

Čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Rok valjanosti lijeka nakon otvaranja bočice iznosi 4 tjedna.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici i kutiji iza oznake „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Isopto Tears sadrži

- Djelatna tvar je hipromeloza. Jedan ml kapi sadrži 5 mg hipromeloze.
- Drugi sastojci su natrijev citrat; natrijev hidrogenfosfat, bezvodni; natrijev dihidrogenfosfat, hidrat; natrijev klorid; benzalkonijev klorid i pročišćena voda.

Kako Isopto Tears izgleda i sadržaj pakiranja

Isopto Tears kapi su bistra, bezbojna, blago viskozna tekućina. Dostupne su u plastičnoj bočici od 15 ml s nastavkom za kapanje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Alcon Farmaceutika d.o.o.
Avenija Dubrovnik 16
10160 Zagreb

Proizvođač:

S.A. Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, 2870 Puurs, Belgija

ili

Alcon Laboratories Belgium, Lichterveld 3, 2870 Puurs-Sint-Amunds, Belgija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova je uputa zadnji puta revidirana u studenom 2023.