Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Karbocistein Alkaloid-INT 375 mg tvrde kapsule
karbocistein

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Karbocistein Alkaloid-INT i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Karbocistein Alkaloid-INT
3. Kako uzimati Karbocistein Alkaloid-INT
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Karbocistein Alkaloid-INT
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Karbocistein Alkaloid-INT i za što se koristi

Karbocistein Alkaloid-INT 375 mg tvrde kapsule (zvane Karbocistein Alkaloid-INT u ovoj uputi) sadrže djelatnu tvar koja se naziva karbocistein. Djeluje tako što razrjeđuje sluz u dišnim putevima koja se potom lakše iskašljava.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Karbocistein Alkaloid-INT

Nemojte uzimati Karbocistein Alkaloid-INT
- ako ste alergični na karbocistein ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- kod djece mlađe od 2 godine.
- ako imate čir na želucu ili crijevima.

Upozorenja i mjere opreza
Zabilježeni su slučajevi želučanog ili crijevnog krvarenja kod primjene karbocisteina u starijih osoba. Ako se pojave želučano ili crijevno krvarenje, prestanite uzimati ovaj lijek te se obratite svom liječniku ili ljekarniku:
- ako imate, ili ste ikad imali čir na želucu ili crijevima. Nemojte prekoračiti navedenu dozu i obavijestite liječnika ako simptomi ustraju.
- ako uzimate druge lijekove za koje je poznato da uzrokuju krvarenje u želucu. Ako se pojave želučano ili crijevno krvarenje, prestanite uzimati ovaj lijek

HALMED
14 - 10 - 2026
ODOBRENO

Drugi lijekovi i Karbocistein Alkaloid-INT
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ne preporučuje se uzimanje lijeka tijekom prva tri mjeseca trudnoće.
Nisu poznati učinci lijeka u dojilja.

Karbocistein Alkaloid-INT sadrži natrij
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Karbocistein Alkaloid-INT

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli
Preporučena doza je dvije kapsule 3 puta na dan. Progutajte kapsule s dovoljno vode.

Primjena u djece
Karbocistein Alkaloid-INT 375 mg tvrde kapsule ne smiju uzimati djeca mlađa od 2 godine. Lijek nije prikladan za djecu mlađu od 18 godina pa ga uzimajte samo ako ste odrasli.

Ovaj lijek se ne smije uzimati duže od 5 dana. Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 5 dana.

Ako uzmete više kapsula Karbocistein Alkaloid-INT nego što ste trebali
Obavijestite svog liječnika čim prije.

Ako ste zaboravili uzeti Karbocistein Alkaloid-INT
Ako ste zaboravili uzeti dozu, propuštenu dozu uzmite čim prije. Ipak, ako je ubrzo vrijeme za Vašu sljedeću dozu, propuštenu dozu preskočite te nastavite uobičajeni raspored doziranja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Pri primjeni ovog lijeka mogu se javiti sljedeće nuspojave:

HALMED
14 - 10 - 2026
ODOBRENO

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):
- bol u gornjem dijelu trbuha i mučnina

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):
- povraćanje i proljev

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
- teške, životno ugrožavajuće reakcije preosjetljivosti (anafilaktičke reakcije)
- upale kože s mjehurićima, poput osipa s nepravilnim crvenim točkama (multiformni eritem) ili teških kožnih nuspojava s vrućicom, mjehurićima na koži, boli u zglobovima i/ili upalom oka (Stevens-Johnsonov sindrom
- kožne reakcije, uključujući crvene kvržice na koži, oštro ograničeno uzdignuto područje s crvenilom i ponekad mjehurićima, uvijek na istom mjestu (fiksna erupcija izazvana lijekom)
- kožni osip s jakim svrbežom, koji se pojavi iznenada i obično nestane nakon kratkog vremena
- krv u povraćenom sadržaju ili crna, katranasta stolica.

Ako imate - ili ste ikad imali - čir na želucu ili dvanaesniku, karbocistein može štetno utjecati na sluznicu Vašeg želuca ili crijeva.

Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Karbocistein Alkaloid-INT

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 30°C.
Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Karbocistein Alkaloid-INT sadrži

- Djelatna tvar je karbocistein. Jedna kapsula sadrži 375 mg karbocisteina.
- Drugi sastojci su:
  Sadržaj kapsule: manitol, kukuruzni škrob, umrežena karmelozanatrij, natrijev laurilsulfat, bezvodni koloidni silicijev dioksid i magnezijev stearat.
  Ovojnica kapsule: želatina, crveni željezov oksid (E172), titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid (E172).

HALMED
14 - 10 - 2026
ODOBRENO

Kako Karbocistein Alkaloid-INT izgleda i sadržaj pakiranja

Karbocistein Alkaloid-INT su tvrde želatinske kapsule napunjene homogenim bijelim praškom. Boja tijela kapsule i kapice kapsule je tamnožuta neprozirna. Dimenzije svake kapsule su približno 19,4 ± 0,3 mm. Kapsule su pakirane u blistere od prozirne tvrde PVC/PVDC/aluminijske folije. Jedan blister sadrži 10 kapsula.
Veličine pakiranja: 20 ili 30 kapsula.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Alkaloid-INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
Tel.: + 386 1 300 42 90
Fax: + 386 1 300 42 91
email: info@alkaloid.si

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 6311 920
Fax: +385 1 6311 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2026.

HALMED
14 - 10 - 2026
ODOBRENO