

UPUTA O LIJEKU: INFORMACIJA ZA KORISNIKA

Lacydyna 2 mg filmom obložene tablete

Lacydyna 4 mg filmom obložene tablete

Lacydyna 6 mg filmom obložene tablete

lacidipin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek .

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi (pogledajte dio 4).

U ovoj uputi:

1. Što je Lacydyna i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Lacydyna
3. Kako uzimati lijek Lacydyna
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Lacydyna
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. ŠTO JE LACYDYNA I ZA ŠTO SE KORISTI

Lacydyna tablete sadrže lijek koji se zove lacidipin. Ubraja se u skupinu lijekova pod nazivom blokatori kalcijevih kanala. Lacidipin djeluje tako da opušta krvne žile što rezultira njihovim širenjem. To olakšava protjecanje krvi i snižava krvni tlak.

Redovito uzimanje lijeka Lacydyna, sukladno uputama Vašeg liječnika, pomoći će Vam sniziti krvni tlak odnosno u liječenju hipertenzije.

2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK LACYDYNA

Nemojte uzimati lijek Lacydyna:

- ako ste alergični (preosjetljivi) na lacidipin, neki drugi lijek iz skupine blokatora kalcijevih kanala ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako imate bolest srca koja se naziva stenoza aorte. To je suženje srčanog zaliska koje otežava otjecanje krvi iz srca.

Ako mislite da se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati lijek Lacydyna. Ako niste sigurni, posavjetujte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Budite posebno oprezni s lijekom Lacydyna:

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja lijeka:

- ako imate nepravilan rad srca ili bilo koje druge probleme sa srcem
- ako imate ili ste imali bilo kakav problem s jetrom

- ako ste unutar zadnjih mjesec dana imali srčani udar ili ako osjećate bol u prsima (angina).

Djeca i adolescenti

Lacydyna se ne smije davati djeci i adolescentima u dobi do 18 godina.

Drugi lijekovi i Lacydyna

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući i one bez recepta. To se odnosi i na biljne lijekove. To je važno jer Lacydyna može utjecati na učinak drugih lijekova. Također, drugi lijekovi mogu utjecati na učinak lijeka Lacydyna.

Posebice, obavjestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate neke od sljedećih lijekova:

- lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka
- lijekove za liječenje gljivičnih infekcija
- lijekove za kontrolu srčanog ritma koji se nazivaju antiaritmici
- lijekove za liječenje depresije koji se nazivaju triciklički antidepresivi
- antibiotike (npr. rifampicin)
- lijekove za liječenje epilepsije
- cimetidin - lijek za liječenje želučanih tegoba
- ciklosporin (imunosupresivni lijekovi koji se primjenjuju u bolesnika s transplantiranim organom)
- kortikosteroide ili tetrakosaktid za liječenje upalne bolesti crijeva, Chronove bolesti, artitisa ili osteoartritisa

Ako radite bilo kakve pretrage krvi, recite zdravstvenom djelatniku koja radi pretragu da uzimate lijek Lacydyna jer ovaj lijek može utjecati na nalaze pretraga jetrene funkcije.

Lacydyna s hranom i pićem

Ovaj lijek možete uzimati na prazan želudac ili s hranom. Tijekom liječenja nemojte piti sok od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Ne uzimajte lijek Lacydyna ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili dojite. Ako planirate trudnoću, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omaglicu. Ako osjetite tu nuspojavu, ne upravljajte vozilima niti strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lacidipin tableta

Lacydyna sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK LACYDYNA

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite se s Vašim liječnikom ako niste sigurni.

Važno je uzimati točan broj tableta u pravo vrijeme.

- Uobičajena početna doza je 2 mg na dan, po mogućnosti ujutro, sa ili bez hrane.
- Nakon 3-4 tjedna doza se može povećati na 4 mg svako jutro.
- Ako je potrebno, doza se može dodatno povećati na 6 mg svakoga jutra, što je i najveća dnevna doza.
- Progutajte cijelu tabletu s vodom.
- Tijekom liječenja nemojte piti sok od grejpa.

Ako uzmete više lijek Lacydyna nego što ste trebali

Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, odmah se javite Vašem liječniku ili otidite u bolnicu. Ponesite kutiju lijeka sa sobom, čak i ako više nema tableta. Možda će Vam biti potrebno liječenje. Predoziranje može uzrokovati nepravilan srčani ritam, brzo i plitko disanje, niski krvni tlak, hladnu i vlažnu kožu, omaglicu, nesvjesticu, slabost i mučninu.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Lacydyna

Ako ste zaboravili uzeti uobičajenu dozu lijeka ujutro, istog tog dana uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako se sjetite tek sljedeći dan, uzmite svoju uobičajenu dozu toga jutra. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

- bol u prsima (angina), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava.

Prema učestalosti, nuspojave navedene u nastavku mogu se klasificirati kao:

- Vrlo česte: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba
- Česte: mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba
- Manje česte: mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba
- Rijetke: mogu se javiti u najviše 1 na 1000 osoba
- Vrlo rijetke: mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba
- Nije poznato: učestalost se ne može utvrditi iz postojećih podataka

Česte nuspojave

- glavobolja
- omaglica
- crvenilo lica
- ubrzano ili nepravilno lupanje srca (palpitacije)
- nelagoda u trbuhu ili mučnina

- kožni osip
- učestalo mokrenje (poliurija)
- osjećaj slabosti (astenija)
- oticanje (edem), osobito u području gležnjeva
- promjene u laboratorijskim nalazima funkcije jetre

Manje česte nuspojave

- bol u prsima (angina), uključujući i bol u prsima koja se pogoršava
- nizak krvni tlak (hipotenzija)
- nesvjestica
- oticanje zubnog mesa (gingivalna hiperplazija)

Rijetke nuspojave

- angioedem (alergijska reakcija koja uzrokuje oticanje lica)
- kožni osip koji svrbi (koprivnjača/urtikarija)
- grčevi u mišićima

Vrlo rijetke nuspojave

- nevoljno drhtanje
- depresija

Nije poznato

- nevoljno drhtanje ili tikovi i promjene u tonusu mišića te njihova slabija pokretljivost

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. KAKO ČUVATI LIJEK LACYDYNA

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte lijek u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtjeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Lacydyna se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekove nikada nemojte baciti u odvod ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Što Lacydyna sadrži

Djelatna tvar je lacidipin. Jedna filmom obložena tableta sadrži 2 mg ili 4 mg ili 6 mg lacidipina.

Ostali sastojci su laktoza, povidon i magenzijev stearat. Ovojnica sadrži hipromelozu i titanijev dioksid.

Kako Lacydyna izgleda i sadržaj pakiranja

Lacydyna 2 mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje, s utisnutom oznakom '2' na jednoj strani.

Lacydyna 4 mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje, s razdjelnim urezom na obje strane i utisnutom oznakom '4' na jednoj strani. Tablete se mogu podijeliti na dvije jednake doze.

Lacydyna 6 mg filmom obložene tablete su tablete bijele boje s utisnutim '6' na jednoj strani.

Tablete su dostupne u aluminijski/aluminijski blister pakiranjima od 28, 56 ili 98 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet

DOUBLE-E PHARMA Ltd.
17 Corrig Road, Sandyford
Dublin 18
Irska

Proizvođač lijeka

Holsten Pharma GmbH
Hahnstraße 31-35
60528 Frankfurt am Main
Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PONTUS PHARMA d.o.o
Ulica kralja Zvonimira 62
10 000 Zagreb
tel: 385 91 3460153

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2022.