

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Lamisil 250 mg tablete terbinafin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Lamisil i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamisil
3. Kako uzimati Lamisil
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lamisil
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Lamisil i za što se koristi

Terbinafin, djelatna tvar Lamisil tableta, je lijek protiv gljivica. Lamisil se koristi za liječenje brojnih gljivičnih infekcija kože i noktiju.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Lamisil

Neki ljudi NE SMIJU uzimati Lamisil. Nemojte uzimati Lamisil

- ako ste alergični na terbinafin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste imali ili imate bolest jetre.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lamisil.

Ako ste imali ili imate bolest jetre, ne smijete uzimati Lamisil.

Morate si postaviti sljedeća pitanja prije uzimanja lijeka Lamisil. Ako je odgovor na bilo koje od njih DA, obratite se liječniku ili ljekarniku jer u tom slučaju Lamisil možda nije odgovarajući lijek za Vas.

- Jeste li trudni ili pokušavate zatrudnjeti?
- Dojite li?
- Imate li problema s bubrezima?
- Imate li psorijazu?
- Imate li sistemski eritematozni lupus (SLE)?
- Imate li osip uzrokovan lijekom, s visokom razinom specifične vrste bijelih krvnih stanica?
- Imate li smanjen broj određenih krvnih stanica u organizmu?

Djeca

Lamisil se ne smije davati djeci.

Drugi lijekovi i Lamisil

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na Vaše liječenje. Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- rifampicin za infekcije
- cimetidin za želučane probleme kao što su loša probava ili vried
- antidepresive koji uključuju tricikličke antidepresive (npr. desipramin), selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) ili inhibitore monoamino oksidaze (MAOI)
- oralne kontraceptive (budući da se u nekih bolesnica mogu javiti nepravilni ciklusi i probojna krvarenja)
- beta-blokatore ili antiaritmike za srčane probleme
- varfarin, lijek koji se koristi za razrjeđivanje krvi
- lijekove za liječenje srčanih tegoba (npr. propafenon, amiodaron)
- ciklosporin, lijek koji se koristi za kontroliranje imunološkog sustava kako bi se spriječilo odbacivanje transplantiranih organa
- lijekove koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija (npr. flukonazol, ketokonazol)
- lijekove koji se koriste za liječenje kašlja (npr. dekstrometorfan)
- kofein

Ako uzimate neke lijekove koje ste nabavili bez recepta, također obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Liječnik će Vam napraviti krvne pretrage prije i tijekom liječenja lijekom Lamisil kako bi pratio funkciju jetre.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Lamisil se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće.

Lamisil ne smijete primjenjivati ako dojite, jer se terbinafin izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neke su osobe prijavile osjećaj omaglice tijekom uzimanja lijeka Lamisil. Ako se tako osjećate, ne smijete upravljati vozilima niti raditi sa strojevima.

Lamisil sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Lamisil

Vaš će liječnik odrediti koju dozu Lamisila trebate uzimati. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ako niste sigurni.

Nastavite uzimati tablete toliko dugo koliko Vam je rečeno osim ako imate neke tegobe. U tom slučaju, provjerite sa svojim liječnikom.

Uobičajena doza za odrasle osobe, što uključuje i starije osobe, iznosi 250 mg jedanput na dan.

- Za kožne infekcije uzimajte tablete od **2 do 6 tjedana**.
- Za infekcije noktiju liječenje uglavnom traje od **6 tjedana do 3 mjeseca**, iako neke bolesnike s infekcijama noktiju noge može biti potrebno liječiti **6 mjeseci ili dulje**.
- Ako Vam bubrezi ne funkcioniraju dobro, liječnik će možda smanjiti dozu lijeka Lamisil koju trebate uzimati.

Tabletu progutajte cijelu uz čašu vode, na prazan želudac ili nakon obroka. Po mogućnosti je uzimate u isto vrijeme svakog dana.

Ako uzmete više Lamisila nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Lamisil tableta nego što ste trebali, obavijestite svog liječnika ili otidite u hitnu službu najbliže bolnice što je prije moguće. Uzmite pakiranje lijeka sa sobom, kako bi medicinsko osoblje moglo vidjeti što ste uzeli. Možete osjetiti glavobolju, mučninu, bol u truhu ili omaglicu.

Ako ste zaboravili uzeti Lamisil

Ako propustite uzeti Lamisil tabletu, ne brinite, uzmite je čim se sjetite. Sljedeću tabletu uzmite u uobičajeno vrijeme, a zatim nastavite prema planu dok ne popijete sve tablete. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Lamisil

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su obično blage do umjerene i prolazne.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne. Prestanite uzimati lijek Lamisil i odmah se obratite liječniku ili otidite u hitnu službu najbliže bolnice ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma:

- žutilo kože ili očiju, neuobičajeno tamnu mokraću ili bljedu stolicu, neobjašnjivu trajnu mučninu, želučane tegobe, gubitak apetita ili neuobičajeni umor ili slabost (to bi moglo upućivati na probleme s jetrom), povišenje vrijednosti jetrenih enzima, što se može primijetiti na nalazu krvnog testa
- teške kožne reakcije koje uključuju osip, osjetljivost na svjetlost, stvaranje mjehura ili urtika
- slabost, neuobičajeno krvarenje, stvaranje modrica, abnormalno bljedu kožu, neuobičajeni umor, ili slabost ili nedostatak zraka uslijed napora ili učestale infekcije (to bi mogao biti znak krvnih poremećaja)
- poteškoće u disanju, omaglicu, oticanje uglavnom lica i grla, crvenilo uz osjećaj vrućine, bolove u truhu s grčevima, ukočenost, osip, vrućicu ili natekle/povećane limfne čvorove (mogući znakovi teških alergijskih reakcija).
- simptome kao što su osip, vrućica, svrbež, umor ili ako primijetite pojavu ljubičastih točaka ispod površine kože (znakovi upale krvnih žila)
- tešku bol u gornjem dijelu trbuha koja se širi na leđa (mogući znakovi upale gušterače)
- neobjašnjivu slabost ili bol mišića, ili tamnu (crveno-smeđu) mokraću (mogući znakovi razgradnje mišića).

Ostale nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- glavobolja
- želučane tegobe kao što su gubitak apetita, bol u truhu, loša probava, osjećaj nadutosti ili mučnina
- proljev
- osip i koprivnjača (urtikarija)
- bolovi u mišićima i zglobovima

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- depresija
- omaglica

- oštećenje vida
- umor
- gubitak osjeta okusa (ageuzija) i promjena osjeta okusa (disgeuzija). To se obično povlači u roku od nekoliko tjedana nakon prekida uzimanja lijeka. Međutim, vrlo mali broj bolesnika prijavio je produljeni poremećaj osjeta okusa.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- smanjenje broja crvenih krvnih stanica što može uzrokovati bljedilo kože te slabost ili nedostatak zraka (anemija)
- osjećaj tjeskobe
- zujanje i/ili zvonjava u ušima
- smanjen osjet dodira (hipoesteziya) ili osjećaj trnaca (parestezije)
- reakcije fotoosjetljivosti
- vrućica
- gubitak tjelesne težine (zbog promjene osjeta okusa)

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- opće loše stanje

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- smanjenje broja nekih krvnih stanica; možda ćete primijetiti da lakše krvarite ili dobivate modrice nego inače, ili možete lako dobiti neku infekciju, a te infekcije mogu biti teže nego što je uobičajeno
- kožne erupcije nalik psorijazi, ili pogoršanje postojeće psorijaze uključujući osip ili erupciju malih gnojnih mjehurića
- vrtoglavica
- gubitak kose
- nastup ili pogoršanje bolesti koja se naziva lupus (dugotrajna bolest sa simptomima koji uključuju kožni osip i bol u mišićima i zglobovima).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- potpuni ili djelomični gubitak osjeta njuha (koji može biti trajan)
- zamagljen vid, smanjena vidna oštrina
- oštećenje sluha, smanjen sluh
- simptomi nalik gripi
- povišena kreatin fosfokinaza u krvi (vidljivo krvnom pretragom)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Lamisil

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ako Vam liječnik kaže da prestanete uzimati Lamisil tablete, vratite sav neiskorišteni lijek ljekarniku kako bi ga uništio. Zadržite lijek samo ako Vam to kaže liječnik.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Lamisil sadrži

Lamisil tablete su okrugle, bjelkaste do žućkasto-bijele s urezom jednoj strani i oznakom 'LAMISIL 250' na drugoj, promjera oko 11 mm.

- Djelatna tvar je terbinafin. Jedna tableta sadrži 250 mg terbinafina (u obliku terbinafinklorida).
- Drugi sastojci su: magnezijev stearat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; hipromeloza; natrijev škroboglikolat i celuloza, mikrokristalična.

Lamisil tablete su dostupne u blister pakiranjima s po 14 tableta, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Novartis Hrvatska d.o.o.

Radnička cesta 37 b

10 000 Zagreb

Proizvođač lijeka

Lek d.d., PE PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava, 9220

Slovenija

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Njemačka

Novartis Farmacéutica S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 764

08013 Barcelona

Španjolska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2022.