

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Linex Baby prašak za oralnu suspenziju

žive liofilizirane bifidobakterije, mliječne bakterije BB-12

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 2 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Linex Baby i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Linex Baby?
3. Kako uzimati Linex Baby?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Linex Baby?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Linex Baby i za što se koristi?

Linex Baby je lijek, probiotik, koji sadrži mikroorganizme koji pomažu u uspostavljanju i održavanju uravnotežene crijevne mikroflore dojenčadi i djece.

Linex Baby prašak za oralnu suspenziju se upotrebljava za prevenciju te kao dodatna terapija u liječenju proljeva, nadutosti i ostalih probavnih smetnji koje su posljedica promjena u crijevnoj mikroflori.

Bifidobakterije se normalno nalaze u tankom i debelom crijevu. One održavaju kiselo-lužnatu ravnotežu potrebnu za normalno djelovanje enzima probavnog sustava, imunološkog sustava i pokretljivosti crijeva (peristaltiku), te dodatno sprječavaju umnožavanje štetnih bakterija. Crijevna mikroflora dojenčadi primarno sadrži ove bakterije i one se smatraju značajnim u ranom djetinjstvu.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Linex Baby?

Nemojte Vašem djetetu davati Linex Baby ako:

- je alergično na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ima poremećaj (opstrukciju) probavnog sustava koji otežava prolazak stolice
- ima oštećenje (perforaciju) ili je u riziku od nastanka oštećenja (perforacije) u probavnom sustavu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego Vašem djetetu date Linex Baby ako ono ima:

- tjelesnu temperaturu iznad 38 °C
- krv ili sluz u stolici
- proljev dulji od dva dana

- težak proljev praćen dehidracijom i gubitkom tjelesne težine
- proljev popraćen jakim bolima u trbuhu
- proljev i boluje od neke kronične bolesti (npr. dijabetesa, bolesti krvožilnog sustava) ili smanjene imunološke otpornosti organizma (npr. infekcija HIV-om)
- bolove u trbuhu nepoznatog uzroka.

Važno upozorenje za sve dobne skupine

Nadoknada izgubljene tekućine i elektrolita je neophodna tijekom liječenja proljeva.

Liječenje proljeva u dojenčadi i djece treba provoditi uz liječnički nadzor.

Drugi lijekovi i Linex Baby

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ukoliko Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koji se mogu nabaviti bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Mliječno kisele bakterije su poput ostalih bakterija, osjetljive na antibiotike. Zbog toga Linex Baby treba uzimati najmanje tri sata nakon uzimanja antibiotika.

Linex Baby s hranom i pićem

Dajte djetetu Linex Baby uz obrok jer će to osigurati maksimalnu učinkovitost lijeka.

Vaše dijete ne smije uzimati Linex Baby istovremeno s vrućim napitcima.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete lijek.

Linex Baby je namijenjen isključivo za djecu.

Upravljanje vozilima i strojevima

Linex Baby je namijenjen isključivo za djecu.

Nije poznat utjecaj Linex Baby na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

3. Kako uzimati Linex Baby?

Uvijek djetetu dajte ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

- Linex Baby se uzima kroz usta.
- Dajte djetetu Linex Baby uz jelo jer to osigurava maksimalnu učinkovitost lijeka.
- Nemojte davati djetetu Linex Baby istovremeno s vrućim napitcima.
- Liječenje proljeva u djece potrebno je provoditi uz nadzor liječnika.

Doziranje i trajanje primjene

Dojenčad i djeca do 2 godine: jedna vrećica, jedanput na dan.

Djeca od 2 do 12 godina: jedna vrećica, jedan do dva puta na dan (npr. ujutro i navečer).

Sadržaj vrećice treba istresti u čašu vode, soka ili mlijeka. Prašak se može umiješati i u dječju hranu.

Linex Baby možete davati djetetu za cijelo vrijeme trajanja simptoma.

U slučaju da proljev traje dulje od dva dana, trebete se obratiti liječniku.

Tijekom liječenja proljeva trebete nadoknaditi izgubljenu tekućinu i elektrolite.

Ako date djetetu više Linex Baby nego što ste trebali

Iako nisu prijavljeni slučajevi predoziranja, možete se za savijet obratiti Vašem liječniku ili ljekarniku u slučaju da ste djetetu dali više Linex Baby praška za oralnu suspenziju nego što ste trebali.

Ako ste zaboravili dati djetetu Linex Baby

Nemojte dati djetetu dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu. Jednostavno nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave nastale primjenom bifidobakterija su vrlo rijetke (zahvaćaju manje od 1 osobe na 10 000 ljudi). Moguća je pojava reakcije preosjetljivosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Linex Baby?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Linex Baby sadrži?

- Djelatna tvar: žive liofilizirane bifidobakterije, animalne, mliječne BB-12. Jedna vrećica sadrži najmanje 1×10^9 CFU živih liofiliziranih bifidobakterija, animalnih, mliječnih BB-12 *Bifidobacterium animalis subsp. lactis* (BB-12).
- Pomoćne tvari: maltodekstrin.

Kako Linex Baby izgleda i sadržaj pakiranja?

Bijeli do svijetlo bež prašak za oralnu suspenziju.

10 vrećica s 1,5 g praška, u kutiji.

20 vrećica s 1,5 g praška, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, 10000 Zagreb

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2019.