

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete

moksonidin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je MOKSONIDIN BELUPO i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati MOKSONIDIN BELUPO?
3. Kako uzimati MOKSONIDIN BELUPO?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati MOKSONIDIN BELUPO?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je MOKSONIDIN BELUPO i za što se koristi?

MOKSONIDIN BELUPO je lijek koji kao djelatnu tvar sadrži moksonidin. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju antihipertenzivi.

MOKSONIDIN BELUPO koristi se za liječenje visokoga krvnog tlaka (hipertenzije). Djeluje tako da opušta i širi krvne žile te na taj način snižava krvni tlak.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati MOKSONIDIN BELUPO?

Nemojte uzimati MOKSONIDIN BELUPO:

- ako ste alergični na moksonidin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate usporen rad srca (bradikardiju) prouzročen stanjem koje nazivamo sindrom bolesnoga sinusnog čvora ili AV blok 2. ili 3. stupnja
- ako imate zatajenje srca.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati MOKSONIDIN BELUPO. Ako niste sigurni, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete MOKSONIDIN BELUPO:

- ako imate poteškoću sa srcem koja se zove AV blok 1. stupnja
- ako imate tešku koronarnu arterijsku bolest ili nestabilnu anginu pectoris (bol u prsnom košu)
- ako imate problema s bubrezima. Vaš će liječnik možda trebati prilagoditi dozu lijeka.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

H A L M E D
12 - 01 - 2021
ODOBRENO

Drugi lijekovi i MOKSONIDIN BELUPO

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove.

To je zbog toga što ovaj lijek može utjecati na djelovanje nekih lijekova. Također neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje ovog lijeka.

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od ovih lijekova:

- druge lijekove za snižavanje povišenoga krvnog tlaka. MOKSONIDIN BELUPO može pojačati njihovo djelovanje.
- lijekove za liječenje depresije poput imipramina ili amitriptilina
- anksiolitike, sedative ili tablete za spavanje poput benzodiazepina
- beta blokatore (vidjeti dio **Ako prestanete uzimati MOKSONIDIN BELUPO**)
- MOKSONIDIN BELUPO tablete izlučuju se iz tijela putem bubrega takozvanom tubularnom ekskrecijom. Drugi lijekovi koji se na isti način izlučuju bubregom mogu utjecati na djelovanje MOKSONIDIN BELUPO tableta.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja ovog lijeka.

MOKSONIDIN BELUPO s hranom, pićem i alkoholom

Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.

Nemojte piti alkohol za vrijeme liječenja MOKSONIDIN BELUPO tabletama jer djelovanje alkohola može biti pojačano.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni ili biste mogli zatrudnjati, liječnik će preporučiti prestanak uzimanja MOKSONIDIN BELUPO tableta, ali i savjetovati koji drugi lijek trebate uzimati umjesto MOKSONIDIN BELUPO tableta.

Obavijestite Vašeg liječnika ako dojite ili planirate dojiti. MOKSONIDIN BELUPO tablete ne preporučuju se ženama tijekom dojenja. Liječnik može preporučiti uzimanje drugog lijeka ili prestanak dojenja.

Ako ste trudni ili dojite obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Za vrijeme uzimanja MOKSONIDIN BELUPO tableta možete osjećati izrazitu pospanost ili omaglicu. Ako se to dogodi, posavjetujte se s Vašim liječnikom prije upravljanja vozilima ili strojevima.

MOKSONIDIN BELUPO sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati MOKSONIDIN BELUPO?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.



Uzimanje ovog lijeka

Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.

Pokušajte uvijek uzimati tablete u isto doba dana. To će Vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Koliko uzeti

Uobičajena početna doza je 0,2 mg na dan.

Liječnik Vam može povećati dozu lijeka do najviše 0,6 mg dnevno. Ako Vam je liječnik rekao da uzimate 0,6 mg dnevno, tu dozu treba podijeliti u dvije doze (ujutro i navečer).

Maksimalna pojedinačna doza je 0,4 mg.

Ako imate problema s bubrežima, liječnik Vam može reći da smanjite dozu lijeka.

Primjena u djece i adolescenata

MOKSONIDIN BELUPO ne smije se davati djeci i mlađima od 18 godina.

Ako uzmete više MOKSONIDIN BELUPO tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli više MOKSONIDIN BELUPO tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili se javite najbližoj hitnoj medicinskoj službi. Ponesite pakiranje lijeka sa sobom.

Mogu se pojaviti sljedeći simptomi: glavobolja, pospanost (izrazita pospanost, sedacija), pad krvnog tlaka (hipotenzija), usporeni rad srca (bradikardija), omaglica (vrtoglavica), suha usta, povraćanje, umor, opća slabost i bol u truhu (abdominalna bol).

Ako ste zaboravili uzeti MOKSONIDIN BELUPO

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je uskoro vrijeme za sljedeću dozu lijeka, preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati MOKSONIDIN BELUPO

Nastavite uzimati lijek dok liječnik ne odluči da trebate prestati.

Ako trebate prestati uzimati lijek, liječnik će postupno snižavati dozu tijekom nekoliko tjedana. Ako uzimate još neki lijek za snižavanje visokoga krvnog tlaka (poput beta blokatora), liječnik će Vam reći koji lijek trebate prvi prestati uzimati. Na taj će se način Vaš organizam polako prilagoditi promjeni.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati MOKSONIDIN BELUPO i odmah se obratite Vašem liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih nuspojava - možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć:

- oticanje lica, usana ili usta (angioedem). Ta se nuspojava može dogoditi u manje od 1 na 100 bolesnika (manje često).

Ostale nuspojave uključuju:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- suha usta.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- bol u leđima

- glavobolja

- opća slabost (astenija)
- omaglica, vrtoglavica
- osip ili svrbež (pruritus)
- poteškoće sa snom (nesanica), pospanost (izrazita pospanost)
- mučnina, proljev, povraćanje, probavne smetnje (dispepsija).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- bol u vratu
- nervoza
- nesvjestica (sinkopa)
- otekline (edem)
- šum/zvonjava u ušima (tinitus)
- usporen rad srca (bradikardija)
- sniženi krvni tlak, uključujući i nagli pad tlaka nakon ustajanja.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Internetska stranica: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati MOKSONIDIN BELUPO?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete čuvajte na temperaturi ispod 25°C.
MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što MOKSONIDIN BELUPO sadrži?

- Djelatna tvar je moksonidin.
MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete: jedna filmom obložena tableta sadrži 0,2 mg moksonidina.
MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete: jedna filmom obložena tableta sadrži 0,4 mg moksonidina.
- Pomoćne tvari su:
Jezgra tablete: laktoza hidrat; povidon; krosipovidon; magnezijev stearat.
Ovojnica tablete: titanijev dioksid (E171); hipromeloza; makrogol 400; crveni željezov oksid (E172).

Kako MOKSONIDIN BELUPO izgleda i sadržaj pakiranja?

MOKSONIDIN BELUPO 0,2 mg filmom obložene tablete su svijetlo ružičaste, okrugle tablete, promjera otprilike 6 mm.

MOKSONIDIN BELUPO 0,4 mg filmom obložene tablete su tamno ružičaste, okrugle tablete, promjera otprilike 6 mm.

28 tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d.

Ulica Danica 5

48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2019.

H A L M E D
12 - 01 - 2021
ODOBRENO