

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Naftifinklorid JGL 10 mg/ml otopina za kožu

naftifinklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Naftifinklorid JGL i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Naftifinklorid JGL
3. Kako primjenjivati Naftifinklorid JGL
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Naftifinklorid JGL
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Naftifinklorid JGL i za što se koristi

Naftifinklorid JGL otopina za kožu namijenjena je za liječenje gljivičnih infekcija na koži, a sadrži djelatnu tvar naftifinklorid. Naftifinklorid JGL otopina za kožu djeluje na kožne gljivice, kvasnice, plijesni i druge gljivice.

Naftifinklorid JGL otopina za kožu koristi se u odraslih za liječenje:

- gljivičnih infekcija kože stopala, pogotovo kože između prstiju i na tabanima (praćene crvenilom, ljuštenjem i oteklinom ili pojavom svrbeža i mjehurića).

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 tjedna.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Naftifinklorid JGL

Nemojte primjenjivati Naftifinklorid JGL:

- ako ste alergični na naftifinklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Naftifinklorid JGL.

Kod prvih znakova nuspojava, javite se svom liječniku.

Naftifinklorid JGL otopina za kožu je namijenjena samo za primjenu na površini kože i ne smije doći u doticaj s očima. Otopina se ne smije nanositi na ozlijeđenu kožu, jer alkohol koji sadrži može izazvati bolno pečenje. Ako Vam otopina slučajno dođe u doticaj s očima ili ozlijeđenom kožom, oči ili ozlijeđenu kožu temeljito isperite mlazom vode.

Ako su simptomi i dalje prisutni nakon 4 tjedna, ili ako liječenje nije uspješno kako se očekivalo, posavjetujte se s liječnikom.

Drugi lijekovi i Naftifinklorid JGL

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti ili primijeniti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Pri pravilnoj primjeni lijeka tijekom trudnoće ili dojenja ne očekuju se štetni učinci na plod ili dojenče, ali se iz predostrožnosti ne preporučuje primjena ako to nije izričito neophodno.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne očekuje se utjecaj Naftifinklorid JGL otopine za kožu na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Naftifinklorid JGL sadrži propilenglikol i etanol

1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola. Propilenglikol može nadražiti kožu. Budući da ovaj lijek sadrži propilenglikol, nemojte ga primjenjivati na otvorenim ranama ili velikim područjima raspucale ili oštećene kože (poput opekline) bez savjetovanja s liječnikom ili ljekarnikom.

Ovaj lijek sadrži 413 mg alkohola (etanola) u jednom ml otopine. Može izazvati osjećaj pečenja na oštećenoj koži.

3. Kako primjenjivati Naftifinklorid JGL

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Naftifinklorid JGL otopinu za kožu treba nanijeti jedanput na dan na očišćeno i pažljivo osušeno oboljelo i okolno područje kože. Otopinu možete nanijeti na kožu izravno iz bočice ili koristiti jastučice vate natopljene otopinom.

Primjena u djece i adolescenata

Sigurnost i djelotvornost Naftifinklorid JGL otopine nije ispitana u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega i jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu.

Starije osobe

Nije potrebno prilagođavati dozu.

Način primjene

Pažljivo slijedite navedene upute:

- očistite i osušite oboljele dijelove kože i okolna područja te operite ruke
- na oboljelo i okolno područje kože nanesite dovoljno otopine da bi bilo potpuno vlažno
- nakon nanošenja otopine dobro operite ruke kako ne biste proširili infekciju na sebi i na druge.

Pažljivo se pridržavajte sljedećih preporuka za što brže izlječenje gljivičnih infekcija (medicinski izraz: mikoze):

1. Mikroorganizmi odgovorni za pojavu gljivičnih infekcija mogu prijanjati za odjeću koja je u doticaju s oboljelom kožom, zbog čega je treba svakodnevno mijenjati.
2. Zdrava i prije svega suha površina kože najbolja je zaštita od gljivičnih infekcija. Zbog toga, treba izbjegavati tijesnu odjeću koja sprječava cirkulaciju zraka (npr. čarape od sintetičkog materijala u tijesnoj obući). Nakon pranja pažljivo osušite područje oboljele kože. Krpice za pranje i ručnike mijenjajte svakodnevno.
3. Ako imate gljivičnu infekciju na stopalima, ne hodajte bosu u prostorima koje dijelite s drugim osobama. To će spriječiti dalje širenje mikroorganizama, kao i ponovnu pojavu infekcije.
4. Ne posjećujte saune ili javne kupelji prije nego što izliječite gljivičnu infekciju.

Trajanje liječenja

Kod liječenja kožnih gljivičnih infekcija, važno je nastaviti liječenje najmanje 2 tjedna nakon nestanka svih znakova bolesti, čak i slučaju brzog poboljšanja simptoma (svrbeža, žarenja) kako bi se održao dugotrajni učinak liječenja.

Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 4 tjedna primjene lijeka obavezno se obratite liječniku.

Ako primijenite više Naftifinklorid JGL otopine nego što ste trebali

Ne očekuje se štetan utjecaj prevelike količine lijeka primijenjene na kožu. Kod slučajnog gutanja lijeka potražite liječničku pomoć jer može biti potrebno odgovarajuće liječenje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave:

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka): kontaktni dermatitis (kožni osip ili nadraženost na mjestu primjene), lokalna nadraženost kože uz osjećaj suhoće, eritem (crvenilo kože) i žarenje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Naftifinklorid JGL**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP.

Napomena o roku valjanosti nakon otvaranja

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti lijeka je 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Naftifinklorid JGL sadrži

Djelatna tvar je naftifinklorid. 1 ml otopine za kožu sadrži 10 mg naftifinklorida.

Pomoćne tvari su: etanol 96%-tni; voda, pročišćena; propilenglikol.
1 ml otopine za kožu sadrži 50 mg propilenglikola.

Kako Naftifinklorid JGL izgleda i sadržaj pakiranja

Bistra, bezbojna do blijedožuta otopina za kožu.

20 ml otopine za kožu u smeđoj staklenoj bočici s polietilenskim (HDPE) zatvaračem i polietilenskim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d., Sivilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u ožujku 2022.