

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ljekovita guma za žvakanje NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 4 mg ljekovita guma za žvakanje

nikotin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš zdravstveni djelatnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja ili trebate savjet, obratite se zdravstvenom djelatniku, npr. liječniku, medicinskoj sestri, savjetniku za prestanak pušenja ili ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti zdravstvenog djelatnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako niste uspjeli prestati pušiti nakon 9 mjeseci liječenja NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ili 4 mg ljekovitim gumama za žvakanje.
- U ovoj se Uputi NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg ili 4 mg ljekovite gume za žvakanje nazivaju NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što su NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje
3. Kako uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje i za što se koriste

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje koriste se kao pomoć pri odvikavanju od pušenja. Ta vrsta liječenja naziva se nikotinskom nadomjesnom terapijom.

Zbog nikotina u cigaretama može doći do fizičke ovisnosti o cigaretama.

- NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje pomažu pri odvikavanju od pušenja nadomještanjem dijela nikotina iz cigareta.
- Nikotin iz gume za žvakanje ublažava neke od neugodnih simptoma koje pušači mogu imati pri odvikavanju od pušenja. Ti simptomi uključuju loše osjećanje i razdražljivost.
- Nikotin iz gume za žvakanje također može ublažiti želju za cigaretom i pomoći Vam da se oduprete nagonu na pušenje.

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje nemaju opasnosti za zdravlje koje nosi duhan. To je zato što ne sadrže katran, ugljikov monoksid ni druge otrove koji se nalaze u dimu cigareta. U nekih ljudi se javlja zabrinutost da bi nakon prestanka pušenja mogli postati ovisni o nikotinskim gumama za žvakanje. To je vrlo rijetko, a ako bi se i dogodilo, manje je štetno od nastavka pušenja. Također, te se navike lakše ostaviti.

Vjerojatnost za uspjeh u odvikavanju od pušenja bit će veća ako sudjelujete u nekom programu potpore. Programi odvikavanja od pušenja poznati su kao bihevioralna potpora. Za informacije o programima odvikavanja od pušenja obratite se zdravstvenom djelatniku ili ljekarniku.

Pušenje nema korisnih učinaka za zdravlje. Uvijek je bolje prestati pušiti. Uzimanje nikotinske nadomjesne terapije, poput NiQuitin GUM Icy Fresh Mint guma za žvakanje, može pomoći u odvikavanju od pušenja. U načelu, svaku moguću nuspojavu nikotinske nadomjesne terapije daleko nadmašuju dobro poznate opasnosti od nastavka pušenja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje

Nemojte uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje:

- ako ste alergični na nikotin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste mlađi od 12 godina
- ako ste nepušač ili povremeni pušač

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom zdravstvenom djelatniku prije nego uzmete NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje:

- Ako ste nedavno imali srčani ili moždani udar, ako patite od teških problema sa srčanim ritmom, imate nestabilnu ili progresivnu anginu (bol u prsima), visok krvni tlak koji nije kontroliran lijekovima ili anginu u mirovanju, trebali biste pokušati prestati pušiti bez uporabe pripravaka nikotinske nadomjesne terapije, osim ako Vam ih ne preporuči liječnik.
- Ako imate šećernu bolest, trebali biste češće nego obično kontrolirati razine šećera u krvi kada počnete uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje. Možda će se promijeniti Vaše potrebe za inzulinom ili drugim lijekovima.
- Ako ste ikada imali alergijske reakcije koje uključuju oticanje usana, lica i grla (angioedem) ili kožni osip koji svrbi (koprivnjača). Nikotinska nadomjesna terapija ponekad može izazvati tu vrstu reakcije.
- Ako imate zubnu protezu jer ćete možda imati poteškoća pri žvakanju.
- Ako ste nekada imali epileptični napadaj.
- Žvakanje nikotinske gume može uzrokovati ispadanja zubnih ispuna ili implantata.
- Nikotinska nadomjesna terapija nije prikladna za djecu mlađu od 12 godina. Nikotin ima jači učinak u djece nego u odraslih. Može izazvati teško trovanje u djece, koje može dovesti do smrti.

Nemojte naizmjenično koristiti NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje i nikotinske pastile tijekom odvikavanja od pušenja.

Zatražite pomoć i savjet liječnika ako imate:

- umjerene ili teške jetrene tegobe ili umjerene ili teške tegobe s bubrezima – jer može postojati veća vjerojatnost javljanja nuspojava
- nekontroliran prekomjeren rad štitnjače ili feokromocitom (tumor nadbubrežne žlijezde koji može utjecati na krvni tlak) – liječnik će vas upozoriti – jer nikotin može pogoršati simptome
- vrijed želuca ili dvanaesnika ili upalu jednjaka (organa koji povezuje usta i želudac) jer gutanje nikotina može pogoršati simptome. Također može uzrokovati vrijedove u ustima. Ako Vam se simptomi pogoršaju, morate se obratiti svom liječniku. Možda će biti bolje da prijedete na neki oblik nikotinske nadomjesne terapije koji se ne uzima kroz usta, primjerice flastere.

Djeca (mlađa od 12 godina)

Doza za odrasle može u male djece izazvati teško trovanje ili smrt. Stoga je neophodno da NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje uvijek čuvate izvan pogleda i dohvata djece.

Drugi lijekovi i NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje

Obavijestite svog zdravstvenog djelatnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prestanak pušenja može promijeniti učinke drugih lijekova koje uzimate. Ako imate pitanja ili ste zabrinuti zbog toga, obratite se zdravstvenom djelatniku.

Ovo je osobito važno ako uzimate lijekove koji sadrže:

- teofilin (za liječenje astme)
- takrin (za liječenje Alzheimerove bolesti)
- klozapin (za liječenje shizofrenije)
- ropinirol (za liječenje Parkinsonove bolesti)

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje s hranom i pićem

Ne smijete jesti niti piti dok u ustima imate NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gumu za žvakanje.

Kiseli napici (npr. voćni sok, kava ili gazirana pića) utječu na apsorpciju nikotina u usnoj šupljini. Kako bi se postigao najbolji učinak, treba izbjegavati takve napitke približno 15 minuta prije uzimanja NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom zdravstvenom djelatniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Pušenje tijekom trudnoće nosi opasnosti za plod. To uključuje slab rast prije rođenja, prijevremeni porođaj ili mrtvorodenje. Prestanak pušenja je najbolji način da poboljšate Vaše zdravlje i zdravlje djeteta. Potrebno je što prije prestati pušiti.

Idealno bi bilo da, ako ste trudni, prestanete pušiti bez uzimanja nikotinske nadomjesne terapije. Međutim, ako ste pokušali i niste uspjeli, zdravstveni djelatnik može preporučiti nikotinsku nadomjesnu terapiju kao pomoć pri odvikavanju od pušenja. Nikotinska nadomjesna terapija je manje štetna za plod od nastavka pušenja. Odluku o primjeni nikotinske nadomjesne terapije treba donijeti u što ranijoj fazi trudnoće. Cilj je primjenjivati nikotinsku nadomjesnu terapiju kroz samo 2-3 mjeseca. Zapamtite, najvažnije je prestati pušiti. Pripravci poput guma za žvakanje imaju prednost nad nikotinskim flasterima. Razlog tome je što uz gume za žvakanje ne dobivate nikotin cijelo vrijeme. Međutim, flasteri bi mogli imati prednost ako patite od mučnine ili povraćanja.

Ako dojite, duhanski dim uzrokuje otežano disanje i druge tegobe u dojenčadi i djece. Idealno bi bilo da prestanete pušiti bez uzimanja nikotinske nadomjesne terapije. Međutim, ako ste pokušali i niste uspjeli, zdravstveni djelatnik Vam može preporučiti nikotinsku nadomjesnu terapiju. Ako Vam je kao pomoć pri prestanku pušenja potrebna nikotinska nadomjesna terapija, količina nikotina kojoj bi dijete moglo biti izloženo je mala. Najbolje je koristiti pripravke nikotinske nadomjesne terapije koji se uzimaju u određeno doba dana (primjerice gume za žvakanje ili pastile, a ne flastere). Također je bolje dobiti neposredno prije uzimanja pripravka. Time će dijete biti izloženo najmanjoj mogućoj količini nikotina.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema poznatih učinaka NiQuitin GUM Icy Fresh Mint guma za žvakanje na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Međutim, morate biti svjesni da prestanak pušenja može uzrokovati promjene ponašanja koje bi mogle utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje sadrže

- natrij – Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po gumi za žvakanje, tj. zanemarive količine natrija.
- sorbitol (E420) – Svaka guma za žvakanje od 2 mg sadrži 148,65 mg sorbitola. Svaka guma za žvakanje od 4 mg sadrži 137,55 mg sorbitola. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego uzmete ili primite ovaj lijek.
- butilhidroksitoluen (E321) – Može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili nadražiti oči i sluznice.

3. Kako uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao zdravstveni djelatnik. Provjerite s Vašim zdravstvenim djelatnikom ako niste sigurni.

Tijekom bilo kojeg pokušaja prestanka pušenja uz primjenu NiQuitin GUM Icy Fresh Mint guma za žvakanje važno je nastojati u potpunosti prestati pušiti. Međutim, ako ipak uzmete cigaretu tijekom nikotinske nadomjesne terapije, trebate ustrajati u odvikavanju od pušenja. Ako i dalje budete imali poteškoća s prestankom pušenja, možda će Vam pomoći razgovor s Vašim liječnikom, medicinskom sestrom, savjetnikom za prestanak pušenja ili ljekarnikom.

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje od 2 mg namijenjene su za pušače koji puše manje od 20 cigareta dnevno. NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje od 4 mg namijenjene su za pušače koji puše više od 20 cigareta dnevno.

Nemojte žvakati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint kao obične žvakaće gume. Ako NiQuitin GUM Icy Fresh Mint žvakaču gumu žvačete prebrzo i bez stanki, nikotin se prebrzo oslobađa. To može izazvati nelagodu (npr. žgaravicu i štucanje).

Upotrijebite NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje tako da odlijepite papir i istisnete gumu za žvakanje. Stavite jednu gumu za žvakanje u usta i polako žvačite dok okus ne postane jak (oko 1 minute), a zatim prestanite žvakati i prislonite gumu za žvakanje uz obraz. Kada se okus izgubi, prožvačite gumu za žvakanje nekoliko puta dok se okus ne pojača, a zatim ponovno napravite stanku. Nakon približno 30 minuta iscrpit će se sadržaj ljekovite gume za žvakanje. Ne smijete jesti niti piti dok u ustima imate gumu za žvakanje jer to može smanjiti apsorpciju nikotina. Ne smijete uzimati više od 15 guma za žvakanje dnevno. Ako mislite da trebate uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje dulje od ukupno 9 mjeseci, morate se obratiti za savjet zdravstvenom djelatniku.

NiQuitin GUM Icy Fresh Mint ljekovite gume za žvakanje mogu se koristiti prema sljedećem rasporedu, koji je osmišljen tako da postupno smanjujete broj guma za žvakanje.

Odrasli (18 i više godina)

- Za početak uzimajte 8 do 12 guma za žvakanje dnevno. Žvačite gumu za žvakanje kad god se pojavi želja za pušenjem.
- Koristite gume za žvakanje na taj način najviše 3 mjeseca, a zatim postupno smanjujete broj guma za žvakanje koje uzimate dnevno (pogledajte tablicu u nastavku).
- Kad budete uzimali samo 1 ili 2 gume za žvakanje dnevno, potpuno ih prestanite uzimati.

Nakon što ste prestali pušiti, ponekad možete osjetiti iznenadnu želju za cigaretom. Ako se to dogodi, možete ponovno uzeti gumu za žvakanje.

1. KORAK	2. KORAK	3. KORAK
Početno razdoblje uzimanja Uzmite jednu gumu za žvakanje kad god se pojavi želja za pušenjem. Koristite 8-12 guma dnevno tijekom najviše 3 mjeseca.	Razdoblje smanjenog uzimanja Postupno smanjujte uporabu ljekovitih guma za žvakanje na 1-2 gume dnevno. Zatim prestanite s uzimanjem.	Potporno uzimanje Uzmite jednu gumu za žvakanje ako se iznenada pojavi želja za pušenjem.

Primjena u djece i adolescenata

Adolescenti (12 do uključivo 17 godina)

Adolescenti ne smiju koristiti NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje bez preporuke liječnika.

Nemojte prekoračiti navedenu dozu. Nemojte istodobno pušiti niti koristiti druge pripravke koji sadrže nikotin. Pažljivo slijedite upute i nemojte uzimati više od 15 guma za žvakanje dnevno (tijekom 24 sata).

Djeca mlađa od 12 godina

Djeca mlađa od 12 godina ne smiju koristiti NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje.

Ako dođete u iskušenje da ponovno počnete pušiti

Ako ste zabrinuti da biste mogli ponovno početi pušiti ili Vam je teško u potpunosti prestati koristiti gume za žvakanje, razgovarajte sa zdravstvenim djelatnikom. Ako ponovno počnete pušiti, on će Vas savjetovati kako da postignete najbolje rezultate u sljedećim ciklusima nikotinske nadomjesne terapije.

Ako uzmete više NiQuitin GUM Icy Fresh Mint guma za žvakanje nego što ste trebali

Ako uzmete previše NiQuitin GUM Icy Fresh Mint guma za žvakanje, mogu se javiti mučnina i omaglica i možete se osjećati loše. Prestanite uzimati gume za žvakanje i odmah se posavjetujte s liječnikom ili bolničkom hitnom službom. Ako je moguće, pokažite im pakiranje ili ovu uputu.

Ove gume za žvakanje nisu prikladne za djecu mlađu od 12 godina. Ako djeca uzmu gume za žvakanje, mogu pokazivati znakove predoziranja nikotinom. Oni uključuju glavobolju, mučninu, bol u trbuhu i proljev. Ako je dijete koristilo ili progutalo bilo koju gumu za žvakanje, odmah se javite Vašem liječniku ili hitnoj službi najbliže bolnice jer to može biti vrlo opasno, pa čak i smrtonosno. Ako je moguće, pokažite im pakiranje ili ovu uputu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom zdravstvenom djelatniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. U preporučenim dozama NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje nisu uzrokovale ozbiljne nuspojave.

Prestanak pušenja može izazvati simptome kao što su omaglica, glavobolja, poremećaj spavanja, kašalj ili simptome nalik prehladi. Simptomi poput depresije, razdražljivosti, anksioznosti, pojačanog apetita i nesаницe također mogu biti povezani sa simptomima ustezanja pri odvikavanju od pušenja.

Prestanite uzimati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje i odmah se javite liječniku ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma alergijskih reakcija, koje mogu biti ozbiljne:

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 10 000 osoba)

- otečeno lice, jezik ili grlo
- otežano gutanje
- koprivnjača i poteškoće s disanjem
- nepravilni otkucaji srca
- simptomi teške alergijske reakcije koji uključuju iznenadno piskanje pri disanju ili stezanje u prsima, osip i nesvjesticu

Ostale nuspojave navedene su u nastavku – prema vjerojatnosti pojavljivanja.

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

- mučnina

Česte (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

- nelagoda u probavnom sustavu
- grlobolja, bol u ustima/suha usta, iritacija usta ili vrijed u ustima, upala ždrijela, kašalj
- poremećaj spavanja, glavobolja, razdražljivost, omaglica
- povraćanje, štucanje, loša probava, vjetrovi, proljev, zatvor
- bol u vilici

Nijedna od navedenih nuspojava nije ozbiljna i često se povlači nakon nekoliko dana liječenja.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

- ubrzani otkucaji srca ili svijest o kucanju srca
- otežano disanje, bol u prsima
- poremećaj okusa/izmijenjen okus
- crvenilo kože, koprivnjača, pojačano znojenje
- bol ili oticanje u mišićima/zglobovima
- upala sluznice usta
- nevoljno drhtanje
- loše osjećanje

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

- napadaji, otežano gutanje, podrigivanje, pojačano slinjenje, astenija (manjak energije), umor, bolest nalik gripu (simptomi nalik prehladi), preosjetljivost, nenormalni snovi, svrbež ili osip, utrnulost ili trnci u ustima.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti zdravstvenog djelatnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljuvanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje

- Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji iza EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.
- Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.
- Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje sadrže:

- Djelatna tvar je nikotin. Jedna ljekovita guma za žvakanje sadrži 2 mg ili 4 mg nikotina (u obliku kompleksa sa smolom koji se zove nikotinrezinat).
- Drugi sastojci su:
 - Guma za žvakanje sadrži butilhidroksitoluen (E321), sorbitol (E420), ksilitol (E967), kalcijev karbonat (E170), bezvodni natrijev karbonat (E500), glicerol (E422), acesulfamkalij (E950), sukralozu (E955), manitol (E421), arapsku gumu (E414), titanijev dioksid (E171) i arome: Optacool, eukaliptus i mentol te levomentol.

Kako NiQuitin GUM Icy Fresh Mint gume za žvakanje izgledaju i sadržaj pakiranja

Bijela do skoro bijela pravokutna guma za žvakanje.

Svaki blister sadrži 4 ili 10 guma za žvakanje.

Pakiranje sadrži 4, 10, 30, 100 ili 200 guma za žvakanje.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Adriatic BST d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvođači

Fertin Pharma A/S,
Dendyvej 19, Vejle,
Danska

Logiters, Logistica Portugal, S.A.
Estrada dos Arneiros, 4,
Azambuja, 2050 – 544
Portugal

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10 000 Zagreb
Tel. 01/2396900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjevernoj Irskoj) pod sljedećim nazivima:

Belgija	NiQuitin freshmint 2 mg & 4mg Gomme à mâcher médicamenteuse
Hrvatska	NiQuitin GUM Icy Fresh Mint 2 mg & 4mg ljekovita guma za žvakanje
Češka	NiQuitin Freshmint
Estonija	NiQuitin Mint 2 mg & 4 mg ravimnäriskumm
Mađarska	NiQuitin Menthol Fresh 2 mg & 4mg gyógyszeres rágógumi
Irska	NiQuitin Fresh Mint 2mg & 4mg Medicated Chewing Gum
Latvija	NiQuitin Mint 2 mg & 4mg ārstnieciskā košļājamā gumija
Litva	NiQuitin Mint 2 mg & 4mg vaistinė kramtomoji guma
Luksemburg	NiQuitin freshmint 2 mg & 4mg Gomme à mâcher médicamenteuse
Nizozemka	NiQuitin Mint 2 mg & 4 mg Kauwgom
Poljska	NiQuitin Extra Fresh 2mg & 4 mg guma do żucia, lecznicza
Portugal	NiQuitin Mint 2mg & 4 mg gomas para mascar medicamentosas
Slovačka	NiQuitin Freshmint 2 mg & 4 mg mg liečivé žuvačky
Španjolska	NiQuitin Mint 2 mg & 4 mg chicles medicamentosos
Švedska	NiQuitin Mint 2 mg & 4 mg medicinskt tuggummi
Ujedinjena Kraljevina (Sjeverna Irska)	Nicabate Extra Fresh Mint 2 mg & 4 mg Medicated Chewing Gum

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u studenom 2021.

Drugi izvori informacija

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode: <http://www.halmed.hr>.