

Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje nikotin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Nicorette ljekovite gume za žvakanje i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nicorette ljekovite gume za žvakanje
3. Kako uzimati Nicorette ljekovite gume za žvakanje
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nicorette ljekovite gume za žvakanje
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Nicorette ljekovite gume za žvakanje i za što se koriste

Nicorette pripada skupini lijekova koji se koriste kao pomoć pri odvikavanju od pušenja.

Nikotin iz Nicorette ljekovitih guma za žvakanje ublažava potrebu za nikotinom i simptome sustezanja kod prestanka pušenja te pomaže prestanak pušenja u pušača koji žele prestati pušiti ili pomaže u smanjenju pušenja kod pušača koji ne žele ili ne mogu prestati pušiti.

Kad ljudski organizam naglo ostane bez nikotina, javljaju se različite vrste nelagode koje nazivamo simptomima sustezanja. Korištenjem Nicorette Freshmint ljekovite gume za žvakanje možete spriječiti ili barem smanjiti nelagodu tako što ćete tijekom prijelaznog razdoblja uzimati male količine nikotina.

Dok žvačete Nicorette ljekovitu gumu iz nje se oslobađa nikotin i polako apsorbira u usnoj šupljini. Za razliku od cigareta, Nicorette ljekovita guma za žvakanje ne sadržava štetne tvari kao što su katran i ugljični monoksid.

Savjeti i podrška mogu poboljšati uspješnost liječenja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje

Nemojte uzimati Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje:

- ako ste alergični na nikotin ili neki drugi sastojak Nicoretta (navedeni u dijelu 6)
- ako ste mlađi od 12 godina
- ako nikada niste pušili

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje ako imate ili ste imali bilo što od sljedećeg:

- srčani ili moždani udar u zadnja 3 mjeseca
- bol u prsima (nestabilna angina) ili anginu u mirovanju
- imate bolest srca koja utječe na broj otkucaja ili ritam srca,
- neliječeni visoki krvni tlak
- umjerenu ili tešku bolest jetre
- tešku bolest bubrega
- šećernu bolest (češće kontrolirajte razinu šećera u krvi jer Nicorette Freshmint može promijeniti količinu inzulina koja vam je potrebna)

- probleme sa štitnjačom (hiperaktivnost)
- tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)
- vrijed (čir) želuca ili dvanaesnika
- upalu jednjaka
- epilepsija ili napadaji u povijesti bolesti

Pušenje cigareta i dalje predstavlja veću opasnost od uporabe Nicorette ljekovitih guma za žvakanje. Guma se može zalijepiti za zubne mostove i proteze te u rijetkim slučajevima uzrokovati oštećenja na njima. Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje ne smiju koristiti nepušači.

Djeca i adolescenti

Osobe mlađe od 18 godina ne smiju koristiti Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje bez preporuke liječnika. Iskustvo s liječenjem ove dobne skupine je ograničeno. Djeca mlađa od 12 godina ne smiju uzimati Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje.

Drugi lijekovi i Nicorette ljekovita guma za žvakanje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To je osobito važno ako uzimate lijekove koji sadrže:

- **teofilin** za liječenje astme
- **takrin** za liječenje Alzheimerove bolesti
- **klozapin** ili **olanzapin** za liječenje shizofrenije
- **imipramin, klopipramin, fluvoksamin** za liječenje depresije
- **ropinirol** za liječenje Parkinsonove bolesti
- **pentazocin** za liječenje boli
- **flekainid** ili **adenozin** za liječenje nepravilnih ili brzih srčanih otkucaja

Nicorette ljekovite gume za žvakanje s hranom i pićem

Ne treba jesti i piti dok je ljekovita guma za žvakanje u ustima. Također, kava, sokovi i gazirana pića mogu smanjiti apsorpciju nikotina u usnoj šupljini. Te napitke treba izbjegavati najmanje 15 minuta prije korištenja ljekovite gume za žvakanje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Posebno je važno prestati pušiti tijekom trudnoće, jer pušenje može ugroziti fetalni rast. Također, može dovesti do prijevremenog poroda ili pobačaja. Najbolje bi bilo pokušati prestati pušiti bez primjene lijekova koji sadržavaju nikotin. Ako vam to ne uspijeva, Nicorette ljekovite gume za žvakanje smijete koristiti tek nakon što se posavjetujete s liječnikom koji vodi vašu trudnoću, obiteljskim liječnikom ili liječnikom koji je specijalist za odvikavanje od pušenja.

Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje treba izbjegavati za vrijeme dojenja jer nikotin prelazi u majčino mlijeko i može utjecati na dijete. Ako vam je liječnik preporučio Nicorette ljekovite gume za žvakanje, uzimajte ih nakon dojenja.

Pušenje povećava rizik od neplodnosti u žena i muškaraca. Nije poznat utjecaj nikotina na plodnost.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i rad sa strojevima

Nije uočeno djelovanje na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Nicorette Freshmint ljekovite gume za žvakanje sadrže ksilitol i butilhidroksitoluen.

Ksilitol koji može imati laksativni učinak. Kalorijska vrijednost: 2,4 kcal/g ksilitola, odnosno, 1,5 kcal po ljekovitoj gumi za žvakanje od 2 mg i 1,4 kcal po ljekovitoj gumi od 4 mg. Osnova žvakaće gume sadrži butilhidroksitoluen (E321), antioksidans koji može izazvati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili iritaciju očiju i sluznice.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, što u biti znači "bez natrija".

3. Kako uzimati Nicorette ljekovite gume za žvakanje

Uvijek uzimate ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam jer rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Nicorette 2 mg ljekovita guma za žvakanje može biti primijenjena kao samostalna terapija ili u kombinaciji s Nicorette transdermalnim flasterom.

Nicorette 4 mg ljekovita guma za žvakanje se primjenjuje kao samostalna terapija.

Odrasle i starije osobe

Važna je ispravna tehnika žvakanja. Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje treba žvakati polako i sa stankama. U suprotnom se može pojaviti žgaravica i štucanje. Djelovanje nikotina nalik onome tijekom pušenja će se pojaviti tek nakon nekoliko minuta. Stoga se osjećaj zadovoljstva ne može očekivati jednako brzo kao kod pušenja. Opasnost od otrovanja uslijed nehotičnog gutanja ljekovite gume za žvakanje je vrlo mala je se tada nikotin iz gume oslobađa polako i nepotpuno.

Liječenje samo Nicorette ljekovitom gumom za žvakanje

Doza se određuje u skladu sa stupnjem vaše ovisnosti o nikotinu.

Ako pušite više od 20 cigareta dnevno ili niste postigli uspjeh s Nicorette 2 mg ljekovitom gumom za žvakanje, počnite uzimati Nicorette 4 mg ljekovitu gumu za žvakanje. U ostalim slučajevima treba uzeti gumu za žvakanje od 2 mg.

Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje treba uzimati kad se pojave simptomi sustezanja, odnosno, u vrijeme kada se obično puši cigareta.

Na početku terapije treba uzeti jednu ljekovitu gumu za žvakanje svaka 1-2 sata. Svaki dan treba uzeti dovoljnu količinu ljekovitih guma. Doziranje treba biti prilagođeno jačini ovisnosti svakog pojedinog pušača. U većini slučajeva je dovoljno uzeti 8-12 guma dnevno. Kako bi se povećale šanse za uspjeh terapije ne smije se primijeniti preniska doza nikotina. Ne smije se uzeti više od 24 ljekovite gume dnevno.

Ako ne prestanete uzimati Nicorette Freshmint nakon 9 mjeseci od početka liječenja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Prestanak pušenja

Koristite samo jednu gumu odjednom. Ako odlučite potpuno prestati pušiti, ne smijete istodobno pušiti i koristiti Nicorette Freshmint ili druge nikotinske lijekove, jer bi vam previše nikotina u tijelu moglo uzrokovati mučninu.

Jačina i broj žvakaćih guma koje ćete dnevno koristiti ovisi o vašim potrebama za cigaretama. Na početku terapije treba uzeti jednu ljekovitu gumu za žvakanje svaka 1-2 sata. Svaki dan treba uzeti dovoljnu količinu ljekovitih guma. Doziranje treba biti prilagođeno jačini ovisnosti svakog pojedinog pušača. U većini slučajeva je dovoljno uzeti 8-12 guma dnevno. Kako bi se povećale šanse za uspjeh terapije ne smije se primijeniti preniska doza nikotina. Ne smije se uzeti više od 24 ljekovite gume dnevno. Koristite žvakaće gume najmanje 3 mjeseca, a zatim postupno počnite smanjivati broj žvakaćih guma dnevno. Prekinite liječenje kada dosegnete 1-2 ljekovite žvakaće gume dnevno.

Smanjenje pušenja

Nicorette ljekovita guma za žvakanje se koristi između razdoblja pušenja kako bi se produžila razdoblja nepušenja, te u cilju smanjenja pušenja koliko god je to moguće. Kad god vas uhvati želja za pušenjem, prožvačite jednu Nicorette Freshmint ljekovitu gumu za žvakanje. Koristite dovoljan broj ljekovitih guma za žvakanje u jednom danu, ali ne više od njih 24.

Ako se nakon 6 tjedana ne uspije smanjiti broj dnevno popušanih cigareta, treba potražiti stručnu pomoć.

Čim se pušač osjeća spremnim, treba pokušati prestati pušiti, međutim, ne kasnije od 6 mjeseci nakon početka liječenja. Ako je nemoguće učiniti ozbiljan pokušaj prestanka pušenja u roku od 9 mjeseci nakon početka

liječenja, treba potražiti stručnu pomoć. Redovito uzimanje Nicorette ljekovitih guma za žvakanje duže od godinu dana se općenito ne preporuča. U nekim slučajevima će bivšim pušačima biti potrebno duže liječenje kako bi se izbjegao povratak pušenju. Preostale ljekovite gume za žvakanje treba zadržati za slučaj iznenadne potrebe za pušenjem.

Savjetovanje i podrška obično poboljšavaju uspjeh u prestanku pušenja.

Terapija Nicorette Freshmint ljekovitom gumom za žvakanje u kombinaciji s Nicorette Invisipatch transdermalnim flasterom.

Izrazito ovisni pušači, oni koji osjećaju želju za pušenjem usprkos korištenju lijekova s nikotinom ili oni koji nisu uspjeli prestati s pušenjem uz primjenu samo jednog lijeka koji sadržava nikotin, mogu uz Nicorette Invisipatch transdermalni flaster uzimati Nicorette 2 mg ljekovitu gumu za žvakanje za brzo smanjivanje želje za pušenjem.

NAPOMENA: Prije uporabe Nicorette transdermalnog flastera pročitajte uputu o lijeku priloženu u pakiranju.

Početno kombinirano liječenje

Tijekom 8 tjedana svako jutro se stavlja jedan flaster od 25 mg/16 sati a skida prije spavanja.

Uzimajte Nicorette Freshmint ljekovitu gumu za žvakanje od 2 mg zajedno s flasterom kako slijedi:

Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje uzmite kad osjetite želju za cigaretom usprkos tome što koristite Nicorette flaster. Bolesnik treba koristiti najmanje 4 žvakaće gume od 2 mg nikotina na dan. Dostatna dnevna doza je u većini slučajeva 5-6 ljekovitih guma za žvakanje. Ne uzimajte više od 24 ljekovite gume na dan.

Nakon 8 tjedana dozu nikotina treba postupno smanjivati koristeći jedan od slijedeća dva načina:

Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 1. način

Nakon prvih 8 tjedana počnite koristiti transdermalni flaster manje jačine:

Jedan flaster od 15 mg/16 sati stavljajte svaki dan tijekom 2 tjedna, a nakon toga po jedan flaster dnevno od 10 mg/16 sati dodatnih 2 tjedna.

Istodobno koristite Nicorette Freshmint 2 mg ljekovitu gumu za žvakanje u istoj količini kao tijekom početnog kombiniranog liječenja.

Zatim treba postupno smanjiti broj ljekovitih guma za žvakanje. Liječenje samo ljekovitim gumama za žvakanje ne bi smjelo trajati duže od 12 mjeseci od početka liječenja.

Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 2. način

Prestanak korištenja transdermalnog flastera nakon prvih 8 tjedana i postupno smanjenje broja ljekovitih guma za žvakanje tijekom razdoblja od najviše 12 mjeseci od početka liječenja.

Postupak kombiniranog liječenja u tabličnom obliku:

Vremensko razdoblje	Transdermalni flaster	Ljekovita guma za žvakanje od 2 mg
1.-8. tjedan	1 flaster od 25 mg/16h dnevno	Prema potrebi. Uobičajena doza je 5-6 ljekovitih guma za žvakanje dnevno (maksimalno 24).
Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 1. Način		
9.-10. tjedan	1 flaster od 15 mg/16h na dan	Nastaviti uzimati ljekovite gume za žvakanje prema potrebi.
11.-12. tjedan	1 flaster od 10 mg/16h na dan	Nastaviti uzimati ljekovite gume za žvakanje prema potrebi.
do 12 mjeseci	---	Postupno smanjiti broj ljekovitih guma za žvakanje.
Odvikavanje od nikotinske nadomjesne terapije – 2. Način		
do 12 mjeseci	---	Nastaviti postupno smanjivati broj ljekovitih guma za žvakanje

Kako koristiti Nicorette Freshmint ljekovite gume za žvakanje

Koristite žvakaću gumu kad god osjetite želju za pušenjem. Žvakaća guma se mora žvakati kako bi se oslobodio nikotin, a zatim se pohrani između desni i obraza kako bi se nikotin mogao apsorbirati kroz oralnu sluznicu. Nikotin progutan sa slinom ne pomaže; ako ga ima previše, može iritirati grlo, izazvati želučane probleme i izazvati npr. štucaanje.

Način žvakanja:

1. Polako žvačite dok ne osjetite okus pečenja.
2. Zatim prestanite žvakati i stavite gumu između desni i obraza.
3. Kada okus pečenja nestane, počnite ponovno žvakati, a zatim ponovno spremite gumu između desni i obraza.
4. Žvačite ljekovitu gumu za žvakanje oko pola sata kako je opisano.
5. Nakon uporabe gumu pravilno zbrinite, npr. vratite ga natrag u otvor blistera i stavite u otpad.

Upute za primjenu flastera:

Stavite flaster ujutro i skinite ga prije spavanja. Flaster treba staviti na čist, suh, neoštećen i bez prašine dio kože, na boku, nadlaktici ili prsima.

Svaki dan odaberite drugo područje na koje ćete staviti flaster kako biste izbjegli lokalnu iritaciju kože. Nakon uporabe transdermalnih flastera pažljivo operite ruke kako biste s njih uklonili sav nikotin i tako spriječili prijenos nikotina na sluznicu očiju, nosa i usta, što može izazvati iritaciju.

Ako uzmete više Nicorette ljekovitih guma za žvakanje nego što ste trebali

Ako pušite tijekom uzimanja Nicorette ljekovite gume za žvakanje može doći do predoziranja nikotinom. Ako ste se predozirali nikotinom ili ako je dijete greškom uzelo Nicorette ljekovitu gumu za žvakanje odmah se javite svom liječniku ili odmah otidite u bolnicu na hitni prijem.

Doze nikotina koje toleriraju odrasli pušači tijekom liječenja mogu izazvati ozbiljne simptome trovanja u djece čiji ishod može biti fatalan. **Sumnju na otrovanje nikotinom u djece treba tretirati kao hitni medicinski slučaj i odmah potražiti liječničku pomoć.**

Kako se to ne bi dogodilo, čuvajte Nicorette Freshmint ljekovite gume za žvakanje izvan dohvata djece!

Simptomi predoziranja su mučnina, povraćanje, pojačano slinjenje, bol u trbuhu, proljev, znojenje, glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha i izraziti osjećaj slabosti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece. U slučaju predoziranja potražite liječničku pomoć.

4. Moguće nuspojave

Simptomi povezani s prestankom pušenja (simptomi sustezanja)

Neke od od nuspojava koje ćete doživjeti mogu biti simptomi sustezanja i javljaju se uslijed smanjenog unosa nikotina.

Ovi simptomi uključuju:

- razdražljivost, agresivnost, nestrpljivost ili frustriranost
- osjećaj tjeskobe, nemir, teškoće u koncentraciji
- buđenje noću ili poremećaje spavanja
- povećani apetit ili dobivanje na težini
- smanjenje broja otkucaja srca
- krvarenje iz desni ili čireve u ustima
- omaglica ili osjećaj da ćete se onesvijestiti
- kašalj, grlobolja, začepljen ili nos koji curi
- zatvor

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga. Nicorette ljekovita guma za žvakanje može izazvati nuspojave kao i nikotin primijenjen na neki drugi način. Nuspojave obično ovise o uzetoj dozi. Većina nuspojava koje su bolesnici prijavili obično se pojavljuje tijekom prva 3-4 tjedna nakon početka liječenja. Može se javiti nadraženost usta i ždrijela, ali većina osoba će se na to naviknuti tijekom daljnje primjene.

Ako primijetite prisutnost bilo koje od slijedećih ozbiljnih i rijetkih nuspojava prestanite uzimati Nicorette i odmah se obratite liječniku. Simptomi angioedema su (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- oticanje lica, jezika ili grla
- teškoće pri gutanju
- koprivnjača, osip, otežano disanje

Vrlo česte nuspojave (mogu se pojaviti u više od 1 osobe na 10 osoba) su:

- glavobolja
- nadražaj grla
- mučnina
- kašalj
- štućanje

Česte nuspojave (mogu se pojaviti u manje od 1 osobe na 10 osoba) su:

- lokalni učinci poput osjećaja žarenja, upale usta, promjene osjeta okusa
- bol u trbuhu
- umor
- trnci
- suha usta ili pojačano lučenje sline
- povraćanje, nadutost ili proljev
- preosjetljivost (alergija)

Manje česte nuspojave (mogu se pojaviti u manje od 1 osobe na 100 osoba) su:

- začepjenost nosa, kihanje
- crvenilo kože uz osjećaj vrućine, pojačano znojenje
- peckanje u ustima, upala jezika, oštećenje sluznice usne šupljine, promjena boje glasa, podrigivanje
- bol u mišićima čeljusti
- abnormalni snovi
- bronhospazam (grč mišića bronha)
- otežano disanje, zaduha, stezanje u grlu
- lupanje srca, povećan broj otkucaja srca, povišen krvni tlak
- osip (uključujući koprivnjaču) i/ili svrbež
- nelagoda i bol u prsima
- opća slabost, malaksalost

Rijetke nuspojave (može se pojaviti u manje od 1 osobe na 1 000 osoba) su:

- abnormalni srčani ritam (fibrilacija atrijska)
- otežano gutanje, smanjena osjetljivost u ustima
- dizanje želuca

Nije poznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- suhoća grla, nelagoda u trbuhu, bol u usnicama
- alergijska reakcija s oticanjem lica i usta (angioedem ili anafilaksija)
- napadaj
- zamućen vid, pojačano suženje oka
- crvenilo kože (eritem)
- stezanje u mišićima čeljusti

Nuspojave koje se mogu pojaviti kod kombiniranog liječenja (žvakaće gume i flaster) razlikuju se od samostalnog liječenja samo u pogledu lokalnih nuspojava povezanih s farmaceutskim oblikom. Učestalosti ovih nuspojava usporedive su s onima u Sažetku opisa svojstava lijeka za svaki lijek.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nicorette lijekovite gume za žvakanje

- **Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.**
- Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju.
- Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što sadrži Nicorette Freshmint 2 mg lijekovita guma za žvakanje

Djelatna tvar je nikotin. Jedna ljekovita guma za žvakanje sadrži 2 mg nikotina u obliku nikotina na smoli. Pomoćne tvari su: baza ljekovite gume za žvakanje (sadrži butilhidroksitoluen); ksilitol; eterično ulje paprene metvice; bezvodni natrijev karbonat; acesulfamkalij; levomentol; lagani magnezijev oksid; arapska guma; titanijev dioksid (E171); karnauba vosak; talk; pročišćena voda; dušik; natrijev hidrogenkarbonat.

Što sadrži Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje

Djelatna tvar je nikotin. Jedna ljekovita guma za žvakanje sadrži 4 mg nikotina u obliku nikotina na smoli. Pomoćne tvari su: baza ljekovite gume za žvakanje (sadrži butilhidroksitoluen); ksilitol; eterično ulje paprene metvice; natrijev karbonat, bezvodni; acesulfamkalij; levomentol; magnezijev oksid, lagani; arapska guma; titanijev dioksid (E171); karnauba vosak; talk; voda, pročišćena; dušik; kinolin žuta (E104).

Kako izgleda Nicorette Freshmint ljekovita guma za žvakanje

Nicorette Freshmint 2 mg ljekovita guma za žvakanje je bjelkasta, obložena guma za žvakanje, dimenzija, približno 15 x 15 x 6 mm.

Nicorette Freshmint 4 mg ljekovita guma za žvakanje je krem-boje, obložena guma za žvakanje, dimenzija, približno 15 x 15 x 6 mm.

30 (2x15) ljekovitih guma za žvakanje u (PVC/PVDC//Al) blister pakiranju, u kutiji.
105 (7x15) ljekovitih guma za žvakanje u (PVC/PVDC//Al) blister pakiranju, u kutiji.

Nisu sve veličine pakiranja prisutne na tržištu.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

McNeil AB
Box 941
SE-251 09 Helsingborg
Švedska

Proizvođač

McNeil AB
Norrbroplatsen 2
SE-251 09 Helsingborg
Švedska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

KENPHARM d.o.o.
Gajeva 49
10 000 Zagreb, Hrvatska

Ova uputa je posljednji put revidirana u prosincu 2023.