

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nicorette s okusom šumskog voća 1 mg po potisku, sprej za usnu sluznicu, otopina nikotin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako ne možete prestati pušiti nakon 6 mjeseci korištenja Nicorette spreja za usnu sluznicu.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Nicorette s okusom šumskog voća, sprej i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej
3. Kako primjenjivati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nicorette s okusom šumskog voća, sprej i za što se koristi

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej se koristi kao pomoć pri odvikavanju od pušenja kada želite odmah prestati pušiti ili postupno smanjivati pušenje prije nego što potpuno prestanete. Ta se vrsta liječenja naziva nadomjesnom terapijom nikotinom (engl. Nicotine Replacement Therapy, NRT).

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej ublažava simptome sustezanja od uzimanja nikotina uključujući snažnu potrebu za pušenjem, simptom koji se javi kod prestanka pušenja. Kada ljudski organizam naglo ostane bez nikotina iz duhana, javljaju se različite vrste nelagode koje nazivamo simptomima sustezanja. Pomoću Nicorette s okusom šumskog voća, spreja možete sprječiti ili smanjiti nelagodu i snažnu potrebu za pušenjem. To je zato što ćete u kratkom vremenskom razdoblju nastaviti pružati male količine nikotina svome tijelu. Nicorette s okusom šumskog voća, sprej ne sadrži katran, ugljikov monoksid niti ostale toksine koji se nalaze u dimu cigarete.

Kako biste poboljšali uspješnost liječenja, ukoliko možete, potražite savjet i podršku.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej

Nemojte primjenjivati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej

- **ako ste alergični na nikotin ili neki drugi sastojak ovog lijeka** (naveden u dijelu 6.).
- **ako ste mlađi od 18 godina.**
- **ako nikada niste pušili.**

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego primijenite ovaj lijek ukoliko patite od sljedećih stanja. Možda možete koristiti Nicorette s okusom šumskog voća, sprej no prvo porazgovarajte sa svojim liječnikom ukoliko:

- ste nedavno (u posljednja tri mjeseca) imali **srčani ili moždani udar**
- imate **bol u prsima** (nestabilna angina) ili angina u stanju mirovanja
- imate **bolest srca** koja utječe na brzinu ili ritam otkucaja srca
- imate **visoki krvni tlak** koji nije kontroliran lijekovima

- ukoliko ste imali **alergijske reakcije** koje uključuju oticanje usana, lica ili grla (angioedema) ili osip na koži praćen svrbežom (urtikarija). Korištenje nadomjesne terapije nikotinom može ponekad uzrokovati ove tipove reakcija
- Umjerenu ili tešku **bolest jetre**
- Tešku **bolest bubrega**
- **Šećernu bolest**
- Preaktivnu **štitnjaču**
- Tumor **nadbubrežne žljezde** (feokromocitom)
- **Čir želuca ili dvanaesnika**
- **Ezofagitis** (upalu sluznice jednjaka)
- **Epilepsija ili napadaji u povijesti bolesti**

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej ne smiju koristiti **nepušači**.

Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci i adolescentima.

Drugi lijekovi i Nicorette s okusom šumskog voća, sprej

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli neke druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez recepta. To je naročito važno ako uzimate lijekove koji sadrže:

- **teofilin** za lječenje astme
- **takrin** za lječenje Alzheimerove bolesti
- **klozapin** za lječenje shizofrenije
- **ropinirol** za lječenje Parkinsonove bolesti

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej s hranom i pićem

Nemojte istovremeno jesti ili piti prilikom primjene spreja za usnu sluznicu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Vrlo je važno prestati pušiti tijekom **trudnoće** jer pušenje može dovesti do slabog rasta vašeg djeteta. Također može dovesti do preranog poroda ili mrtvorodenosti. Najbolje je prestati pušiti bez uporabe lijekova koji sadrže nikotin. Ukoliko to nije moguće, Nicorette s okusom šumskog voća, sprej se smije koristit samo nakon savjetovanja s liječnikom koji Vam vodi trudnoću, obiteljskim liječnikom ili liječnikom specijaliziranim u pomaganju ljudima da prestanu pušiti.

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej treba izbjegavati za vrijeme **dojenja** jer se nikotin prenosi u majčino mlijeko i može utjecati na vaše dijete. Ukoliko Vam Vaš liječnik preporuči korištenje Nicorette s okusom šumskog voća, spreja, dozu treba uzeti odmah nakon dojenja, i ne tijekom 2 sata prije dojenja.

Pušenje povećava rizik od neplodnosti u žena i muškaraca. Učinak nikotina na plodnost je nepoznat.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije uočeno djelovanje na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej sadrži 12 mg propilenglikola po potisku.

Ovaj lijek sadrži oko 7 mg alkohola (etanola) po potisku što je ekvivalentno 97 mg/ml. Količina u jednom potisku ovog lijeka odgovara manje od 2 ml piva, odnosno, 1 ml vina. Mala količina alkohola u ovom lijeku neće imati primjetnih učinaka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmola natrija (23 mg) po potisku tj. zanemarive količine natrija. Zbog prisustva butiliranog hidroksitoluena, Nicorette s okusom šumskog voća, sprej može uzrokovati lokalne reakcije kože (tj. kontaktni dermatitis), ili nadraženost oka i mukoznih membrana.

3. Kako primjenjivati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej

Uvijek primjenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi o lijeku ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Mlađi od 18 godina ne bi smjeli uzimati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej.

Posavjetujte se s liječnikom ako niste postigli smanjenje broja potisaka spreja ili broja cigareta nakon 6 tjedana liječenja ili ako trebate koristiti Nicorette sprej dulje od 6 mjeseci. Uobičajeno bi bilo Nicorette sprej koristiti tijekom 3 mjeseca. Nicorette sprej ne treba uzimati duže od 6 mjeseci.

Upute o uporabi Nicorette spreja ovise o tome da li ćete odmah prestati pušiti ili ćete postupno smanjivati broj cigareta prije nego što u potpunosti prestanete.

Nagli prestanak pušenja

Cilj je odmah prestati pušiti i koristiti sprej za ublažavanje žudnje za pušenjem.

Ne koristite više od dva potiska spreja odjednom ili 4 potiska spreja na sat tijekom 16 sati.

Najviša dopuštena doza je 64 potiska spreja tijekom 16 sati u 24-satnom periodu.

1. korak: 1.- 6. tjedan

Primijenite 1 ili 2 potiska spreja u svoje uobičajeno vrijeme pušenja ili potrebe za cigaretom. Prvo primijenite jedan potisak, a ako nakon jednog potiska spreja ne prestane potreba za cigaretom u nekoliko minuta, potrebno je uzeti drugi potisak spreja. U slučaju da su potrebna 2 potiska spreja, sljedeće doze se mogu primijeniti kao 2 uzastopna potiska spreja. Većini pušača su potrebna 1-2 potiska spreja svakih 30 minuta do jednog sata.

Na primjer, ako pušite prosječno 15 cigareta na dan, trebali biste koristiti 1-2 potiska spreja barem 15 puta tijekom dana.

2. korak: 7. - 9. tjedan

Počnite smanjivati broj potisaka spreja po danu.

Do kraja 9. tjedna trebali biste koristiti POLA prosječnog dnevnog broja potisaka koji ste koristili u 1. koraku.

3. korak: 10. - 12. tjedan

Nastavite smanjivati broj dnevno primjenjenih potisaka spreja tako da ne koristite više od 4 potiska spreja po danu tijekom 12. tjedna. Kada ste smanjili na 2-4 potiska spreja po danu, trebali biste prestati koristiti Nicorette s okusom šumskog voća, sprej.

Postupni prestanak pušenja

U početku procesa postupnog prestanka pušenja cilj je zamijeniti neke od svojih cigareta sprejem Nicorette s okusom šumskog voća. Kada to postignete, potrebno je u potpunosti prestati pušiti cigarete tijekom korištenja spreja. Na kraju treba prestati koristiti sprej.

Kada osjetite snažnu potrebu za pušenjem, upotrijebite umjesto cigarete 1-2 potiska spreja koji će vam pomoći da kontrolirate žudnju. Sprej je zamjena za cigaretu, nemojte pušiti ubrzo nakon korištenja spreja. Ako budete koristili sprej bez smanjenja broja cigareta osjećat ćete se loše (pogledajte dio „Ako primjenite više Nicorette s okusom šumskog voća, sprej nego što ste trebali“). Smanjite dnevni broj cigareta što je više moguće i zamijenite ih sprejem. Ako smanjenje potrošnje cigareta nije postignuto nakon 6 tjedana liječenja, potražite savjet liječnika. Čim se budete osjećali spremni, trebali biste potpuno prestati, ali najkasnije 12 tjedana nakon početka liječenja. Nakon prestanka pušenja postupno smanjujte broj dnevnih potisaka spreja. Nakon smanjenja na 2-4 potiska spreja dnevno, prestanite koristiti Nicorette s okusom šumskog voća, sprej.

Ne koristite više od dva potiska spreja odjednom ili 4 potiska spreja na sat tijekom 16 sati.

Najviša dopuštena doza je 64 potiska spreja tijekom 16 sati u 24-satnom periodu.

Mogli biste doći u iskušenje da opet počnete pušiti nakon prestanka liječenja. Spremite sprej s preostalim dozama jer se snažna potreba za pušenjem može iznenada pojavit. Ukoliko se pojavi snažna potreba, koristite jedan potisak spreja, ili dva potiska ako jedan potisak spreja ne pomogne unutar nekoliko minuta.

Pažljivo slijedite ove upute i koristite slike kao vodič

Otključavanje mlaznice



Kako otvoriti dozator

1. Palcem spustite dugme (a) sve dok se može gurnuti lagano prema unutra (b). Nemojte pritisnuti prejako.
2. Dok pritišćete prema unutra, pomaknite prema gore (c) kako biste otključali vrh dozatora. Zatim otpustite dugme.



Kako napuniti dozator

Kada koristite Nicorette s okusom šumskog voća, sprej prvi put, morate napuniti pumpicu spreja. Usmjerite mlaznicu spreja na sigurnu udaljenost od vas, ostalih odraslih osoba, djece ili ljubimaca u blizini. Pritisnite vrh dozatora kažiprstom 3 puta dok se ne pojavi ravnomjerno raspršivanje. Ukoliko sprej ne koristite 2 dana, procedura punjenja dozatora mora biti ponovljena.

Kako koristiti dozator



3. Uperite mlaznicu prema svojim otvorenim ustima i držite ju što bliže ustima.
4. **Čvrsto** pritisnite vrh dozatora kako biste primijenili jedan potisak spreja u usta, izbjegavajući usne. Kako biste izbjegli raspršivanje u grlo nemojte udisati za vrijeme primjene spreja. Kako bi se postigli najbolji rezultati, nemojte gutati nekoliko sekundi nakon primjene spreja.

Uvlačenje mlaznice



Kako zatvoriti dozator

5. Gurnite dugme prema dolje (d) sve dok se može gurnuti prema unutra (e).
6. Dok pritišćete prema unutra, gurnite vrh dozatora prema dolje (f). Otpustite dugme. Dozator je sada zatvoren.

Kako biste uzeli još jednu dozu ponovite gore navedene korake.

Zatvorite dozator svaki put nakon uporabe kako biste spriječili djecu da koriste sprej ili kako biste spriječili slučajno raspršivanje. Pazite da prilikom primjene sprej ne dospije u oči. Ukoliko dođe u dodir s očima, temeljito isperite oči vodom.

Ako primijenite više Nicorette s okusom šumskog voća, spreja nego što ste trebali

Ako pušite tijekom uzimanja Nicorette s okusom šumskog voća, sprej može doći do predoziranja nikotinom. Ako dijete uzme Nicorette s okusom šumskog voća, sprej ili ako ste Vi uzeli više Nicorette s okusom šumskog voća, spreja nego što ste trebali, javite se svome liječniku ili **odmah** otidite u najbližu bolnicu. Doze nikotina koju podnose odrasli pušači tijekom liječenja mogu proizvesti teške simptome trovanja kod **djece**, te mogu biti **smrtonosne**.

Simptomi predoziranja su mučnina, povraćanje, pojačano lučenje sline, bol u trbuhi, proljev, znojenje, glavobolja, omaglica, promjena sluha i osjećaj izražene slabosti. Pri visokim dozama, ovi simptomi mogu biti popraćeni niskim krvnim tlakom, slabim i nepravilnim pulsom, otežanim disanjem, krajnjim umorom, cirkulatornim kolapsom i općim konvulzijama.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se one neće javiti kod svakoga.

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej može izazvati iste nuspojave kao i nikotin primijenjen na neki drugi način. Nuspojave obično ovise o dozi.

Simptomi povezani s prestankom pušenja (simptomi sustezanja od nikotina)

Neki od neželenih učinaka koje doživljavate kada prestanete pušiti mogu biti simptomi sustezanja zbog smanjenja unosa nikotina.

Ti učinci uključuju:

- Razdražljivost, agresivnost, nestrpljivost ili frustraciju
- Osjećaj tjeskobe, nemira ili poteškoće s koncentracijom
- Budjenje tijekom noći ili smetnje spavanja
- Povećani apetit ili dobivanje na težini
- Sniženo raspoloženje
- Potreba za pušenjem (žudnja)
- Smanjenje brzine otkucanja srca
- Krvarenje desni ili vrijedove u usnoj šupljini
- Omaglicu ili ošamućenost
- Kašalj, grlobolja, začepljen nos ili curenje iz nosa
- Zatvor

Ako primijetite bilo koju od sljedećih ozbiljnih, rijetkih nuspojava, prestanite uzimati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej i odmah kontaktirajte lječnika (znakovi angioedema):

- Otečeno lice, jezik ili ždrijelo
- Otežano gutanje
- Koprivnjača i otežano disanje

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba:

- Štucanje (to je osobito često)
- Glavobolja, mučnina (osjećati se bolesno)
- Nadraženost grla

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba:

- Lokalni učinci poput osjećaja pečenja, upale u ustima, promjene u osjetu okusa
- Suha usta ili povećane količine sline
- Osjećaj probavnih smetnji
- Bol ili nelagoda u trbuhu
- Povraćanje, nadutost ili proljev
- Umor
- Preosjetljivost (alergija)
- Trnci
- Kašalj

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba:

- Učinci na nos poput začepljene nosa, kihanja
- Curenje iz nosa
- Piskanja pri disanju (bronhospazam) ili osjećaj da disanje zahtjeva više napora nego uobičajeno (dispneja), stezanje grla
- Navale crvenila kože ili pojačano znojenje
- Učinci u ustima poput trnaca u ustima, upale jezika, vrijedova u usnoj šupljini, oštećenja sluznice usta, ili promjena u zvuku glasa, boli u ustima i grlu, podrigivanja, krvarenje iz desni
- Palpitacije (neobična svijest o vlastitim otkucanjima srca), povećana brzina otkucanja srca, hipertenzija
- Osip i/ili svrbež (urtikarija, pruritus) kože
- Abnormalan san
- Nelagoda u prsim i bol
- Slabost, loše osjećanje

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- Otežano gutanje, smanjen osjet u ustima
- Nagon na povraćanje

Nepoznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka:

- Zamagljen vid, povećana proizvodnja suza (lakrimacija)
- Suho grlo, nelagoda u želucu, bol u usnama
- Abnormalan ritam srca
- Crvenilo kože
- Alergijske reakcije, uključujući oticanje lica i usta (angioedem ili anafilaksija)
- Abnormalan ritam srca
- Napadaj

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nicorette s okusom šumskog voća, sprej

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na spreju i na vanjskom pakiranju iza oznake „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nicorette s okusom šumskog voća, sprej sadrži

Djelatna tvar je nikotin. Jedan potisak spreja isporučuje 1 mg nikotina.

Pomoćne tvari su: propilenglikol (E1520), bezvodni etanol, trometamol, poloksamer 407, glicerol (E422), natrijev hidrogenkarbonat, levomentol, aroma (crvenog) šumskog voća, aroma s efektom hlađenja, sukraloza, acesulfamkalij, butilirani hidroksitoluen (E321), kloridna kiselina (za podešavanje pH) i pročišćena voda.

Kako Nicorette s okusom šumskog voća, sprej izgleda i sadržaj pakiranja

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej se sastoji od plastične boćice s otopinom koja se nalazi u dozatoru s mehaničkom pumpicom. Dozator ima sigurnosni mehanizam za djecu.

Svaka boćica sadrži 13,2 ml otopine što omogućava 150 potisaka spreja.

Nicorette s okusom šumskog voća, sprej se isporučuje u pakiranjima s 1 ili 2 dozatora.

Nicorette sprej je također dostupan u pakiranju od 1 ili 2 dozatora, uključujući čip za komunikaciju s bliskim poljem (NFC), smješten ispod stražnje naljepnice a koji omogućuje povezivanje s aplikacijom za „pametni telefon“.

Navedeni dozatori nose ovaj piktogram:



Napomena: Gore navedene dvije rečenice koje se odnose na prezentaciju s NFC čipom biti će otisnute u Uputama o lijeku samo u zemljama u kojima je ova prezentacija dostupna.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

McNeil AB

Box 941

SE-251 09 Helsingborg

Švedska

Proizvođač

McNeil AB

Norrbroplatsen 2,

SE-251 09 Helsingborg

Švedska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

KENPHARM d.o.o.

Gajeva 49

10 000 Zagreb, Hrvatska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Švedska	Nicorette Fruktmint
Austrija	Nicorette Fruit & Mint Spray

Belgija / Nizozemska	Nicorette Fruit & Mint Mondspray
Bugarska	Nicorette Berrymint
Hrvatska	Nicorette s okusom šumskog voća
Cipar	Nicorette Quickspray Berry
Češka	Nicorette Spray s příchutí lesního ovoce
Danska	Nicorette QuickMist Cool Berry
Estonija	Nicorette Coolberry
Finska	Nicorette Berrymint
Francuska	NICORETTESPRAY® FRUITS ROUGES
Njemačka	Nicorette Fruit & Mint Spray
Grčka	Nicorette Quickspray Berry
Mađarska	Nicorette Berrymint
Island	Nicorette Quickmist Cool Berry
Irska	Nicorette QuickMist Cool Berry
Italija	Nicorettequick
Latvija	Nicorette Coolberry
Luksembourg	Nicorette Fruit & Mint Spray Buccal
Norveška	Nicorette
Poljska	Nicorette Cool Berry
Portugal	Nicorette Bucomist sabor fruta menta
Rumunjska	Nicorette Berrymint
Slovačka	Nicorette Spray s príchuťou lesného ovocia
Slovenija	Nicorette z okusom gozdnih sadežev
Španjolska	Nicorette Bucomist sabor fruta menta

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2024.