

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Nurofen Rapid Forte 400 mg meke kapsule ibuprofen

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Nurofen Rapid Forte i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nurofen Rapid Forte
3. Kako uzimati Nurofen Rapid Forte
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nurofen Rapid Forte
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nurofen Rapid Forte i za što se koristi

Nurofen Rapid Forte sadrži djelatnu tvar ibuprofen koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL). Ti lijekovi pružaju olakšanje mijenjajući odgovor tijela na bol i povišenu tjelesnu temperaturu.

Nurofen Rapid Forte kapsule koriste se kod odraslih i adolescenata iznad 40 kg tjelesne težine (od 12 godina starosti) za:

- ublažavanje simptoma blage do umjerene boli poput glavobolje, menstrualne boli i zubobolje
- snižavanje povišene tjelesne temperature i smanjenje boli kod obične prehlade.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nurofen Rapid Forte

Nemojte uzimati Nurofen Rapid Forte:

- ako ste alergični na ibuprofen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako ste ikada patili od kratkoće daha, astme, curenja nosa, otekline ili koprivnjače nakon primjene acetilsalicilatne kiseline ili sličnih lijekova protiv boli iz skupine NSAIL.
- ako imate (ili ste imali dvije ili više epizoda) čira na želucu/dvanaesniku ili krvarenje iz probavnog sustava.
- ako imate ili ste imali krvarenje ili puknuće stijenke u probavnom sustavu povezano s primjenom lijekova iz skupine NSAIL.
- ako bolujete od poremećaja stvaranja krvnih stanica.
- ako patite od poremećaja nekontroliranog krvarenja (hemoragije) ili zgrušavanja krvi (koagulacije).
- ako imate teško zatajenje jetre, bubrega ili srca.

- tijekom zadnjeg tromjesečja trudnoće (pogledajte dio "Trudnoća, dojenje i plodnost" u nastavku teksta).
- ako patite od teške dehidracije (uzrokovane povraćanjem, proljevom ili nedovoljnim unosom tekućine).
- ako patite od krvarenja u mozgu (cerebrovaskularno krvarenje) ili drugog aktivnog krvarenja.

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu kod adolescenata koji imaju manje od 40 kg tjelesne težine niti kod djece mlađe od 12 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Protuupalni lijekovi/lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja.

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Nurofen Rapid Forte ako:

- imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani udar, ugradnju prenosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući "mini moždani udar" ili prolazni ishemijski napadaj).
- imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji, ili ako ste pušač
- imate infekciju – vidjeti dio „Infekcije” u nastavku.

Infekcije

Nurofen Rapid Forte može prikriti znakove infekcija kao što su vrućica i bol. Stoga je moguće da Nurofen Rapid Forte može odgoditi odgovarajuće liječenje infekcije, što može dovesti do povećanog rizika od komplikacija. To je opaženo kod upale pluća uzrokovane bakterijama i bakterijskih kožnih infekcija povezanih s vodenim kozicama. Ako uzimate ovaj lijek dok imate infekciju, a simptomi infekcije ustraju ili se pogoršaju, odmah se obratite liječniku.

- ako imate sistemski eritemski lupus (SLE) ili miješanu bolest vezivnog tkiva (bolest imunološkog sustava koja uzrokuje bol u zglobovima, kožni osip i povišenu temperaturu).
- ako bolujete od ozbiljnih reakcija na koži poput ekfolijativnog dermatitisa, Stevens-Johnsonovog sindroma i toksične epidermalne nekrolize. Ozbiljne kožne reakcije prijavljene su povezano s liječenjem lijekom Nurofen Rapid Forte. Potrebno je prekinuti uzimanje lijeka Nurofen Rapid Forte i odmah potražiti liječničku pomoć ako Vam se pojavi bilo kakav osip na koži, oštećenje sluznice, mjehurići ili drugi znakovi alergije jer to mogu biti prvi znakovi vrlo ozbiljne kožne reakcije. Vidjeti dio 4.
- ako imate nasljedni poremećaj stvaranja krvi (akutna intermitentna porfirija) ili poremećaj zgrušavanja krvi.
- ako imate ili ste ikada imali bolesti crijeva (ulcerozni kolitis ili Crohnova bolest).
- ako ste ikada imali visoki krvni tlak i/ili zatajenje srca.
- ako imate smanjenu funkciju bubrega.
- ako imate poremećaj u radu jetre.
- neposredno nakon velike operacije.
- ako imate ili ste imali astmu ili alergijske bolesti jer se može pojaviti kratkoća daha.
- ako patite od peludne alergije, nosnih polipa ili kronične opstruktivne bolesti pluća jer postoji povećan rizik od alergijskih reakcija. Alergijske reakcije mogu biti u obliku napadaja astme (takozvana aspirinska astma), oticanja kože (Quinckeov edem) ili koprivnjače.
- ako koristite druge lijekove koji mogu povećati rizik od nastanka čireva u probavnom sustavu ili krvarenja poput oralnih kortikosteroida, lijekova koji razrjeđuju krv (poput varfarina), selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (lijekovi protiv depresije) te lijekove protiv zgrušavanja krvi poput acetilsalicilatne kiseline.

Djeca i adolescenti

Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega kod dehidrirane djece i adolescenata.

Drugi lijekovi i Nurofen Rapid Forte

Što bi trebalo izbjegavati tijekom primjene ovog lijeka?

Lijek Nurofen Rapid Forte može utjecati na druge lijekove ili na njega mogu utjecati drugi lijekovi. Primjerice:

- lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeđuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice, aspirin/acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin).
- lijekovi koji snižavaju visoki krvni tlak (ACE-inhibitori poput kaptoprila, beta-blokatori poput atenolola, antagonisti receptora angiotenzina-II kao što je losartan).

Nemojte koristiti ovaj lijek ako koristite acetilsalicilatnu kiselinu u dozama višim od 75 mg dnevno. Ako koristite nisku dozu acetilsalicilatne kiseline (do 75 mg dnevno) razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene Nurofena Rapid Forte.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Posebno ih obavijestite ako uzimate sljedeće lijekove:

- druge lijekove iz skupine NSAIL (protuupalni lijekovi i analgetici)
- digoksin (za liječenje zatajenja srca)
- glukokortikoide (lijekovi koji sadrže kortizon ili tvari slične kortizonu)
- lijekove protiv zgrušavanja krvi
- lijekove koji razrjeđuju krv (poput varfarina, acetilsalicilatne kiseline i tiklopidina)
- fenitoin (za epilepsiju)
- selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (lijekovi za liječenje depresije)
- litij (lijek za liječenje manično-depresivnog poremećaja i depresije)
- probenecid i sulfinpirazon (lijekovi za liječenje gihta)
- lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka (ACE-inhibitore, npr. kaptopril, blokatore beta receptora, antagoniste angiotenzina II) i diuretike
- diuretike koji štede kalij
- metotreksat (lijek za liječenje karcinoma ili reumatizma)
- takrolimus i ciklosporin (imunosupresivni lijekovi)
- zidovudin (lijek za liječenje HIV infekcije)
- sulfonilureje (lijekovi za liječenje šećerne bolesti)
- kinolonske antibiotike
- mifepriston (lijek za prekid trudnoće)

Liječenje lijekom Nurofen Rapid Forte moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli utjecati na lijek Nurofen Rapid Forte. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe lijeka Nurofen Rapid Forte zajedno s drugim lijekovima.

Nurofen Rapid Forte s hranom, pićem i alkoholom

Kapsule progutajte cijele s vodom. Bolesnicima s osjetljivim želucem se preporučuje da Nurofen Rapid Forte kapsule uzmu uz obrok. Neke nuspojave, poput onih koje se odnose na probavni sustav, mogu biti učestalije ako se uz Nurofen Rapid Forte kapsule konzumira alkohol.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nemojte koristiti ovaj lijek u zadnjem tromjesečju trudnoće. Tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće izbjegavajte primjenu ovog lijeka osim ako Vam liječnik ne savjetuje drugačije.

Dojenje

Samo male količine ibuprofena i njegovih metabolita se izlučuju u majčino mlijeko. Ovaj lijek se smije koristiti tijekom dojenja ako se koriste preporučene doze kroz najkraće moguće vrijeme.

Utjecaj na plodnost kod žena

Lijek pripada skupini lijekova (NSAIL) koja može smanjiti plodnost kod žena. Ova pojava je reverzibilna i nestaje nakon prestanka terapije. Ako pokušavate zatrudnjeti, izbjegavajte primjenu ovog lijeka.

Prije primjene bilo kojeg lijeka uvijek potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom kratkotrajne primjene i uz pridržavanje preporučenog doziranja, ovaj lijek nema ili ima zanemarljiv utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Bolesnici koji osjete omaglicu, pospanost, vrtoglavicu ili poremećaje vida tijekom primjene Nurofena Rapid Forte trebaju izbjegavati upravljanje vozilima i rad sa strojevima. Ove nuspojave se mogu i pojačati ako se uz lijek istodobno konzumira alkohol.

Ostala upozorenja

- Dugotrajna primjena lijekova protiv boli kod glavobolje može dovesti do njenog pogoršanja. U ovoj situaciji prestanite s primjenom Nurofena Rapid Forte i javite se Vašem liječniku.
- Lijekovi poput Nurofena Rapid Forte mogu biti povezani s malim povećanjem rizika od srčanog udara ("infarkt miokarda") ili moždanog udara. Mogući rizik se povećava povećanjem doze i produljenim vremenom liječenja. Nemojte prekoračiti preporučene doze ili vrijeme trajanja terapije (3 dana u slučaju povišene temperature i 4 dana u slučaju boli).
- Ako imate problema sa srcem, ako ste preboljeli moždani udar ili mislite da imate povećan rizik za navedena stanja (na primjer ako imate visoki krvni tlak, šećernu bolest, visoke vrijednosti masnoća u krvi ili ste pušač) porazgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom o ovoj terapiji.
- Tijekom infekcije vodenim kozicama (varicela) izbjegavajte primjenu Nurofena Rapid Forte.
- Kod produljene primjene Nurofena Rapid Forte potrebno je redovito kontrolirati vrijednosti jetrenih enzima, funkciju bubrega i krvnu sliku.
- Treba izbjegavati istodobnu primjenu više lijekova iz skupine NSAIL, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2, s obzirom na to da je tada povećan rizik od razvoja nuspojava (pogledajte dio "Drugi lijekovi i Nurofen Rapid Forte").
- Istodobna primjena nekoliko lijekova protiv boli može povećati rizik od razvoja ozbiljnih problema s bubrezima te ju stoga treba izbjegavati. Rizik se dodatno povećava uslijed dehidracije.

Nuspojave se mogu ublažiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno da bi se ublažili simptomi. Stariji bolesnici imaju povećan rizik za razvoj nuspojava.

Obratite se Vašem liječniku za savjet prije primjene lijeka Nurofen Rapid Forte ako smatrate da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas.

Nurofen Rapid Forte sadrži sorbitol i Ponceau 4R.

Ovaj lijek sadrži 36,6 mg sorbitola u jednoj kapsuli.

Lijek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Nurofen Rapid Forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Najnižu učinkovitu dozu potrebno je primjenjivati tijekom najkraćeg razdoblja potrebnog za ublažavanje simptoma. Ako imate infekciju, odmah se obratite liječniku ako simptomi (kao što su vrućica i bol) ustraju ili se pogoršaju (vidjeti dio 2.).

Odrasli i adolescenti koji imaju 40 kg tjelesne težine i više (od 12 godina starosti):

Početna doza: uzmite 1 kapsulu (400 mg ibuprofena) s dovoljnom količinom vode. Ako je potrebno, uzmite 1 dodatnu kapsulu (400 mg ibuprofena) svakih 6 sati. Nemojte prekoračiti ukupnu dozu od 3 kapsule (1200 mg ibuprofena) tijekom 24 sata.

Ovaj lijek nemojte davati adolescentima koji imaju manje od 40 kg tjelesne težine ili djeci mlađoj od 12 godina.

Način primjene

Za primjenu kroz usta. Kapsule se ne smiju žvakati.

Bolesnicima s osjetljivim želucem se preporučuje da Nurofen Rapid Forte kapsule uzmu uz obrok. Ako se uzme ubrzo nakon obroka, početak djelovanja Nurofena Rapid Forte može biti odgođen. U tom slučaju nemojte uzeti više Nurofen Rapid Forte kapsula nego što je preporučeno u ovom dijelu ili pričekajte da prođe propisani vremenski razmak između dvije doze lijeka.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu. Uvijek uzmite najnižu učinkovitu dozu kroz najkraće moguće vrijeme potrebno da bi se ublažili simptomi.

Ako simptomi u odraslih potraju duže od 3 dana u slučaju povišene temperature ili više od 4 dana u slučaju boli ili ako se simptomi bolesti pogoršaju, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Ako se kod adolescenata starijih od 12 godina ovaj lijek mora primjenjivati duže od 3 dana ili ako se simptomi bolesti pogoršaju, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Molimo Vas da se obratite Vašem liječniku ili ljekarniku ako Vam se čini da je učinak lijeka prejak ili preslab.

Ako uzmete više Nurofena Rapid Forte nego što ste trebali

Ako ste uzeli više Nurofena Rapid Forte nego što ste trebali, ili ako su djeca slučajno uzela lijek, obratite se liječniku ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupku koji će se poduzeti. Simptomi mogu uključivati mučninu, bol u trbuhu, povraćanje (prošarano krvlju), glavobolju, zujanje u ušima, smetenost, nekontroliran pokret oka i pospanost. Pri visokim dozama zabilježeni su omamljenost, bol u prsnom košu, osjećaj lupanja srca, gubitak svijesti, konvulzije (uglavnom u djece), slabost i omaglica, krv u mokraći, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem. Rijetko se mogu pojaviti i: niski krvni tlak i zatajenje disanja (respiratorna depresija) te modra boja kože i sluznica (cijanoza).

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Nuspojave se mogu umanjiti primjenom najniže učinkovite doze kroz najkraće moguće vrijeme potrebno za ublažavanje simptoma.

Ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava, prestanite uzimati ovaj lijek i odmah potražite pomoć liječnika:

- **znakove krvarenja u probavnom sustavu** poput: jake boli u trbuhu, crne katranaste stolice, povraćanja krvi ili tamnih čestica koje podsjećaju na talog kave.
- **znakove vrlo rijetke, ali ozbiljne alergijske reakcije** poput pogoršanja astme, neobjašnjivog piskanja ili kratkoće daha, oticanja lica, jezika ili grla, otežanog disanja, ubrzanog rada srca, pada krvnog tlaka koji može dovesti do šoka, što se može dogoditi već tijekom prve primjene lijeka.
- **ozbiljne reakcije na koži** poput osipa po cijelom tijelu, stvaranja mjehurića, ljuskanja ili ljuštenja kože.

Ostale nuspojave koje se mogu pojaviti:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

- poremećaji u probavnom sustavu, poput žgaravice, bolova u trbuhu, mučnine i loše probave, povraćanja, vjetrova, proljeva, zatvora te blagog gubitka krvi kroz želudac i/ili crijeva koji u iznimnim slučajevima može uzrokovati anemiju.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

- čirevi na želucu ili crijevima, ponekad praćeni krvarenjem i probušenjem želuca ili crijeva, upala sluznice usta s ranama (ulcerozni stomatitis), upala sluznice želuca (gastritis), pogoršanje upale debelog crijeva i Crohnove bolesti
- poremećaji središnjeg živčanog sustava poput glavobolje, omaglice, nesаницe, uznemirenosti, razdražljivosti ili umora
- poremećaji vida
- alergijske reakcije poput koprivnjače, svrbeža i napadaja astme. Prestanite s primjenom lijeka i odmah obavijestite svog liječnika.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

- tinitus (zujanje u ušima)
- oštećenja bubrega (papilarna nekroza) i povišena koncentracija mokraćne kiseline u krvi.

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10000 osoba)

- tijekom liječenja s lijekovima iz skupine NSAIL zabilježeno je oticanje (edemi), visoki krvni tlak (hipertenzija) i zatajenje srca
- upala jednjaka ili gušterače, stvaranje suženja u tankom i debelom crijevu
- tijekom infekcije vodenim kozicama (varicela) pojavljivale se su ozbiljne infekcije kože i mekih tkiva
- smanjeno izlučivanje urina i oticanje (posebno kod bolesnika s visokim krvnim tlakom ili smanjenom funkcijom bubrega); oticanje (edemi) i zamućenost urina (nefrotski sindrom); upalna bolest bubrega (intersticijski nefritis) koja može dovesti do akutnog zatajenja bubrega. Ako se bilo koji od gore navedenih simptoma pojavi ili se općenito loše osjećate, prestanite s primjenom lijeka Nurofen Rapid Forte i odmah se javite svom liječniku jer ovo mogu biti prvi znakovi oštećenja ili zatajenja bubrega.
- poremećaj u stvaranju krvnih stanica – prvi znakovi su: povišena temperatura, grlobolja, površinske rane u ustima, simptomi slični gripi, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože. U ovim slučajevima odmah prekinite primjenu lijeka i javite se svom liječniku. Ne preporučuje se samoliječenje lijekovima protiv boli ili lijekovima koji snižavaju povišenu tjelesnu temperaturu (antipireticima).
- psihotične reakcije i depresija

- zabilježeno je pogoršanje zaraznih bolesti (npr. nekrotizirajući fasciitis) tijekom primjene određenih lijekova protiv boli (NSAIL). Ako se tijekom primjene lijeka Nurofen Rapid Forte pojave ili pogoršaju znakovi infekcije, odmah se javite svom liječniku. To je bitno kako bi liječnik procijenio da li je indicirana upotreba antibiotske terapije.
- visoki krvni tlak, nepravilan rad i zatajenje srca, srčani udar (infarkt)
- disfunkcija jetre, oštećenja jetre, posebno tijekom dugotrajne primjene lijeka, zatajenje jetre, akutna upala jetre (hepatitis)
- tijekom primjene ibuprofena zabilježeni su simptomi aseptičkog meningitisa uz ukočenost vrata, glavobolju, mučninu, povraćanje, povišenu temperaturu ili gubitak svijesti. Za ove nuspojave predisponirani su bolesnici s autoimunim bolestima (SLE – sistemski eritemski lupus, miješana bolest vezivnog tkiva). Ako primijetite navedene simptome, odmah potražite savjet liječnika.
- teški oblici kožnih reakcija poput osipa na koži praćenih crvenilom i stvaranjem mjehurića (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom), gubitak kose (alopecija)
- teške generalizirane reakcije preosjetljivosti
- pogoršanje astme i bronhospazma.

Lijekovi poput Nurofena Rapid Forte mogu biti povezani s malim povećanjem rizika od srčanog udara ("infarkta miokarda") ili moždanog udara.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

Može se pojaviti teška kožna reakcija poznata kao sindrom DRESS. Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, vrućicu, oticanje limfnih čvorova i povećanje razine eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica).
– koža postaje osjetljiva na svjetlost

Crveni, ljuskavi, prošireni osip s kvržicama ispod kože i mjehurićima uglavnom lokaliziran na naborima kože, trupu i gornjim udovima popraćen vrućicom na početku liječenja (akutna generalizirana egzantematozna pustuloza). Prestanite primjenjivati lijek Nurofen Rapid Forte u slučaju nastanka tih simptoma i odmah potražite liječničku pomoć. Vidjeti također dio 2.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V.**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nurofen Rapid Forte

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom i unutarnjem pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage. Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nurofen Rapid Forte sadrži

Djelatna tvar je ibuprofen. Jedna kapsula sadrži 400 mg ibuprofena.
Pomoćne tvari su makrogol 600, kalijev hidroksid, pročišćena voda, djelomično dehidriran tekući sorbitol (E420), želatina, boja Ponceau 4R (E124), titanijev dioksid (E171), propilenglikol, hipromeloza (E464), trigliceridi srednje duljine lanca, lecitin (E322).

Kako Nurofen Rapid Forte izgleda i sadržaj pakiranja

Kapsule su crvene, ovalne i prozirne, s otisnutim bijelim logom nurofen. Kapsule su dostupne u pakiranju od 8, 10 ili 20 mekih kapsula.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelj odobrenja:

Reckitt Benckiser d.o.o.,
Ulica grada Vukovara 269 D,
10 000 Zagreb

Proizvođač:

RB NL Brands B.V.,
Schiphol Boulevard 207,
1118 BH Schiphol,
Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2022.