

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika
Oktenidindiklorid Klosterfrau 2,6 mg pastile

oktenidindiklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Oktenidindiklorid Klosterfrau i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Oktenidindiklorid Klosterfrau
3. Kako primjenjivati Oktenidindiklorid Klosterfrau
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Oktenidindiklorid Klosterfrau
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Oktenidindiklorid Klosterfrau i za što se koristi

Oktenidindiklorid Klosterfrau sadrži djelatnu tvar oktenidindiklorid. To je antiseptik koji učinkovito uništava staničnu funkciju patogena.

Oktenidindiklorid Klosterfrau se primjenjuje za kratkotrajno adjuvantno liječenje upale sluznice usta i grla popraćene uobičajenim simptomima kao što su bol, crvenilo i otekline.

Oktenidindiklorid Klosterfrau je indiciran u odraslih i adolescenata u dobi od 12 godina i starijih.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 4 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Oktenidindiklorid Klosterfrau

Nemojte primjenjivati Oktenidindiklorid Klosterfrau

ako ste alergični na oktenidindiklorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Oktenidindiklorid Klosterfrau.

Samo za kratkotrajnu primjenu.

Nemojte primjenjivati ovaj lijek dulje od 4 dana.

Djeca

Sigurnost i djelotvornost lijeka Oktenidindiklorid Klosterfrau u djece u dobi od 0 do 11 nisu još ustanovljene.

Drugi lijekovi i Oktenidindiklorid Klosterfrau

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Trudnice se prije primjene lijeka Oktenidindiklorid Klosterfrau trebaju savjetovati s liječnikom.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o izlučivanju oktenidinklorida u majčino mlijeko.

Ne može se isključiti rizik za dojenče. Oktenidindiklorid Klosterfrau se stoga ne smije uzimati tijekom dojenja.

Plodnost

Ispitivanja nisu provedena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima nisu provedena.

Oktenidin Klosterfrau sadrži izomalt (E 953).

Jedna pastila sadrži 2,57 g zamjene za šećer izomalt što odgovara približno 6 kcal (26 kJ). O tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti. Izomalt može imati blagi laksativni učinak.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako primjenjivati Oktenidindiklorid Klosterfrau

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Osim ako nije drugačije propisano, odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji trebaju uzeti jednu pastilu svaka 2-3 sata. Maksimalna dnevna doza je 6 pastila.

Put primjene:

Pastilu trebate aktivno i kontinuirano sisati u ustima. Pastilu morate pomicati po ustima dok se potpuno ne otopi.

Bez preporuke liječnika Oktenidindiklorid Klosterfrau ne smije se koristiti dulje od 4 dana.

Nuspojave se mogu smanjiti primjenom najmanje učinkovite doze kroz najkraće vrijeme potrebno za kontrolu simptoma.

Ako primijenite više lijeka Oktenidindiklorid Klosterfrau nego što ste trebali

U vrlo malo vjerojatnom slučaju predoziranja, opisane nuspojave mogu se javiti u pojačanom intenzitetu. U tom slučaju, molimo obratite se liječniku radi simptomatskog liječenja.

Ako ste zaboravili primijeniti Oktenidindiklorid Klosterfrau

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu pastilu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- Iritacije sluznice usne šupljine i želuca kao što su disgeuzija, suha usta, dispepsija, mučnina i bolovi u trbuhu.
- Promjena boje jezika.
- Alergijske reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Oktenidindiklorid Klosterfrau

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „Exp“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati blister u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Oktenidindiklorid Klosterfrau sadrži

- Djelatna tvar je oktenidindiklorid. Jedna pastila sadrži 2,6 mg oktenidindiklorida.
- Druge pomoćne tvari su izomalt (E 953), tartaratna kiselina, tvar za maskiranje gorkog okusa (sadrži propilenglikol, ekstrakt kave i 4-(2,2,3-trimetilciklopentil)butanoatnu kiselinu), eterično ulje zvjezdastog aniša, eterično ulje paprene metvice i sukraloza (E 955).

Kako Oktenidindiklorid Klosterfrau izgleda i sadržaj pakiranja

Pastile su boje slonovače, okrugle i blago prozirne.

Oktenidindiklorid Klosterfrau je dostupan u kartonskim kutijama koje sadrže 12, 16, 20 ili 24 pastile pakirane u blistere od PVC/PVDC i aluminijske folije.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

M.C.M. Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11

50670 Cologne
Njemačka

Proizvođač
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin
Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.
Srebrnjak 61
10 000 Zagreb
Tel. 01/2396900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Njemačka, Luksemburg: Laryngomedin Octenidin Antisept
Austrija: Octeangin antisept 2,6 mg Pastillen
Belgija, Bugarska, Mađarska, Poljska, Rumunjska: Octeangin
Republika Češka, Estonija, Latvija, Litva, Slovačka: Octenidine Klosterfrau
Slovenija: Oktenidin Klosterfrau
Hrvatska: Oktenidindiklorid Klosterfrau

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2025.