

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Hepan 500 IU/g + 5 mg/g krema (heparinnatrij, dekspantenol)

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Hepan krema i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hepan kremu?
3. Kako primjenjivati Hepan kremu?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Hepan kremu?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Hepan krema i za što se koristi?

Hepan krema spada u skupinu antivarikozne terapije. U sastavu sadrži heparinnatrij i dekspantenol.

Hepan krema koristi se za lokalno liječenje površinskog tromboflebitisa (lokalizirana upala površinskih vena i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Hepan kremu?

Nemojte primjenjivati Hepan kremu:

- ako ste alergični na heparin i/ili dekspantenol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
- ako imate potkoljениčni vrijed (ulkus kruris)
- na otvorenim ranama
- ako oboljela površina kože krvari
- ako je oboljela površina kože zahvaćena infekcijom
- u novorođenčadi i dojenčadi
- ako imate trenutnu ili prethodnu alergijsku trombocitopeniju (tipa II) na heparin
- na sluznicama.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Hepan kremu.

Obavijestite Vašeg liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.

Za vrijeme korištenja Hepan kreme treba paziti da krema ne dospije u oči, na sluznicu ili otvorene rane, kao i na kožu zahvaćenu infekcijom.

Djeca

Zbog veće propusnosti kože Hepan krema se ne primjenjuje u novorođenčadi i dojenčadi.

Drugi lijekovi i Hegan krema

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Uz Hegan kremu lokalno se ne koriste drugi lijekovi pa interakcije nisu zabilježene.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete nakon lokalne primjene heparinnatrija i dekspantenola. Trudnice i dojilje mogu primjenjivati Hegan kremu samo ako je neophodno te uz prethodno savjetovanje s liječnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Hegan krema ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Hegan krema sadrži lanolin, cetilni i stearilni alkohol, natrijev laurilsulfat, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat

Lanolin i cetilni i stearilni alkohol mogu uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Ovaj lijek sadrži 1,25 - 6,25 mg natrijevog laurilsulfata u 1 g kreme. Natrijev laurilsulfat može uzrokovati lokalne kožne reakcije (kao što su osjećaj peckanja ili žarenja) ili pojačati kožne reakcije uzrokovane drugim lijekovima kada se primjenjuju na isto područje.

Metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene).

3. Kako primjenjivati Hegan kremu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Hegan krema nanosi se na oboljelo mjesto 1 - 3 puta dnevno u tankom sloju, bez utrljavanja u kožu.

Trajanje liječenja

Bez savjetovanja s liječnikom do najviše 2 tjedna. U kroničnim slučajevima moguće je dulje liječenje, ali samo nakon pregleda i preporuke liječnika.

Dulja primjena tada treba biti pod liječničkim nadzorom.

Način primjene

Samo za primjenu na kožu. Krema se nanosi na oboljelo mjesto u tankom sloju bez utrljavanja.

Ako primijenite Hegan kreme više nego što ste trebali

Koristi li se krema prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- alergijske reakcije kože, svrbež, crvenilo i peckanje.

U slučaju navedenih reakcija potrebno je prekinuti s korištenjem kreme.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Hegan kremu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
Rok valjanosti u primjeni: 3 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Hegan krema sadrži?

Djelatne tvari su: heparinnatrij i dekspantenol. 1 g kreme sadrži: 500 IU heparinnatrija i 5 mg dekspantenola.

Pomoćne tvari su: bijeli vazelin, Lanette SX (cetilni i steartilni alkohol, natrijev laurilsulfat, natrijev cetostearilsulfat), izopropilmiristat, lanolin, metilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, pročišćena voda.

Kako Hegan krema izgleda i sadržaj pakiranja?

Hegan 500 IU/g +/- 5 mg/g krema je bijela, homogena krema.
Aluminijska tuba s 50 g kreme, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2018.