

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Panatus 20 mg filmom obložene tablete butamiratcitrat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Panatus i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus?
3. Kako uzimati Panatus?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Panatus i za što se koristi?

Panatus filmom obložene tablete su lijek za simptomatsko liječenje, odnosno ublažavanje nadražajnog suhog kašlja (antitusik sa centralnim djelovanjem).

Ovaj je lijek namijenjen za primjenu u djece starije od 6 godina, adolescenata, odraslih i starijih bolesnika.

Sprječava suh i nadražajni kašalj, smanjuje napetost bronhijalnih mišića te olakšava disanje i bolove u prsima. Sve to povoljno utječe na poboljšanje kapaciteta disanja i koncentracije plinova u krvi. Kemijski i po farmakološkim učincima Panatus se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus?

Nemojte uzimati Panatus

- ako ste alergični na butamiratcitrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Panatus:

- ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre.
- ako uzimate ekspektoranse (lijekove za olakšavanje iskašljavanja), odnosno ako imate produktivni kašalj.

Potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za djecu mlađu od 6 godina.

Drugi lijekovi i Panatus

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Panatus nije pokazao nikakve interakcije ni utjecaj na druge lijekove. Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu s ekspektoransima (lijekovi za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja), jer mogu uzrokovati zadržavanje sluzi u dišnom sustavu i time povećati rizik od otežavanja prohodnosti i infekcije dišnih puteva.

Panatus s hranom i pićem

Panatus tablete progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela. Tijekom liječenja Panatusom nemojte piti alkoholna pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne preporučuje se uzimanje Panatusa tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom kasnijih mjeseci trudnoće lijek se smije uzimati samo u onim slučajevima kada nema druge mogućnosti liječenja o čemu će odlučiti Vaš liječnik.

Ne postoje odgovarajući podaci o prelaženju lijeka u majčino mlijeko, stoga se ne preporučuje uzimanje lijeka tijekom dojenja.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatusa, odmah zatražite savjet liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Panatus sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Panatus?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Panatus je namijenjen za liječenje simptoma suhog kašlja u odraslih i djece starije od 6 godina.

Odrasli

Uobičajena doza Panatusa za odrasle iznosi 2 tablete (40 mg) dva do tri puta na dan s razmakom od 8 do 12 sati između svakog uzimanja.

Oštećenje funkcije bubrega i/ili oštećenje funkcije jetre

Ako imate problema s bubrezima ili jetrom, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom jer postoji veća vjerojatnost nastanka nuspojava.

Stariji bolesnici

Ne postoje preporuke za prilagodbu doze u starijih bolesnika. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate oštećenje funkcije bubrega povezane s dobi.

Primjena u djece i adolescenata

Uobičajena doza Panatusa za adolescente starije od 12 godina iznosi 1 tabletu (20 mg) tri puta na dan s razmakom od 8 sati između svakog uzimanja.

Uobičajena doza Panatusa za djecu u dobi od 6 do 12 godina iznosi 1 tabletu (20 mg) dva puta na dan s razmakom od 8 do 12 sati između svakog uzimanja.

Način primjene

Kroz usta. Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme.

Tablete Panatusa progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

Ako uzmete više Panatusa nego što ste trebali

Ako uzmete veću dozu lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Prevelike doze Panatusa mogu prouzrokovati pospanost, povraćanje, neusklađenost pokreta (ataksiju), bolove u trbuhu, proljev, uzbuđenost i pad krvnog tlaka. Specifični antidot ne postoji, a liječenje se provodi simptomatski.

Nemate li mogućnost posjetiti liječnika, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prelaženje lijeka u krv.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih blagih nuspojava:

- urtikarija,
- probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev),
- vrtoglavica, pospanost.

Nisu utvrđene nuspojave na vitalne funkcije i rad drugih organa niti pri dugotrajnom uzimanju Panatusa. Posebna je prednost lijeka što nisu zapažene nuspojave koje su karakteristične za opioidne antitusike.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Panatus?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Panatus se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Panatus sadrži?

- Djelatna tvar je butamiratcitrata.
Svaka filmom obložena tableta sadrži 20 mg butamiratcitrata.
- Drugi sastojci u jezgri tablete su laktoza hidrat, povidon, kinolinska boja (E104), hipromeloza, talk, magnezijev stearat i koloidni bezvodni silicijev dioksid. Drugi sastojci u film ovojnici tablete su hipromeloza, titanijev dioksid, crveni željezov oksid (E172), žuti željezov oksid (E172), talk i propilenglikol. Vidjeti dio 2. „Panatus sadrži laktozu“.

Kako Panatus izgleda i sadržaj pakiranja?

Okrugle, blago bikonveksne, kosih rubova, žuto-smeđe filmom obložene tablete. Promjer tablete: oko 10 mm.

Panatus je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 10 filmom obloženih tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

Proizvođač

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Uputa je zadnji puta odobrena u travnju 2022.