

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Panatus forte 50 mg filmom obložene tablete butamiratcitrat

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Panatus forte i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus forte?
3. Kako uzimati Panatus forte?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panatus forte?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Panatus forte i za što se koristi?

Panatus forte filmom obložene tablete su lijek za simptomatsko liječenje, odnosno ublažavanje nadražajnog suhog kašlja (antitusik sa centralnim djelovanjem) koji nastaje uslijed bilo kojeg uzroka. Lijek je namijenjen za primjenu u adolescenata starijih od 12 godina, odraslih i starijih bolesnika.

Sprječava suh i nadražajni kašalj, smanjuje napetost bronhijalnih mišića, te olakšava disanje i bolove u prsima. Sve to povoljno utječe na poboljšanje kapaciteta disanja i koncentracije plinova u krvi. Kemijski i po farmakološkim učincima Panatus forte se razlikuje od opioidnih antitusika te ne uzrokuje ovisnost.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Panatus forte?

##### Nemojte uzimati Panatus forte

- ako ste alergični na butamiratcitrat ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Panatus forte:

- ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili jetre.
- ako uzimate ekspektoranse (lijekove za olakšavanje iskašljavanja), odnosno ako imate produktivni kašalj.

Potrebno je posavjetovati se s liječnikom ili ljekarnikom ako kašalj potraje dulje od 7 dana.

##### Djeca i adolescenti

Sigurnost i djelotvornost lijeka Panatus forte 50 mg filmom obložene tablete u djece mlađe od 12 godina nisu još dovoljno istraženi, stoga djeci te dobi lijek ne dajemo.

##### Drugi lijekovi i Panatus forte

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Panatus forte nije pokazao nikakve interakcije niti utjecaj na druge lijekove. Potrebno je izbjegavati istodobnu uporabu s ekspektoransima (lijekovi za olakšavanje iskašljavanja kod produktivnog kašlja), jer mogu uzrokovati zadržavanje sluzi u dišnom sustavu i time povećati rizik od otežavanja prohodnosti i infekcije dišnih puteva.

#### **Panatus forte s hranom i pićem**

Tablete Panatusa forte progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela. Tijekom liječenja Panatusom forte nemojte piti alkoholna pića.

#### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Iako ne postoje podaci o negativnim učincima, ne preporuča se uzimanje Panatusa forte tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Tijekom kasnijih mjeseci trudnoće lijek se smije uzimati samo u onim slučajevima kada nema druge mogućnosti liječenja o čemu će odlučiti Vaš liječnik. Ne postoje odgovarajući podaci o prelaženju lijeka u majčino mlijeko, stoga se ne preporuča uzimanje lijeka tijekom dojenja.

Ako zatrudnite tijekom uzimanja Panatusa forte, odmah zatražite savjet liječnika.

#### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije poznato da lijek utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

#### **Panatus forte sadrži laktozu**

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

### **3. Kako uzimati Panatus forte?**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Panatus forte je namijenjen za liječenje simptoma suhog kašlja u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina.

#### **Odrasli**

Uobičajena doza Panatusa forte za odrasle (i starije osobe) iznosi 1 tabletu (50 mg) dva do tri puta na dan s razmakom od 8 do 12 sati između svakog uzimanja.

#### *Oštećenje funkcije bubrega i/ili oštećenje funkcije jetre*

Ako imate problema s bubrezima ili jetrom, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom jer postoji veća vjerojatnost nastanka nuspojava.

#### *Stariji bolesnici*

Ne postoje preporuke za prilagodbu doze u starijih bolesnika. Razgovarajte sa svojim liječnikom ako imate oštećenje funkcije bubrega povezane s dobi.

#### **Primjena u djece i adolescenata**

Uobičajena doza Panatusa forte za adolescente starije od 12 godina iznosi 1 tabletu (50 mg) jednom do dva puta na dan s razmakom od 8 do 12 sati između svakog uzimanja.

#### Način primjene

Kroz usta. Lijek uzimajte (ili dajte djetetu) svaki dan u približno isto vrijeme. Tablete Panatusa forte progutajte cijele s tekućinom prije jela ili poslije jela.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu.

### **Ako uzmete više Panatusa forte nego što ste trebali**

Ako ste uzeli veću dozu lijeka nego što biste smjeli, odmah se posavjetujte s liječnikom ili ljekarnikom.

Prevelike doze Panatusa forte mogu prouzrokovati pospanost, povraćanje, neusklađenost pokreta (ataksiju), bolove u trbuhu, proljev, uzbuđenost i pad krvnog tlaka. Specifični antidot ne postoji, a liječenje se provodi simptomatski.

Nemate li mogućnost posjetiti liječnika, pokušajte izazvati povraćanje kako biste spriječili prelaženje lijeka u krv.

### **Ako ste zaboravili uzeti Panatus forte**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako ste zaboravili uzeti Panatus forte pa se sjetite u roku od nekoliko sati, uzmite lijek odmah, a sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme. No, ako se već bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze, izostavite zaboravljenu dozu i jednostavno uzmite sljedeću pojedinačnu dozu u predviđeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih blagih nuspojava:

- urtikarija,
- probavne smetnje (mučnina, povraćanje, proljev),
- vrtoglavica, pospanost.

Nisu utvrđene nuspojave na vitalne funkcije i rad drugih organa niti pri dugotrajnom uzimanju Panatusa forte.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u Dodatku V**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. Kako čuvati Panatus forte?**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Panatus forte se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**

**Što Panatus forte sadrži?**

- Djelatna tvar je butamiracitrat.  
Svaka filmom obložena tableta sadrži 50 mg butamiracitrata.
- Pomoćne tvari u jezgri tablete su laktoza hidrat, povidon, hipromeloza, talk, magnezijev stearat i koloidni bezvodni silicijev dioksid. Pomoćne tvari u film ovojnici tablete su hipromeloza, titanijev dioksid, crveni željezov oksid (E172), talk i propilenglikol. Vidjeti dio 2. „Panatus forte sadrži laktozu“.

**Kako Panatus forte izgleda i sadržaj pakiranja?**

Okrugle, blago bikonveksne, kosih rubova, crveno-smeđe filmom obložene tablete. Promjer tablete: oko 10 mm.

Panatus forte je dostupan u blisterima, a svaka kutija sadrži ukupno 10 filmom obloženih tableta.

**Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač****Nositelj odobrenja**

KRKA - FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb

**Proizvođač**

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Uputa je zadnji puta odobrena u veljači 2020.**