Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Panmigris 250 mg/250 mg/65 mg filmom obložene tablete

acetilsalicilatna kiselina/paracetamol/ kofein

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se simptomi ne poprave nakon 3 dana kod migrene i nakon 4 dana kod glavobolje.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Panmigris i za što se koristi
2. Što trebate znati prije nego uzmete Panmigris
3. Kako uzimati Panmigris
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Panmigris
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Panmigris i za što se koristi

Svaka tableta lijeka Panmigris sadrži tri djelatne tvari: acetilsalicilatnu kiselinu, paracetamol i kofein.
- Acetilsalicilatna kiselina i paracetamol smanjuju bol i temperaturu, a acetilsalicilatna kiselina također smanjuje upalu.
- Kofein pojačava učinak acetilsalicilatne kiseline i paracetamola.

Panmigris se upotrebljava za akutno liječenje glavobolje i napada migrene (simptomi kao što su glavobolja, mučnina, osjetljivost na svjetlo i zvuk te funkcionalna onesposobljenost).

2. Što trebate znati prije nego uzmete Panmigris

Nemojte uzimati Panmigris ako:
- **ste alergični** (preosjetljivi) **na acetilsalicilatnu kiselinu, paracetamol, kofein** ili bilo koji **drugi sastojak lijeka Panmigris** (naveden u dijelu 6).
- **ste ikada imali alergijsku reakciju na** druge **lijekove koji se koriste za liječenje boli, upale ili vrućice,** kao što su acetilsalicilatna kiselina i salicilati, ili bilo koji drugi protuupalni lijekovi poznati kao nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL) kao što su diklofenak ili ibuprofen. Reakcije mogu uključivati astmu, zviždanje ili otežano disanje; osip na koži ili koprivnjaču; oticanje lica ili jezika; curenje iz nosa. Ako niste sigurni, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.
- imate **čir na želucu ili crijevima**, ili ako imate **povijest peptičkog ulkusa**.
- ste primijetili **krv u stolici ili crnu stolicu** (simptomi krvarenja iz probavnog sustava ili perforacije).
- imate **hemofiliju ili patite od drugih poremećaja krvi.**
- imate **ozbiljne probleme sa srcem, jetrom i bubrezima**
- uzimate **više od 15 mg metotreksata tjedno** *(vidi dio Ostali lijekovi i Panmigris)*
- ste u **posljednja 3 mjeseca trudnoće** *(vidi dio Trudnoća, dojenje i plodnost)*

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

Upozorenja i mjere opreza:

Panmigris sadrži paracetamol. Nemojte uzimati više od preporučene doze jer to može ozbiljno oštetiti Vašu jetru.
Acetilsalicilatna kiselina može uzrokovati krvarenje. Morate obavijestiti liječnika ako primijetite bilo kakvo neuobičajeno krvarenje.
Nemojte koristiti Panmigris ako imate problema povezanih s alkoholom ili oštećenje jetre i nemojte koristite Panmigris zajedno s alkoholom.

Sljedeći su razlozi zašto Panmigris možda nije prikladan za Vas. Razgovarajte sa svojim liječnikom **prije** nego što uzmete ovaj lijek ako:

- nije prethodno dijagnosticirana migrena, jer potencijalno ozbiljna stanja vezana uz mozak ili živce trebaju biti isključena prije liječenja.
- imate **migrenu** koja je toliko **jaka** da **zahtijeva mirovanje** u krevetu, ili glavobolju koja se razlikuje od Vaših uobičajenih migrena**, ili ako imate povraćanje uz migrenu**.
- ako imate **glavobolje nakon ili uzrokovane ozljedom glave, napora, kašljanja ili saginjanja.**
- imate **kronične glavobolje** (15 dana ili više mjesečno tijekom više od 3 mjeseca), ili ako doživite svoju prvu glavobolju nakon 50. godine života.
- imate **problema s jetrom ili bubrezima, pothranjeni ste ili redovito konzumirate alkohol.** Možda ćete trebati potpuno izbjegavati upotrebu ovog lijeka ili ograničiti količinu paracetamola koju uzimate.
- patite od **nasljednog stanja zvanog nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze** koje utječe na crvene krvne stanice i može uzrokovati anemiju, žuticu ili povećanje slezene kada su izloženi određenoj hrani, lijekovima kao što su određeni protuupalni lijekovi (npr., acetilsalicilatna kiselina), ili drugim bolestima.
- ako ste ikada **imali gastrointestinalne** probleme kao što su čir na želucu, krvarenje ili crna stolica. Ako ste imali nelagodu u želucu ili žgaravicu nakon uzimanja lijekova protiv bolova ili protuupalnih lijekova u prošlosti.
- patite od **poremećaja krvarenja ili abnormalnog vaginalnog krvarenja** osim Vašeg menstrualnog ciklusa (npr., neuobičajeno obilna i dugotrajna menstruacija).
- nedavno ste bili podvrgnuti **kirurškom zahvatu** (uključujući manje zahvate poput dentalne kirurgije) ili ćete biti podvrgnuti jednom unutar sljedećih 7 dana.
- imate **bronhijalnu astmu, peludnu groznicu, nosne polipe, kroničnu respiratornu bolest ili razvijete alergijske simptome** (npr., kožnu reakciju, svrbež, urtikariju).
- imat**e giht, dijabetes, hipertireozu, aritmiju, nekontroliranu hipertenziju, oštećenje funkcije bubrega ili jetre**.
- imate **problema s alkoholom** *(vidi dio Uzimanje Panmigrisa s hranom i pićem).*
- već **uzimate druge lijekove koji sadrže acetilsalicilatnu kiselinu ili paracetamol,** ili druge lijekove, jer neki mogu ometati Panmigris i uzrokovati nuspojave (*vidi dio Drugi lijekovi i Panmigris*).
- ste u **opasnosti od dehidracije** (npr. zbog povraćanja, proljeva ili prije ili nakon velike operacije).
- imate **manje od 18 godina.** Postoji moguća povezanost između acetilsalicilatne kiseline i Reyeovog sindroma kada se daje djeci i adolescentima. Reyeov sindrom je rijetka bolest koja pogađa mozak i jetru, i može biti smrtonosna. Iz tog razloga, Panmigris se ne smije davati djeci ili adolescentima mlađima od 18 godina, osim ako to nije izričito odredio Vaš liječnik.

Tijekom liječenja s lijekom Panmigris, odmah obavijestite svog liječnika ako:

- imate **teške bolesti, uključujući teško oštećenje bubrega ili sepsu (kada bakterije i njihovi toksini cirkuliraju u krvi uzrokujući oštećenje organa), ili patite od pothranjenosti, kroničnog alkoholizma ili ako također uzimate flukloksacilin (antibiotik)**. Ozbiljno stanje zvano metabolička acidoza (poremećaj krvi i tekućina) zabilježeno je kod bolesnika u ovim situacijama kada se paracetamol upotrebljava u redovitim dozama kroz dulje razdoblje ili kada se paracetamol uzima zajedno s flukloksacilinom. Simptomi metaboličke acidoze mogu uključivati: ozbiljne poteškoće s disanjem koje uključuju duboko ubrzano disanje, omamljenost, mučninu i povraćanje.

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

Druge mjere opreza

Kao i kod bilo koje vrste analgetika za glavobolje, prečesto uzimanje Panmigrisa (što znači više od 10 dana mjesečno za ovaj lijek) uz istovremene kronične glavobolje (15 dana ili više mjesečno), dulje od 3 mjeseca, moglo bi pogoršati Vašu glavobolju ili migrenu. Ako mislite da bi to mogao biti slučaj, obratite se svom liječniku za savjet. Možda ćete trebati prestati uzimati Panimgris kako biste riješili problem.

Panmigris može umanjiti simptome infekcije (npr. glavobolju, povišenu temperaturu) i stoga može otežati njihovo prepoznavanje. Ako se osjećate loše i trebate posjetiti liječnika, ne zaboravite mu reći da uzimate Panimgris

Panmigris može utjecati na rezultate laboratorijskih pretraga. Ako je zatraženo da obavite krvne, urinske ili druge laboratorijske pretrage, sjetite se reći da uzimate Panmigris.

Drugi lijekovi i Panmigris

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta.

Posebno obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo što od sljedećeg:
- **bilo koji drugi lijek koji sadrži paracetamol, acetilsalicilatnu kiselinu ili bilo koji drugi lijek protiv bolova/snižavanje temperature.**
- **lijekovi koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja** krvi ("razrjeđivači krvi") kao što su oralni antikoagulansi (npr. varfarin), heparin, trombolitici (npr. streptokinaza) ili drugi antitrombocitni lijekovi (tiklopidin, klopidogrel, cilostazol).
- **kortikosteroidi** (koriste se za ublažavanje upale).
- **barbiturati i benzodiazepini** (za liječenje anksioznosti i nesanice).
- **litij, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili fluvoksamin** (za liječenje depresije).
- **sulfonilurea i inzulin** (za liječenje dijabetesa).
- **metotreksat** (za liječenje nekih vrsta raka, artritisa ili psorijaze).
- **neke lijekovi koji se koriste za liječenje infekcija** (npr., rifampicin, izoniazid, kloramfenikol, ciprofloksacin ili pipemidinska kiselina).
- **levotiroksin** (za liječenje hipotireoze).
- **metoklopramid (**za liječenje mučnine i povraćanja).
- **lijekove za epilepsiju**.
- **lijekove za visoki krvni tlak i zatajenje srca**.
- **diuretike** (za povećanje proizvodnje urina i smanjenje viška tekućine).
- **lijekove za liječenje gihta**.
- **oralne kontraceptive.**
- **zidovudin** (za liječenje HIV-a).
- **lijekove za liječenje usporenog pražnjenja želuca** kao što je propantelin.
- **klozapin** (za liječenje shizofrenije).
- **simpatomimetike** (za povećanje niskog krvnog tlaka ili za liječenje nazalne kongestije).
- **antialergici** (za sprječavanje ili ublažavanje alergija).
- **teofilin** (za liječenje astme).
- **terbinafin** (za liječenje gljivičnih infekcija).
- **cimetidin** (za liječenje žgaravice i peptičkih ulkusa).
- **disulfiram** (za liječenje ovisnosti o alkoholu).
- **nikotin (**koristi se za prestanak pušenja)
- **kolestiramin** (za liječenje visokih razina kolesterola)
- **flukloksacilin** (antibiotik), zbog ozbiljnog rizika od poremećaja krvi i tekućina (zvanog metabolička acidoza) koji zahtijeva hitno liječenje (vidi dio 2).
- **alkohol**
- **acetazolamid** (inhibitor karboanhidraze, koristi se za liječenje glaukoma, napadaja ili za povećanje proizvodnje urina).

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

Panmigris s hranom, pićem i alkoholom

- **Alkohol:**
  Nemojte piti alkohol dok uzimate Panmigris. Paracetamol i acetilsalicilatna kiselina mogu uzrokovati oštećenje jetre i krvarenje u želucu.
- **Kofein:**
  Preporučena doza ovog lijeka sadrži otprilike onoliko kofeina koliko i šalica kave. Ograničite unos lijekova, hrane ili pića koji sadrže kofein dok uzimate ovaj lijek jer previše kofeina može uzrokovati nervozu, razdražljivost, nesanicu i povremeno ubrzan rad srca.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ovaj lijek se ne preporučuje tijekom trudnoće. Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, **obavijestite svog liječnika i nemojte uzimati Panmigiris.**

Trudnoća - posljednje tromjesečje

Nemojte uzimati ovaj lijek zbog sadržaja acetilsalicilatne kiseline ako ste u posljednja 3 mjeseca trudnoće jer može naštetiti Vašem nerođenom djetetu ili uzrokovati probleme pri porodu. Može uzrokovati probleme s bubrezima i srcem kod Vašeg nerođenog djeteta. Može utjecati na Vašu i bebinu sklonost krvarenju te uzrokovati da porod bude kasniji ili duži nego što se očekuje.

Trudnoća – prvo i drugo tromjesečje

Ne biste trebali uzimati ovaj lijek zbog sadržaja acetilsalicilatne kiseline i kofeina tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće, osim ako nije apsolutno nužno i ako Vam to ne savjetuje Vaš liječnik. Ako trebate liječenje tijekom ovog razdoblja ili dok pokušavate zatrudnjeti, treba upotrijebiti najnižu dozu u najkraćem mogućem vremenu. Ako se uzima dulje od nekoliko dana od 20. tjedna trudnoće nadalje, acetilsalicilatna kiselina može uzrokovati probleme s bubrezima kod Vašeg nerođenog djeteta, što može dovesti do niske razine plodne vode koja okružuje dijete (oligohidramnion) ili suženja krvne žile (*ductus arteriosus*) u srcu djeteta. Ako trebate liječenje dulje od nekoliko dana, Vaš liječnik može preporučiti dodatno praćenje.

Dojenje

Nemojte uzimati Panmigris ako dojite jer može biti štetno za Vaše dojenče.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka, zatražite savjet od svog liječnika ili ljekarnika.

Plodnost

Panmigris pripada skupini lijekova (NSAIL) koji mogu smanjiti plodnost kod žena. Ovaj učinak je reverzibilan nakon prestanka uzimanja lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije poznato da uzimanje lijeka Panmigris utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.
Ako primijetite nuspojave poput vrtoglavice ili pospanosti, ne smijete voziti ili koristiti strojeve. Obavijestite svog liječnika što je prije moguće.

Panmigris sadrži benzoatnu kiselinu

Panmigris sadrži 0,03 mg benzoatne kiseline (E 210) po tableti. Benzoatna kiselina može pojačati žuticu (žutilo kože i očiju) unovorođenčadi (do 4 tjedna starosti).

3. Kako uzeti Panmigris

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik

ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli (18 godina i stariji):

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

- **Za liječenje glavobolje:**

  Uzmite 1 tabletu s punom čašom vode kada se pojavi bol od glavobolje. Ako je potrebno, možete uzeti još 1 tabletu 4 do 6 sati kasnije.

  U slučaju jače boli, uzmite 2 tablete s punom čašom vode kada se pojavi bol u glavi. Ako je potrebno, možete uzeti još 2 tablete 4 do 6 sati kasnije.

  Tablete Panmigrisa obložene su filmom koji postaje sklizak u kontaktu sa slinom, što olakšava gutanje tablete.

  Nemojte koristiti Panmigris za glavobolju dulje od 4 dana bez savjetovanja s vašim liječnikom.

- **Za liječenje migrene:**

  Uzmite 2 tablete s punom čašom vode kada se pojave simptomi migrene. Ako je potrebno, možete uzeti dodatne 2 tablete, s razmakom od 4 do 6 sati između doza.

  Ako **ne** osjetite olakšanje od migrene unutar 2 sata nakon prve doze od 2 tablete Panmigrisa, trebate potražiti savjet liječnika.

  Nemojte uzimati Panmigris za migrenu dulje od 3 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Za liječenje glavobolje i migrene, nemojte uzeti više od 6 tableta u razdoblju od 24 sata. To odgovara dozi od 1500 mg acetilsalicilatne kiseline, 1500 mg paracetamola i 390 mg kofeina.

Nemojte uzeti više od propisane doze. Uzmite najmanju dozu koja Vam je potrebna za liječenje simptoma i koristite ovaj lijek najkraće moguće vrijeme.

Djeca i adolescenti:

Panmigris se ne smije davati djeci i adolescentima mlađima od 18 godina (vidi *Upozorenja i mjere opreza).*

Starije osobe:

Nema posebnih preporuka za doziranje. Ako imate nisku tjelesnu težinu, trebate potražiti savjet liječnika ili ljekarnika.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre

Obavijeste svog liječnika ako imate problema s bubrezima ili jetrom. Vaš će liječnik možda trebati prilagoditi interval doziranja ili trajanje liječenja. Nemojte uzimati Panmigris ako patite od teških problema s jetrom ili bubrezima.

Ako uzmete više Panmigrisa nego što biste trebali

Ove tablete sadrže acetilsalicilatnu kiselinu, paracetamol i kofein. Nemojte uzimati više od preporučene doze i nemojte uzimati druge lijekove koji mogu sadržavati ove sastojke ili bilo koje druge lijekove koji se koriste za liječenje boli, upale ili povišene tjelesne temperature (nesteroidni protuupalni lijekovi) dok uzimate Panmigris.

Odmah kontaktirajte svog liječnika, ljekarnika ili otiđite u najbližu bolnicu čim posumnjate da ste uzeli preveliku dozi. Hitna medicinska pomoć je ključna zbog potencijalnog rizika od nepovratnog oštećenja jetre uzrokovanog paracetamolom. Nemojte čekati da se pojave simptomi jer predoziranje možda u početku neće imati nikakve primjetne simptome.

Ako se pojave simptomi predoziranja, mogli bi biti:

- Za **acetilsalicilatnu kiselinu**: vrtoglavica, zujanje u ušima, gluhoća, znojenje, hiperventilacija, vrućica, mučnina, povraćanje, glavobolja, zbunjenost ili nemir, cirkulatorni kolaps ili respiratorni zastoj.
- Za **paracetamol:** prvi simptomi koji se mogu pojaviti su mučnina, povraćanje, gubitak apetita, bljedilo, pospanost, znojenje, a kasnije i bol u trbuhu.

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

- Za **kofein:** anksioznost, nervoza, nemir, nesanica, uzbuđenje, trzanje mišića, zbunjenost, konvulzije, hiperglikemija, tahikardija ili srčana aritmija.

Čak iako se ovi simptomi ne pojave ili nestanu, bitno je odmah potražiti medicinsku pomoć.

Ako zaboravite uzeti Panmigris

Uzmite dozu čim se sjetite, ali nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nemojte uzeti više od 6 tableta u razdoblju od 24 sata.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite uzimati Panmigris i odmah obavijestite svog liječnika ako razvijete bilo koju od ovih ozbiljnih nuspojava:
- alergijska reakcija s oticanjem lica, usana, usta, jezika ili grla.
  To može uzrokovati poteškoće pri gutanju, piskanje, poteškoće s disanjem i osjećaj stezanja u prsima (znakovi astme). Također možete imati osip ili svrbež i doživjeti nesvjesticu.
- crvenilo kože, stvaranje mjehura na usnama, očima ili ustima, ljuštenje kože ili čir u ustima.
- krvarenje u želucu ili crijevima, čir u želucu ili crijevima, što može biti praćeno jakom boli u želucu, krvavom ili crnom stolicom, ili povraćanjem krvi. Kao i kod svih lijekova za ublažavanje boli i snižavanje povišene tjelesne temperature, ovo se može dogoditi u bilo kojem trenutku tijekom liječenja, bez prethodne povijesti, i može biti smrtonosno. Ova nuspojava je osobito ozbiljna kod starijih osoba.
- žutilo kože ili očiju (znakovi zatajenja jetre).
- osjećaj vrtoglavice ili nesvjestice (znakovi niskog krvnog tlaka).
- nepravilan srčani ritam.
- ako ste imali problema s disanjem uzrokovanih acetilsalicilatnom kiselinom ili nesteroidnim protuupalnim lijekovima te doživite sličnu reakciju s ovim lijekom.
- neobjašnjive modrice ili krvarenje.
- povećanje broja krvarenja iz nosa ili modrica
- oteklina ili zadržavanje vode
- zvonjenje u ušima ili privremeni gubitak sluha
- promjene u ponašanju, mučnina i povraćanje (to bi mogao biti znak Reyeovog sindroma)
- osjećate bol u prsima, što može biti znak potencijalno ozbiljne alergijske reakcije zvane Kounisov sindrom.

Sljedeće nuspojave prijavljene su u 16 kliničkih ispitivanja provedenih s Panmigrisom na više od 4800 liječenih ispitanika. Obavijestite svog liječnika ako primijetite bilo koju od ovih drugih nuspojava:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)):
- nervoza, vrtoglavica
- mučnina, nelagoda u trbuhu

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
- nesanica, drhtanje, utrnulost, glavobolja
- suha usta, proljev, povraćanje
- umor, osjećaj nervoze
- povećana brzina otkucaja srca

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1.000 osoba):
- grlobolja, poteškoće pri gutanju, utrnulost ili trnci oko usta, prekomjerno lučenje sline
- smanjen apetit, promijenjen okus
- anksioznost, euforično raspoloženje, napetost
- poremećaj pažnje, gubitak pamćenja, promijenjena koordinacija

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

- osjećaj boli u obrazima i čelu
- bol u oku, poremećaj vida
- valunzi, problemi s perifernim krvnim žilama (npr., u rukama ili nogama)
- krvarenje iz nosa, usporeno i plitko disanje, curenje iz nosa
- podrigivanje, nadutost
- pretjerano znojenje, svrbež, svrbežni osip, povećana osjetljivost kože
- ukočenost u mišićima, kostima ili zglobovima; bol u vratu, bol u leđima, grčevi u mišićima
- slabost, nelagoda u prsima

Nuspojave navedene u nastavku također su prijavljene od kada je Panmigris na tržištu. Općenito, učestalost u postmarketinškom praćenju ne može se precizno odrediti, stoga je označena kao "nepoznata":
- nemir, općenito osjećaj lošeg stanja ili nenormalnosti
- pospanost, migrena
- crvenilo kože, osip, prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija
- palpitacije, otežano disanje, iznenadna poteškoća s disanjem i osjećaj stezanja u prsima uz piskanje ili kašalj (astma)
- bolovi u trbuhu, nelagoda u želucu nakon obroka
- povišeni jetreni enzimi
- oteklina i iritacija unutar nosa
- problem s bubrezima
- ozbiljno stanje koje može učiniti krv kiselijom (nazvano metabolička acidoza), kod bolesnika s teškom bolešću koji su koristili paracetamol (vidi dio 2)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Panmigris

Kako čuvati Panmigris
- Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
- Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
- Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.
- Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Panmigris sadrži
- Djelatne tvari su acetilsalicilatna kiselina, paracetamol i kofein.
  Svaka filmom obložena tableta sadrži 250 mg acetilsalicilatne kiseline, 250 mg paracetamola i 65 mg kofeina.

- **Drugi sastojci su**:
  *Jezgra tablet*e: djelomično supstituirana hidroksipropilceluloza, mikrokristalična celuloza (E460), stearatna kiselina.
  Film-ovojnica: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), propilenglikol (E1520), benzoatna kiselina (E210), karnauba vosak (E903).

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO

Kako Panmigris izgleda i sadržaj pakiranja

Panmigris su bijele, duguljaste filmom obložene tablete (širine 7,2 mm i duljine 17,5 mm) s utisnutim slovom "E" na jednoj strani.

Tablete su dostupne u blisterima koji se sastoje od prozirne PVC/PCTFE/PVC termoform folije, s podložnom dvoslojnom folijom od aluminij/polietilen tereftalata(PET) sigurnom za djecu, koji su pakirani u kutije sa 10 ili 20 filmom obloženih tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Haleon Hungary Kft., Csörsz u. 43, 1124 Budimpešta, Mađarska

Proizvođač

Haleon Germany GmbH, Barthstraße 4, 80339 München, Njemačka

Famar Italia S.p.A., Via Zambeletti 25, 20021 Baranzate, Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres Farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61 10 000 Zagreb

Tel.: 01 23 96 900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Bugarska: Панмигран (*Panmigran*)
Danska: Panodil Tribus
Njemačka: Excedrin Kopfschmerz & Migräne 250 mg/ 250 mg / 65 mg Filmtabletten
Island: Panodil Tribus
Irska: Panmigrol 250 mg/ 250 mg / 65 mg film-coated tablets
Norveška: Paracetamol/Acetylsalisylsyre/Kofein Haleon
Slovenija: Panmigris
Švedska: Alvedon Tribus

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u listopadu 2026.

HALMED
13 - 10 - 2026
ODOBRENO