

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Pazopanib Pharmascience 200 mg filmom obložene tablete Pazopanib Pharmascience 400 mg filmom obložene tablete pazopanib

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Pazopanib Pharmascience i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pazopanib Pharmascience
3. Kako uzimati Pazopanib Pharmascience
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Pazopanib Pharmascience
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pazopanib Pharmascience i za što se koristi

Pazopanib Pharmascience spada u grupu lijekova koje nazivamo *inhibitorima protein kinaze*. Djeluje tako da sprečava aktivnost proteina koji su uključeni u rast i širenje stanica raka.

Pazopanib Pharmascience se u odraslih koristi za liječenje:

- karcinoma bubrega koji je uznapredovao ili se proširio na druge organe.
- određenih oblika sarkoma mekih tkiva, vrste raka koja zahvaća potporna tkiva u tijelu. Može se pojaviti u mišićima, krvnim žilama, masnom tkivu ili drugim tkivima koja potpomažu, okružuju i štite organe.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Pazopanib Pharmascience

Nemojte uzimati Pazopanib Pharmascience

- **ako ste alergični** na pazopanib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- Ako smatrate da se to odnosi na Vas, **provjerite sa svojim liječnikom**.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Pazopanib Pharmascience:

- ako imate **bolest srca**.
- ako imate **bolest jetre**.
- ako ste doživjeli **zatajenje srca ili srčani udar**.
- ako ste doživjeli **kolaps pluća**.
- ako ste imali probleme s **krvarenjem, krvnim ugrušcima i suženjem arterija**.
- ako ste imali **tegobe sa želucom ili crijevima** poput *proboja* (rupe) ili *fistule* (abnormalni prolazi koji se stvaraju između dijelova crijeva).
- ako imate probleme sa **štitnjačom**.
- ako imate probleme s **funkcijom bubrega**.
- ako imate ili ste imali **aneurizmu** (proširenje i slabljenje stijenke krvne žile) ili rascjep stijenke krvne žile.

Recite svom liječniku ako se bilo što od ovoga odnosi na Vas. Vaš će liječnik odlučiti je li Pazopanib Pharmascience prikladan za Vas. Možda ćete trebati **dodatne pretrage** kako bi se provjerilo rade li Vaši bubrezi, srce i jetra kako treba.

Visok krvni tlak i Pazopanib Pharmascience

Pazopanib Pharmascience može povisiti Vaš krvni tlak. Vaš krvni tlak kontrolirat će se prije nego počnete uzimati Pazopanib Pharmascience i tijekom uzimanja ovog lijeka. Ako imate visok krvni tlak, dobit ćete lijekove za njegovo snižavanje.

- **Recite svom liječniku** ako imate visok krvni tlak.

Ako planirate ići na operaciju

Liječnik će Vam prestati davati Pazopanib Pharmascience najmanje 7 dana prije operacije jer može utjecati na zacjeljivanje rane. Nastavit ćete s terapijom nakon što rana dovoljno zacijeli.

Stanja o kojima trebate voditi računa

Pazopanib Pharmascience može pogoršati neka stanja ili izazvati ozbiljne nuspojave. Za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience morate pripaziti na određene simptome kako biste smanjili rizik bilo kakvog problema. Pogledajte **dio 4**.

Djeca i adolescenti

Pazopanib Pharmascience se ne preporučuje mladima od 18 godina. Još nije poznato koliko dobro djeluje u ovoj dobnoj skupini. Nadalje, ne bi se smio koristiti u djece mlađe od 2 godine zbog sigurnosnih razloga.

Drugi lijekovi i Pazopanib Pharmascience

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i biljne lijekove te druge lijekove koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu utjecati na to kako Pazopanib Pharmascience djeluje ili mogu povećati mogućnost pojave nuspojava. Pazopanib Pharmascience također može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova. To uključuje:

- klaritromicin, ketokonazol, itrakonazol, rifamicin, telitromicin, vorikonazol (koriste se za **liječenje infekcija**).
- atazanavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir (koriste se za **liječenje HIV-a**).
- nefazodon (koristi se za **liječenje depresije**).
- simvastatin i moguće drugi statini (koriste se za **liječenje visoke razine kolesterola**).
- lijekove koji **smanjuju kiselinu u želucu**. Vrsta lijeka koji uzimate kako biste smanjili želučanu kiselinu (npr. inhibitori protonske pumpe, H₂ antagonisti ili antacidi) može utjecati na uzimanje lijeka Pazopanib Pharmascience. Savjetujte se sa svojim liječnikom ili medicinskom sestrom.

Ako uzimate bilo koji od ovih lijekova, **recite to svom liječniku ili ljekarniku**.

Pazopanib Pharmascience s hranom i pićem

Nemojte uzimati Pazopanib Pharmascience s hranom jer utječe na način apsorpcije lijeka. Uzmite ga najmanje dva sata nakon obroka ili jedan sat prije obroka (pogledajte dio 3).

Za vrijeme terapije lijekom Pazopanib Pharmascience **nemojte piti sok od grejpa** jer može povećati mogućnost pojave nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Pazopanib Pharmascience se ne preporučuje u trudnoći. Nije poznat utjecaj lijeka Pazopanib Pharmascience tijekom trudnoće.

- **Recite svom liječniku ako ste trudni** ili planirate imati dijete.
- Da biste spriječili trudnoću za vrijeme i 2 tjedna nakon uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience, **upotrebjavajte sigurne metode kontracepcije**.
- Recite svom liječniku **ako zatrudnite tijekom terapije** lijekom Pazopanib Pharmascience.

Nemojte doći za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience. Nije poznato prelaze li sastojci lijeka Pazopanib Pharmascience u mlijeko. O ovome razgovarajte sa svojim liječnikom.

Muški bolesnici (uključujući one koji su imali vazektomiju) čije su partnerice ili trudne ili mogu zatrudnjeti (uključujući one koji koriste druge metode kontracepcije) trebaju koristiti prezervative tijekom spolnog odnosa dok uzimaju Pazopanib Pharmascience i najmanje 2 tjedna nakon posljednje doze.

Liječenje lijekom Pazopanib Pharmascience **može utjecati na plodnost.** Razgovarajte sa svojim liječnikom o ovome.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati nuspojave koje mogu utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

- Izbjegavajte upravljanje vozilima i strojevima ako osjećate omaglicu, ako ste umorni ili slabi i ako Vam je razina energije niska.

Pazopanib Pharmascience sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po filmom obloženoj tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Pazopanib Pharmascience

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Koliko lijeka uzeti

Pazopanib Pharmascience 200 mg filmom obložene tablete

Uobičajena doza je četiri Pazopanib Pharmascience 200 mg tablete (800 mg pazopaniba) uzete jednom dnevno. To je maksimalna dnevna doza. Ako osjetite nuspojave, liječnik će Vam možda morati smanjiti dozu.

Pazopanib Pharmascience 400 mg filmom obložene tablete

Uobičajena doza je dvije Pazopanib Pharmascience 400 mg tablete (800 mg pazopaniba) uzete jednom dnevno. To je maksimalna dnevna doza. Ako osjetite nuspojave, liječnik će Vam možda morati smanjiti dozu.

Kada uzimati lijek

Nemojte uzimati Pazopanib Pharmascience s hranom. Uzmite ga najmanje dva sata nakon obroka ili jedan sat prije obroka. Na primjer, možete ga uzeti dva sata nakon doručka ili jedan sat prije ručka. Uzimajte Pazopanib Pharmascience svaki dan u približno isto vrijeme.

Tablete progutajte cijele, s vodom, jednu po jednu. Nemojte lomiti ili mrviti tablete jer to utječe na način apsorpcije lijeka te može povećati mogućnost pojave nuspojava.

Ako uzmete više lijeka Pazopanib Pharmascience nego što ste trebali

Ako uzmete previše tableta, **obratite se liječniku ili ljekarniku.** Ako ste u mogućnosti, pokažite im pakiranje ili ovu uputu.

Ako ste zaboravili uzeti Pazopanib Pharmascience

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako bi nadoknadili zaboravljenu dozu. Samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Nemojte prekidati uzimanje lijeka Pazopanib Pharmascience bez savjeta

Uzimajte Pazopanib Pharmascience toliko dugo dok Vam ga liječnik preporučuje. Nemojte ga prestati

uzimati ako Vam liječnik nije tako preporučio.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Moguće ozbiljne nuspojave

Oticanje mozga (sindrom reverzibilne posteriorne leukoencefalopatije)

Pazopanib Pharmascience u rijetkim slučajevima može uzrokovati oticanje mozga, koje može biti opasno po život. Simptomi uključuju:

- gubitak sposobnosti govora
- promjene vida
- napadaje
- smetenost
- visok krvni tlak.

Prestanite uzimati Pazopanib Pharmascience i odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma ili glavobolje praćene nekim od tih simptoma.

Hipertenzivna kriza (iznenadno i jako povećanje krvnog tlaka)

Pazopanib Pharmascience ponekad može uzrokovati iznenadno i jako povećanje krvnog tlaka. To se zove hipertenzivna kriza. Vaš liječnik će pratiti Vaš krvni tlak za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience. Znakovi i simptomi hipertenzivne krize mogu uključivati:

- jaku bol u prsnom košu
- jaku glavobolju
- zamagljen vid
- smetenost
- mučninu
- povraćanje
- tešku tjeskobu
- nedostatak zraka
- napadaje
- nesvjesticu.

Prestanite uzimati Pazopanib Pharmascience i odmah potražite liječničku pomoć u slučaju razvoja hipertenzivne krize.

Srčane bolesti

Rizik od ovih nuspojava može biti veći u ljudi koji već imaju probleme sa srcem ili koji uzimaju druge lijekove. Za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience pratit će se pojave mogućih srčanih tegoba.

Disfunkcija srca/zatajenje srca, srčani udar

Pazopanib Pharmascience može utjecati na to koliko dobro Vaše srce pumpa ili može povećati vjerojatnost srčanog udara. Znakovi i simptomi uključuju:

- nepravilne ili brze otkucaje srca
- brzo lepršanje srčanih pretklijetki
- nesvjesticu
- bol ili pritisak u prsnom košu
- bol u rukama, leđima, vratu ili čeljusti
- nedostatak zraka
- oticanje nogu.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Promjene srčanog ritma (produljenje QT intervala)

Pazopanib Pharmascience može utjecati na srčani ritam, što se kod nekih ljudi može razviti u potencijalno ozbiljno stanje srca poznato kao *torsade de pointes*. Posljedica toga je vrlo brz srčani

ritam koji može uzrokovati iznenadan gubitak svijesti.

Recite svom liječniku ako primijetite bilo koje **neuobičajene promjene u otkucajima srca**, poput prebrzih ili presporih otkucaja srca.

Moždani udar

Pazopanib Pharmascience može povećati vjerojatnost moždanog udara. Znakovi i simptomi mogu uključivati:

- utrnulost ili slabost jedne strane tijela
- otežan govor
- glavobolju
- omaglicu.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Krvarenje

Pazopanib Pharmascience može, iako je to manje česta nuspojava, uzrokovati teško krvarenje u probavnom sustavu (poput želuca, jednjaka, rektuma ili crijeva) ili u plućima, bubrežima, ustima, rodnici i mozgu.

Simptomi uključuju:

- krvave stolice ili crne stolice
- krv u mokraći
- bol u želucu
- iskašljavanje ili povraćanje krvi.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Proboj i fistula

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati razdor (proboj) u Vašem želucu ili crijevnom zidu ili razvoj neuobičajenih spojeva između dva dijela Vašeg probavnog trakta (fistula). Znakovi i simptomi mogu uključivati:

- jaku bol u želucu
- mučninu i/ili povraćanje
- vrućicu
- razvoj rupe (proboja) u želucu, crijevima ili zdjelici iz koje se oslobađa krvavi ili smrdljivi gnoj.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Problemi s jetrom

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati probleme s Vašom jetrom koji se mogu razviti u ozbiljno stanje kao što je poremećaj funkcije jetre i zatajenje jetre, koje može imati smrtni ishod. Vaš liječnik će provjeravati Vaše jetrene enzime za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience. Znakovi da Vaša jetra možda ne radi ispravno mogu uključivati:

- pojavu žutila kože ili bjeloočnica (žutica)
- tamnu mokraću
- umor
- mučninu
- povraćanje
- gubitak teka
- bol u desnoj strani trbuha (abdomena)
- lako stvaranje modrica.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Krvni ugrušci

Duboka venska tromboza (DVT) i plućna embolija

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati krvne ugruške u Vašim venama, osobito u nogama (duboka venska tromboza ili DVT), koji mogu otići u Vaša pluća (plućna embolija). Znakovi i simptomi mogu uključivati:

- oštru bol u prsnom košu
- nedostatak zraka
- ubrzano disanje

- bol u nozi
- oticanje ruku i šaka ili nogu i stopala.

Trombotička mikroangiopatija (TMA)

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati krvne ugruške u malim krvnim žilama u bubrezima i mozgu koji su praćeni smanjenim brojem crvenih krvnih stanica i stanica uključenih u zgrušavanje krvi (trombotička mikroangiopatija, TMA). Znakovi i simptomi mogu uključivati:

- lako stvaranje modrica
- visok krvni tlak
- vrućicu
- smetenost
- omamljenost
- napadaje
- smanjeno izlučivanje mokraće.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Sindrom lize tumora

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati ubrzano raspadanje stanica raka što rezultira sindromom lize tumora, koji u nekih ljudi može imati smrtni ishod. Simptomi mogu uključivati nepravilne otkucaje srca, napadaje, smetenost, grčeve u mišićima ili smanjenje izlučivanja mokraće. **Odmah potražite liječničku pomoć** u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Infekcije

Postoji mogućnost da infekcije koje se jave za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience postanu ozbiljne. Simptomi infekcija mogu uključivati:

- vrućicu
- simptome nalik gripi kao što su kašalj, umor i bolovi u tijelu koji ne prolaze
- nedostatak zraka i/ili piskanje
- bol prilikom mokrenja
- posjekotine, ogrebotine ili rane koje su crvene, tople, otečene ili bolne.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Upala pluća

U rijetkim slučajevima Pazopanib Pharmascience može uzrokovati upalu pluća (intersticijsku bolest pluća, pneumonitis), koja u nekih osoba može imati smrtni ishod. Simptomi uključuju nedostatak zraka ili kašalj koji ne prolazi. Za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience pratit će se pojave bilo kakvih plućnih problema.

Odmah potražite liječničku pomoć u slučaju pojave bilo kojeg od navedenih simptoma.

Problemi sa štitnjačom

Pazopanib Pharmascience može sniziti količinu hormona štitnjače koju Vaše tijelo proizvodi. To može rezultirati povećanjem tjelesne težine i umorom. Za vrijeme uzimanja lijeka Pazopanib Pharmascience kontrolirat će se razina hormona štitnjače.

Recite svom liječniku ako primijetite značajno povećanje tjelesne težine ili umor.

Zamagljen ili oslabljen vid

Pazopanib Pharmascience može uzrokovati odvajanje ili razdor ovojnice na stražnjem dijelu oka (odvajanje ili razdor mrežnice). To može rezultirati zamagljenim ili oslabljenim vidom.

Recite svom liječniku ako primijetite bilo kakvu promjenu u svom vidu.

Moguće nuspojave (uključujući moguće ozbiljne nuspojave pod odgovarajućom skupinom učestalosti).

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- visok krvni tlak
- proljev
- mučnina ili povraćanje

- bol u trbuhu
- gubitak teka
- gubitak tjelesne težine
- poremećaj ili gubitak okusa
- bolna usta
- glavobolja
- bol uzrokovana tumorom
- gubitak energije, osjećaj slabosti ili umora
- promjene boje kose
- neuobičajen gubitak kose ili njeno prorjeđivanje
- gubitak kožnog pigmenta
- kožni osip koji može uključivati ljuštenje kože
- crvenilo i oticanje dlanova ruku ili tabana.

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako bilo koja od ovih nuspojava počne predstavljati problem.

Vrlo često se mogu pokazati u pretragama krvi ili mokraće:

- povišenje jetrenih enzima
- sniženje razine albumina u krvi
- proteini u mokraći
- sniženje broja trombocita (stanica koje pomažu u zgrušavanju krvi)
- sniženje broja bijelih krvnih stanica.

Često (mogu se javiti u **manje od 1 na 10** osoba):

- probavne smetnje, nadutost, vjetrovi
- krvarenje iz nosa
- suha usta ili ranice u ustima
- infekcije
- neuobičajena pospanost
- otežano spavanje
- bol u prsnom košu, nedostatak zraka, bol u nozi i oticanje nogu/stopala. Ovo mogu biti znakovi krvnih ugrušaka u Vašem tijelu (tromboembolija). Ako se ugrušak otkine, mogao bi stići do pluća, a to može biti životno ugrožavajuće ili čak smrtonosno.
- srce postaje manje učinkovito u pumpanju krvi po tijelu (disfunkcija srca)
- usporeni otkucaji srca
- krvarenje u ustima, iz rektuma ili u plućima
- omaglica
- zamućen vid
- navale vrućine
- oticanje izazvano nakupljanjem tekućine u licu, rukama, gležnjevima, stopalima ili očnim kapcima
- trnci, slabost ili utrnulost šaka, ruku, nogu ili stopala
- poremećaji kože, crvenilo, svrbež, suha koža
- poremećaji noktiju
- osjećaj peckanja, bockanja, svrbeži ili trnaca
- osjet hladnoće uz drhtavicu
- pojačano znojenje
- dehidracija
- bol u mišićima, zglobovima, tetivama ili prsnom košu, grčenje mišića
- promuklost
- nedostatak zraka
- kašalj
- iskašljavanje krvi
- štucanje
- stanje kad pluća kolabiraju, a zrak ostane zaglavljen u prostoru između pluća i prsa, često uzrokujući nedostatak zraka (pneumotoraks).

Recite svom liječniku ili ljekarniku ako bilo koja od ovih nuspojava počne predstavljati problem.

Često se mogu pokazati u pretragama krvi ili mokraće:

- nedovoljno aktivna štitnjača
- poremećaj funkcije jetre
- povišenje razine bilirubina (tvari koju proizvodi jetra)
- povišenje razine lipaze (enzima koji sudjeluje u probavi)
- povišenje razine kreatinina (tvari koja se proizvodi u mišićima)
- promjene razina drugih različitih spojeva/enzima u krvi. Vaš će Vas liječnik obavijestiti o nalazima krvnih pretraga.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- moždani udar
- privremeno smanjenje dotoka krvi u mozak (prolazni napadaj nalik moždanom udaru)
- prekid opskrbe krvlju jednog dijela srca ili srčani udar (infarkt miokarda)
- djelomični prekid opskrbe krvlju jednog dijela srca (ishemija miokarda)
- krvni ugrušci praćeni smanjenim brojem crvenih krvnih stanica i stanica uključenih u zgrušavanje krvi (trombotička mikroangiopatija, TMA). Oni mogu naštetiti organima poput mozga i bubrega.
- povećanje broja crvenih krvnih stanica
- iznenadan nedostatak zraka, osobito u kombinaciji s oštrom boli u prsnoj koži i/ili ubrzanim disanjem (plućna embolija)
- jako krvarenje u probavnom sustavu (poput želuca, jednjaka ili crijeva) ili bubrezima, rodnici i mozgu
- poremećaj srčanog ritma (produljenje QT intervala)
- rupa (proboj) u želucu ili crijevima
- abnormalni prolazi koji se stvaraju između dijelova crijeva (fistule)
- jake ili neredovite menstruacije
- iznenadno naglo povećanje krvnog tlaka (hipertenzivna kriza)
- upala gušterače (pankreatitis)
- upala jetre, nedovoljan rad jetre ili oštećenje jetre
- pojava žutila kože ili bjeloočnica (žutica)
- upala ovojnice trbušne šupljine (peritonitis)
- curenje iz nosa
- osip koji može svrbjeti ili biti upaljen (ravne ili izdignute mrlje ili mjehuri)
- učestale stolice
- povećana osjetljivost kože na sunčevu svjetlost
- smanjen osjet, osobito kože
- rana na koži koja ne zacjeljuje (kožni ulkus).

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- upala pluća (pneumonitis)
- proširenje i slabljenje stijenke krvne žile ili rascjep stijenke krvne žile (aneurizme i disekcije arterije).

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- sindrom lize tumora zbog ubrzanog raspadanja stanica raka
- zatajenje jetre.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Pazopanib Pharmascience

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na bočici ili blisteru i na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pazopanib Pharmascience sadrži

Pazopanib Pharmascience 200 mg filmom obložene tablete

- Djelatna tvar je pazopanib (u obliku pazopanibklorida). Jedna filmom obložena tableta sadrži 200 mg pazopaniba.
- Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza (E460), natrijev škroboglikolat (vrsta A), povidon K30 (E1201), magnezijev stearat (E470b).
Ovojnica tablete: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol 400 (E1521), crveni željezov oksid (E172), polisorbata 80 (E433).

Pazopanib Pharmascience 400 mg filmom obložene tablete

- Djelatna tvar je pazopanib (u obliku pazopanibklorida). Jedna filmom obložena tableta sadrži 400 mg pazopaniba.
- Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: mikrokristalična celuloza (E460), natrijev škroboglikolat (vrsta A), povidon K30 (E1201), magnezijev stearat (E470b).
Ovojnica tablete: hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171), makrogol 400 (E1521), polisorbata 80 (E433).

Kako Pazopanib Pharmascience izgleda i sadržaj pakiranja

Pazopanib Pharmascience 200 mg filmom obložene tablete

Pazopanib Pharmascience 200 mg filmom obložene tablete su ružičaste tablete oblika kapsule, s oznakom „200“ na jednoj strani, približnih dimenzija 14,3 mm × 5,7 mm. Pakirane su u bijele bočice (HDPE) sa zatvaračem sigurnim za djecu koje sadrže 30, 90, višestruko pakiranje s 90 (3 pakiranja od 30) tableta. Pakirane su u prozirne Al-PVC/PE/PVDC blistere koji sadrže 30, 60, višestruko pakiranje s 60 (2 pakiranja od 30), 90, višestruko pakiranje s 90 (3 pakiranja od 30) tableta. Pakirane su u prozirne Al-PVC/PE/PVDC blistere s jediničnom dozom koji sadrže 30 × 1, 60 × 1, višestruko pakiranje s 60 × 1 (2 pakiranja od 30 × 1), 90 × 1, višestruko pakiranje s 90 × 1 (3 pakiranja od 30 × 1) tableta.

Pazopanib Pharmascience 400 mg filmom obložene tablete

Pazopanib Pharmascience 400 mg filmom obložene tablete su bijele tablete oblika kapsule, s oznakom „400“ na jednoj strani, približnih dimenzija 18,0 mm × 7,1 mm. Pakirane su u bijele bočice (HDPE) sa zatvaračem sigurnim za djecu koje sadrže 30 ili 60 tableta. Pakirane su u prozirne Al-PVC/PE/PVDC blistere koji sadrže 30, 60, višestruko pakiranje s 60 (2 pakiranja od 30), 90, višestruko pakiranje s 90 (3 pakiranja od 30) tableta. Pakirane su u prozirne Al-PVC/PE/PVDC blistere s jediničnom dozom koji sadrže 30 × 1, 60 × 1, višestruko pakiranje s 60 × 1 (2 pakiranja od 30 × 1), 90 × 1, višestruko pakiranje s 90 × 1 (3 pakiranja od 30 × 1) tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet
PHARMASCIENCE INTERNATIONAL LIMITED
Lampousas 1
1095 Nicosia
Cipar

Proizvođač
Remedica Ltd
Aharnon Street, Limassol Industrial Estate
3056 Limassol
Cipar

PharOS MT Ltd.
HF62X, Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG3000
Malta

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku
PHOENIX Farmacija d.o.o.
Ozaljska 95
10 000 Zagreb
Tel: 015588297

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Bugarska:	пазопаниб Pharmascience 200 mg, 400mg филмирани таблетки
Hrvatska:	Pazopanib Pharmascience 200 mg, 400mg filmom obložene tablete
Poljska:	Pazopanib Pharmascience
Slovenija:	Pazopanib Pharmascience 200 mg, 400 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2022.