

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Pelaria 20 mg/2,5 ml sirup *suhi ekstrakt pelargonijinog korijena*

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzimajte ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Ako simptomi ne prestaju tijekom primjene lijeka ili ako se pojave nuspojave koje nisu navedene u uputi o lijeku, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Pelaria i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Pelaria
3. Kako uzimati lijek Pelaria
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Pelaria
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Pelaria i za što se koristi

Pelaria sadrži suhi ekstrakt korijena pelargonije. Pelaria je tradicionalni biljni lijek za simptomatsko liječenje prehlade.

Ovo je tradicionalni biljni lijek za uporabu u navedenoj indikaciji isključivo na temelju dugotrajne primjene.

Lijek Pelaria je indiciran u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Pelaria

Nemojte uzimati lijek Pelaria:

- ako ste alergični na suhi ekstrakt korijena pelargonije ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete lijek Pelaria.

Posavjetujte se s liječnikom ako osjetite nedostatak zraka, vrućicu, krvavi ili gnojni ispljuvak ili ako se simptomi pogoršaju tijekom primjene lijeka.

U slučaju pojave znakova toksičnosti jetre (kao što su mučnina, gubitak apetita, bol u gornjem dijelu trbuha (epigastrična bol), umor, žuta boja kože), potrebno je odmah prekinuti primjenu lijeka i posavjetovati se s liječnikom.

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti.

Djeca

Farmaceutski oblik (Pelaria 20 mg/2,5 ml sirup) nije prikladan za djecu mlađu od 6 godina.

Drugi lijekovi i Pelaria

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate/primjenjujete, nedavno ste uzeli/primijenili ili biste mogli uzeti/primijeniti bilo koje druge lijekove.

Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka dostatnih podataka, ne preporučuje se primjena tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Pelaria sadrži tekući maltitol

Ovaj lijek sadrži 893 mg maltitola, tekućeg (E 965) u jednoj dozi od 2,5 ml sirupa.

Ako Vam je liječnik rekao da Vi ili Vaše dijete ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Pelaria sadrži sorbitol

Ovaj lijek sadrži 625,1 mg sorbitola (E 420) u jednoj dozi od 2,5 ml sirupa.

Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete(uzme) ili primite(primi) ovaj lijek..

3. Kako uzimati lijek Pelaria

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je sljedeća:

Adolescenti u dobi od 12 i više godina, odrasli i starije osobe:
2,5 ml sirupa tri puta dnevno

Primjena u djece:
Djeca u dobi od 6 do 11 godina:
2,5 ml sirupa dva puta dnevno

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina.

Bolesnici s oštećenjem bubrega i/ili jetre:

Lijek se ne smije primjenjivati u bolesnika s postojećim bolestima/poremećajima jetre.

Način primjene

Kroz usta.

Prije uporabe dobro protresti bočicu. Uzmite lijek Pelaria kroz usta, koristeći priloženu mjernu čašicu. Uz lijek dolazi odgovarajuća građirana mjerna čašica.

Trajanje primjene

Ako se simptomi pogoršaju ili ne poboljšaju nakon 7 dana primjene lijeka, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ako uzmete više lijeka Pelaria nego što ste trebali

Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Pelaria

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Učestalost nuspojava nije poznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

Poremećaji imunološkog sustava:

Preosjetljivost

Poremećaji kože i potkožnog tkiva:

Osip, svrbež (pruritus), koprivnjača (urtikarija), angioedem.

Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:

Krvarenje iz nosa

Poremećaji probavnog sustava:

Proljev, bol u gornjem dijelu trbuha (epigastrična bol), mučnina, povraćanje, krvarenje desni (gingive)

Poremećaji jetre i žuči:

Oštećenje jetre (hepatoksičnost), hepatitis.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete također prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Pelaria

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Originalno zatvoren lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon prvog otvaranja, potrebno je upotrijebiti sirup u roku od 3 mjeseca. Nakon otvaranja sirup čuvati u zatvorenoj bočici na temperaturi ispod 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Pelaria sadrži

Djelatna tvar je: suhi ekstrakt pelargonijinog korijena.

2,5 ml sirupa sadrži 20 mg ekstrakta (u obliku suhog ekstrakta) (DER 4-25:1) iz *Pelargonium sidoides* DC (ljekovita pelargonija) i/ili *Pelargonium reniforme* Curt., radix (korijen pelargonije).

Ekstrakcijsko otapalo: etanol 11 % m/m.

Jedan ml sirupa sadrži 8 mg ekstrakta (u obliku suhog ekstrakta).

Pomoćne tvari su: maltodekstrin, tekući maltitol (E 965), tekući sorbitol (nekrystalizirajući) (E 420), kalijev sorbat (E 202), citratna kiselina (E 330), pročišćena voda.

Kako Pelaria izgleda i sadržaj pakiranja

Sirup je tamnocrvene boje i karakterističnog mirisa. Lijek sadrži sastojke prirodnog podrijetla koji mogu uzrokovati pojavu sedimenta.

Smeđa staklena bočica zatvorena bijelim, polietilenskim zatvaračem s navojem i polipropilenskom mjernom čašicom kapaciteta 20 ml u kutiji zajedno s uputom o lijeku. Svaka bočica sadrži 100 ml sirupa.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alpen Pharma GmbH
Steinenfeld 3
77736 Zell am Harmersbach
Njemačka

Proizvođač

Phytopharm Klęka SA
Klęka 1
63-040 Nowe Miasto Nad Warta
Poljska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alpen Pharma d.o.o.
Ul. Matije Petra Katančića 28
10430 Samobor
Tel. + 385 91 214 4013
Hrvatska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Bugarska:	Пелариа 20 mg/2,5 ml сироп
Hrvatska:	Pelaria sirup
Češka:	Omelis 20 mg/2,5 ml sirup
Mađarska:	Pelaria 20 mg/2,5 ml szirup
Slovačka:	Omelis 20 mg/2,5 ml sirup

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

Ova je uputa zadnji puta revidirana u listopadu 2025.