

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Persantin 75 mg obložene tablete dipiridamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Persantin i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin
3. Kako uzimati Persantin
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Persantin
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Persantin i za što se koristi

Persantin sadrži djelatnu tvar dipiridamol koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju antitrombocitni lijekovi (lijekovi koji sprječavaju nastanak krvnih ugrušaka sprječavanjem nakupljanja krvnih pločica).

Koristi se za sprječavanje začepljenja krvnih žila ugrušcima (tromboembolije) u odraslih nakon ugradnje umjetnih srčanih zalistaka kao dodatak drugim lijekovima koji se koriste na usta za sprječavanje zgrušavanja krvi (oralnim antikoagulansima).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Persantin

Nemojte uzimati Persantin

- ako ste alergični na dipiridamol ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Persantin:

- ako bolujete od teškog oštećenja krvnih žila srca (uključujući nestabilnu anginu i nedavni srčani udar, blokadu protoka krvi iz lijeve klijetke ili zatajenje srca)
- ako se morate podvrgnuti farmakološkom stres testu s intravenskim dipiridamolom ili drugim adenosinergičkim lijekovima (npr. adenosin, regadenozon), trebali biste prekinuti liječenje lijekovima koji sadrže dipiridamol koji se primjenjuju oralno, kao što su Persantin, 24 sata prije intravenske primjene dipiridamola ili 48 sati prije primjena drugih adenosinergičkih lijekova, jer može povećati rizik od srčanožilnih nuspojava.
- ako bolujete od mijastenije gravis (rijetka bolest koja zahvaća mišiće). Liječnik će razmotriti potrebu za novom prilagodbom terapije nakon promjena u doziranju dipiridamola (vidjeti *Drugi lijekovi i Persantin*).
- ako imate kamence u žučnom mjeđuhuru i upalu žučnog kanala, budući da je zabilježeno da se dipiridamol ugrađuje u žučne kamence, iako su ti pacijenti godinama uzimali oralni dipiridamol

Djeca

Lijek nije namijenjen za primjenu u djece. Postoje ograničeni podaci o primjeni lijeka Persantin kod djece.

Drugi lijekovi i Persantin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Potrebno je obavijestiti svog liječnika ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

- adenosin ili regadenozon (lijekovi za liječenje srčanih problema). Persantin povećava razinu ovih lijekova u krvi i njegov učinak na srce i krvne žile. Liječnik će razmotriti prilagodbu doze adenosina.
- lijekove za razrijedivanje krvi/sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka (npr. varfarin, acetilsalicilatna kiselina).
- lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka. Persantin može pojačati njihov učinak na smanjenje krvnog tlaka.
- lijekove za liječenje slabosti mišića koji se nazivaju inhibitori kolinesteraze. Persantin može umanjiti učinak ovih lijekova.
- teofilin i srodne lijekove koji se nazivaju ksantini. Ovi lijekovi mogu smanjiti učinak Persantina pri istodobnom uzimanju.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne postoje odgovarajući podaci o sigurnosti primjene Persantina u trudnoći. Lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći, osobito u prva tri mjeseca, osim ako Vam liječnik ne kaže drugačije.

Persantin se izlučuje u majčino mijeko, stoga se Persantin smije primjenjivati tijekom dojenja samo ako to Vaš liječnik smatra neophodnim.

Nisu provedena ispitivanja o učinku Persantina na plodnost ljudi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Pri uzimanju ovog lijeka može se pojaviti omaglica. Stoga se preporučuje oprez prilikom upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Ukoliko se pojavi omaglica, nemojte upravljati vozilima niti strojevima.

Persantin sadrži saharozu i sunset yellow (E110).

Ovaj lijek sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek sadrži boju sunset yellow (E110), te može prouzročiti alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Persantin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučeno je doziranje između 300-450 mg dnevno, u podijeljenim dozama. Najviša dozvoljena dnevna doza je 600 mg.

Primjena u djece

Lijek nije namijenjen za primjenu u djece. Postoje samo ograničeni podaci o uporabi Persantina kod djece.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Kapsule je poželjno uzimati u vrijeme obroka. **Kapsule treba progutati cijele bez žvakanja.**

Ako uzmete više Persantina nego što ste trebali

Obratite se svom liječniku ili otidite u najbližu bolnicu. Sa sobom ponesite pakiranje lijeka, i u slučaju ako unutra nema tableta kako bi zdravstveni radnici mogli znati koji ste lijek uzeli. Mogu se javiti simptomi kao što su osjećaj topline, crvenilo, znojenje, uzinemirenost, osjećaj slabosti, omaglica, bol ili stezanje u prsimu, pad krvnog tlaka i ubrzan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Persantin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljeni tabletu.

Ako prestanete uzimati Persantin

Obratite se svom liječniku prije nego prestanete uzimati Persantin.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U slučaju pojave bilo kojeg od sljedećih znakova alergijske reakcije, **odmah prestanite uzimati Persantin i potražite medicinsku pomoć:**

- poteškoće pri disanju, s ili bez oticanja lica, usana, jezika i/ili grla,
- oticanje lica, usana, jezika i/ili grla (angioedem), otežano gutanje,
- osip popraćen svrbežom kože.

Ostale nuspojave koje su prijavljene pri primjeni Persantina opisane su u nastavku:

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- glavobolja, omaglica
- proljev, mučnina.

Česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- bol i stezanje u prsimu (angina pektoris)
- povraćanje
- osip
- bol u mišićima.

Nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- smanjeni broj trombocita (krvnih pločica). Ovo je vidljivo krvnim pretragama, a simptomi mogu uključivati stvaranje modrica i krvarenje.
- ubrzani otkucaji srca
- sniženi krvni tlak, navale vrućine
- sužavanje dišnih puteva
- koprivnjača
- krvarenje nakon operativnog zahvata, krvarenje tijekom operativnog zahvata.

U osoba koje imaju žučne kamence, dipiridamol može prijeći u žučne kamence.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Persantin

Persantin morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece. Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Persantin se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake "EXP".

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Persantin sadrži

1 obložena tableta sadrži 75 mg dipiridamola.

Pomoćne tvari: bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, sušeni kukuruzni škrob, modificirani škrob (kukuruzni škrob, oksidirani), silicijev dioksid, magnezijev stearat, saharoza, talk, arapska guma, titanijev dioksid (E171), makrogol 6000, karnauba vosak, bijeli pčelinji vosak, žuta boja Yellow Orange S (85 posto) (E110), pročišćena voda, bezvodni etanol.

Kako Persantin izgleda i sadržaj pakiranja

60 obloženih tableta u PVC/PVDC blisteru, u kutiji

Tableta je okrugla, sjajna, crvena bikonveksna dražea sa žutom jezgrom, promjera 8,1-8,7 mm i debljine 4,0-4,5 mm

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja:

Glenwood GmbH

Pharmazeutische Erzeugnisse

Arabellastr. 17

81925 München

Njemačka

info@glenwood.de

Proizvođač:

Delpharm Reims

10 rue Colonel Charbonneaux, 51100 Reims,

Francuska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku:

Marti Farm d.o.o.

Laščinska cesta 40
10 000 Zagreb
Telefon:+385 1 55 88 297

Način i mjesto izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u veljači 2023.