

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Prospan Liquid oralna otopina

suhi ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Prospan Liquid i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan Liquid
3. Kako uzimati Prospan Liquid
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Prospan Liquid
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Prospan Liquid i za što se koristi

Prospan Liquid je biljni lijek s učinkom na dišni sustav.

Prospan Liquid se koristi

Za olakšano iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih produktivnim kašljem u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Kako djeluje Prospan Liquid

Prospan Liquid razrjeđuje gustu bronhalnu sluz i pospješuje iskašljavanje kod bolesti dišnog sustava praćenih obilnim stvaranjem sekreta.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Prospan Liquid

Nemojte uzimati Prospan Liquid

- ako ste alergični na djelatnu tvar, neku drugu biljku iz porodice *Araliaceae* (bršljanovke) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Prospan Liquid u sljedećim slučajevima:

- U slučaju smetnji disanja (kratak dah), povišene temperature kao i gnojnog ili krvavog iskašljaja, morate odmah potražiti savjet liječnika.
- U slučaju da bolujete od gastritisa ili čira na želucu (vrijeda), potražite savjet liječnika.

Djeca

Prospan Liquid ne smiju uzimati djeca mlađa od 6 godina.

Drugi lijekovi i Prospan Liquid

Za sada nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

- Ne preporučuje se istodobna primjena ovog lijeka s opijatnim antitusicima – opijatnim lijekovi koji sprječavaju kašalj (npr. *kodein*, *dekstrometorfan*).

Prospan Liquid s hranom, pićem i alkoholom

Nema posebnih zahtjeva.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o neškodljivosti tijekom trudnoće i dojenja, Prospan Liquid ne preporučuju se tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Važna upozorenja o ostalim sastojcima Prospan Liquida

Sadrži sorbitol. Kad se koristi prema uputi, svaka doza sadrži 1,9 g sorbitola. Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ili primite (primi) ovaj lijek.

Ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

3. Kako uzimati Prospan Liquid

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za Prospan Liquid oralnu otopinu u boci je:

Dob	Pojedinačna doza	Ukupna dnevna doza
Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina	5 ml, odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista	15 ml (5 ml 3 puta dnevno), odgovara 105 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista
Djeca između 6 i 12 godina	5 ml, odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista	10 ml (5 ml 2 puta dnevno), odgovara 70 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista

Preporučena doza za Prospan Liquid oralnu otopinu u vrećici je:

Dob	Pojedinačna doza	Ukupna dnevna doza
Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina	5 ml (jedna vrećica), odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista	15 ml (jedna vrećica 3 puta dnevno), odgovara 105 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista
Djeca između 6 i 12 godina	5 ml (jedna vrećica), odgovara 35 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista	10 ml (jedna vrećica 2 puta dnevno), odgovara 70 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista

Način primjene

Kroz usta.

Oralnu otopinu potrebno je uzeti nerazrijeđenu ujutro, u podne i/ili navečer.

Prospan Liquid oralna otopina u boci:




Uzima se pomoću priložene dozirne čašice (oznaka 5 ml).

Prije uporabe uvijek dobro protresite bocu!

Prospan Liquid oralna otopina u vrećici:

Uzima se iz vrećice (5 ml).

Za Prospan Liquid izabrane su vrećice koje se jednostavno otvaraju. Detalje o primjeni možete vidjeti na sljedećim slikama:



Nježno istegnuti vrećicu prije uporabe, kao što je prikazano.

Čvrsto primiti vrećicu i otvoriti.

Piti otopinu, istodobno stišćući vrećicu dok se ne isprazni.

Koliko dugo smijete uzimati Prospan Liquid

U slučaju da Vaši simptomi traju dulje od tjedan dana tijekom primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

U slučaju nastanka otežanog disanja, vrućice, gnojnog ili krvavog iskašljaja, odmah potražite savjet liječnika.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više Prospan Liquida nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Primjena većih količina može izazvati mučninu, povraćanje, proljev i uznemirenost. U tom slučaju morate se javiti liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Prospan Liquid

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Jednostavno nastavite uzimati lijek kako Vam je propisao liječnik ili prema uputi o lijeku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prekinite uzimanje lijeka i odmah obavijestite liječnika ako primijetite sljedeće nuspojave:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

- ozbiljne alergijske reakcije kao što je angioedem (Quinckeov edem), koje dovode do oticanja lica, jezika i grla te otežanog disanja.

Ostale moguće nuspojave su:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- probavne smetnje kao što su mučnina, povraćanje i proljev.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- alergijske reakcije kao što su koprivnjača (vrsta osipa), kožni osip, proširenje kapilara na licu što dovodi do crvenila kože, otežano disanje.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V.](#)**

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Prospan Liquid

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata i djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Informacije o roku valjanosti nakon otvaranja ili pripreme:

Prospan Liquid u boci: nakon otvaranja rok valjanosti je 6 mjeseci.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Prospan Liquid sadrži

- Djelatna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista.
- 5 ml oralne otopine sadrži 35 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Hedera helix* L. folium (bršljanov list) (5-7,5 : 1); ekstrakcijsko otapalo: etanol 30 % *m/m*.
- Drugi sastojci su kalijev sorbat (E 202), bezvodna citratna kiselina (E 330), ksantanska guma, tekući kristalizirajući sorbitol 70% (E 420), aroma naranče (sadrži etanol), aroma Frescofort Permaseal, aroma levomentol, pročišćena voda.

Kako Prospan Liquid izgleda i sadržaj pakiranja

Svjetlo smeđa, lagano zamućena otopina voćnog mirisa s okusom mentola.

Prospan Liquid je dostupan u staklenoj boci s plastičnim nastavkom za lijevanje i plastičnim zatvaračem uz priloženu plastičnu dozirnu čašicu s 100 i 200 ml otopine i pakiranjima s 15 ili 21 vrećicom. Svaka vrećica sadrži 5 ml oralne otopine.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Proizvođač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2022.