

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

**RENNIE 680 mg / 80 mg tablete za žvakanje**  
kalcijev karbonat, magnezijev subkarbonat, teški

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Rennie i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rennie
3. Kako uzimati Rennie
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rennie
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

## 1. ŠTO JE RENNIE I ZA ŠTO SE KORISTI

Rennie je antacid, lijek za smanjivanje kiselosti želučanog soka, a sadrži kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški.

Koristi se u odraslih i djece starije od 12 godina za kratkotrajno ublažavanje simptoma prekomjernog lučenja želučane kiseline kao npr. žgaravice, vraćanja želučane kiseline, epizodnih želučanih bolova te loše probave.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

## 2. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI RENNIE

### Nemojte uzimati Rennie:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
- ako imate hiperkalcemiju (povišena koncentracija kalcija u krvi) i/ili stanja koja uzrokuju hiperkalcemiju;
- ako imate hiperkalciuriju (pojačano izlučivanje kalcija putem mokraće);
- ako imate kamence u bubregu koji nastaju zbog taloženja kalcija;
- ako imate teško zatajenje bubrega;
- ako imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi).

### Upozorenja i mjere opreza

Dugotrajnu uporabu lijeka treba izbjegavati. Preporučena doza ne smije se prekoračiti.

Ovaj lijek ne smije se uzimati neprekidno dulje od 7 dana bez savjetovanja s liječnikom.

Ukoliko se simptomi javljaju povremeno i postoji potreba za čestom primjenom lijeka, potrebno je potražiti savjet liječnika.

Kao i kod ostalih antacida, Rennie tablete mogu prikriti simptome ozbiljnijeg stanja poput maligne bolesti (raka) želuca.

Potreban je oprez ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega. Ako imate oštećenu funkciju bubrega, liječnik Vam treba redovito nadzirati razine kalcija, fosfata i magnezija u krvi.

Dugotrajno uzimanje visokih doza lijeka može dovesti do nuspojava kao što su hiperkalcemija (povišena koncentracija kalcija u krvi), hipermagnezija (povišena koncentracija magnezija u krvi) i mliječno-alkalni sindrom posebno u bolesnika s zatajenjem bubrega. Pogledajte i dio 3. Ako uzmete više lijeka Rennie nego što ste trebali.

Rennie se ne smije koristiti u slučajevima hiperkalciurije (pojačano izlučivanje kalcija putem mokraće).

Produljeno uzimanje lijeka Rennie može povećati rizik od nastanka bubrežnih kamenaca.

Soli magnezija mogu prouzročiti depresiju središnjeg živčanog sustava u bolesnika s zatajenjem bubrega.

### **Djeca i adolescenti**

Rennie se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 12 godina zbog nedostatnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

### **Drugi lijekovi i Rennie**

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate:

- antibiotike (tetracikline, kinolone),
- lijekove za liječenje zatajenja srca (glikozide npr. digoksin),
- lijekove za izmokravanje (tiazidske diuretike),
- bisfosfonate (koriste se u liječenju osteoporoze i nekih karcinoma),
- dolutegravir (koristi se u liječenju osoba zaraženih virusom HIV-a),
- levotiroksin (lijek za štitnu žlijezdu),
- fosfate, fluoride, preparate koji sadrže željezo, eltrombopag (koristi se za liječenje bolesnika koji imaju niske vrijednosti trombocita u krvi).

prije uzimanja Rennie tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Preporučuje se uzimanje Rennie tableta za žvakanje odvojeno od drugih lijekova, primjerice u razmaku od jedan do dva sata.

### **Rennie s hranom i pićem**

Rennie se ne smije uzimati s velikim količinama mlijeka ili mliječnih proizvoda.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Povećan rizik od kongenitalnih oštećenja se ne očekuje, niti je zapažen nakon dugotrajne primjene kalcijevog karbonata i magnezijevog subkarbonata, teškog, tijekom trudnoće.

Rennie se može uzimati tijekom trudnoće ako se uzima u skladu s uputom o lijeku.

Maksimalna preporučena dnevna doza (11 tableta za žvakanje) ne smije se prekoračiti i ne smije se uzimati dulje od 2 tjedna.

Kako bi se spriječilo preopterećenje kalcijem, trudnice moraju izbjegavati istodobno uzimanje većih količina mlijeka i mliječnih proizvoda.

Kalcij i magnezij se izlučuju u majčino mlijeko, ali u terapijskim dozama lijeka Rennie ne očekuju se učinci na dojenčad.

Nema poznatih dokaza koji ukazuju na to da preporučena doza lijeka Rennie ima štetne učinke na ljudsku plodnost.

## **Upravljanje vozilima i strojevima**

Ne očekuje se utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

## **Rennie sadrži saharozu**

Ovaj lijek sadrži 475 mg saharoze u jednoj tableti za žvakanje. O tome treba voditi računa u bolesnika s šećernom bolesti.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

## **3. KAKO UZIMATI RENNIE**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

### Odrasli i djeca starija od 12 godina

Preporučena doza je 1-2 tablete za žvakanje kao pojedinačna doza jedan sat nakon obroka i prije spavanja. U slučaju žgaravice ili želučanih bolova može se uzeti i dodatna doza između toga, ali to ne smije biti više od ukupno 11 tableta na dan i ne smije se kontinuirano uzimati dulje od 2 tjedna.

Rennie ne smijete uzimati neprekidno dulje od 7 dana bez savjetovanja s liječnikom.

### Djeca i adolescenti

Rennie se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 12 godina zbog nedostatnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

## **Način primjene**

Kroz usta. Tablete treba sažvakati ili otopiti u ustima. Tekućina nije potrebna.

## **Ako uzmete više lijeka Rennie nego što ste trebali**

Dugotrajno uzimanje visokih doza Rennie tableta za žvakanje (osobito u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega) može dovesti do zatajenja bubrega, poremećaja elektrolita u krvi (hipermagnezije, hiperkalcemije) i smanjene „kiselosti“ krvi (alkaloze) što može uzrokovati probavne smetnje (mučnina, povraćanje, zatvor) i mišićnu slabost.

U tim slučajevima treba prekinuti uzimanje lijeka i javiti se liječniku, a treba paziti i na primjeren unos tekućine.

U težim slučajevima predoziranja (npr. mliječno-alkalni sindrom – uz ranije navedene simptome mogu se javiti i umor, smetenost, učestalo mokrenje, pojačan osjećaj žeđi, prevelik gubitak tekućine (dehidracija)), treba zatražiti savjet liječnika zbog moguće potrebe drugih mjera nadoknade tekućine (npr. infuzija).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## **4. MOGUĆE NUSPOJAVE**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave:

- reakcije preosjetljivosti uključujući osip, koprivnjaču, svrbež, angioedem (uključuje simptome otok usnica, jezika i ždrijela), otežano disanje, anafilaksiju (uključuje simptome otežanog disanja, ubrzanog rada srca, promjene stanja svijesti do gubitka svijesti),
- hipermagnezija (visoke koncentracije magnezija u krvi) ili hiperkalcemija (visoke koncentracije kalcija u krvi) i alkalozna (smanjena „kiselost“ krvi),
- mučnina, povraćanje, želučane tegobe, zatvor i proljev
- mišićna slabost.

U slučaju predoziranja može se javiti tzv. mliječno-alkalni sindrom u kojem se javljaju sljedeće nuspojave: gubitak osjeta okusa, kalcinoza (nakupljanje soli kalcija u raznim tjelesnim tkivima), slabost, glavobolja, povećanje koncentracije dušika u krvi.

### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

## **5. KAKO ČUVATI RENNIE**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## **6. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE**

### **Što Rennie sadrži**

- Djelatne tvari su kalcijev karbonat i magnezijev subkarbonat, teški. Jedna tableta za žvakanje sadrži 680 mg kalcijevog karbonata (272 mg elementarnog kalcija) i 80 mg magnezijevog subkarbonata, teškog (20 mg elementarnog magnezija).
- Pomoćne tvari su: saharoza, škrob kukuruzni prethodno geliran, krumpirov škrob, talk, magnezijev stearat, parafin vrlo tekući, aroma pepermint, aroma limuna.

### **Kako Rennie izgleda i sadržaj pakiranja**

Jedna kutija sadrži 2 PVC/Al blistera s po 12 tableta za žvakanje.

### **Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač**

#### **Nositelj odobrenja:**

Bayer d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb

#### **Proizvođač**

Delpharm Gaillard, 33 Rue de l'Industrie, 74240 Gaillard, Francuska

### **Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana 02. kolovoza 2021.**