

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Rowachol meke želučanootporne kapsule

α -pinen, β -pinen, mentol, menton, kamfen, borneol, cineol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.
- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Rowachol i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowachol
3. Kako uzimati Rowachol
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Rowachol
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rowachol i za što se koristi

Rowachol se koristi za otapanje i lakši izlazak žučnih kamenaca. Rowachol povećava proizvodnju žuči i opušta žučne kanale. To pomaže u smanjenju bolnih grčeva žučnih kanala te olakšava postojećim žučnim kamencima da izađu (budu istisnuti) sa žuči van.

Rowachol kapsule namijenjene su za primjenu kod odraslih.

Prije upotrebe Rowachola neophodan je pregled kod liječnika specijalista koji će postaviti dijagnozu i savjetovati Vas oko uzimanja lijeka.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Rowachol

Nemojte uzimati Rowachol ako ste alergični (preosjetljivi) na neku djelatnu tvar: α -pinen, β -pinen, mentol, menton, kamfen, borneol, cineol ili neki drugi sastojak Rowachola (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Rowachol kapsule.

Obratite se svom liječniku ako uzimate lijekove protiv zgrušavanja krvi ili lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči.

Tijekom liječenja potrebna je periodička procjena bolesnikova stanja od strane liječnika.

Kamenci u žučovodu mogu prouzročiti komplikacije kao što su: opstruktivna žutica, ascendentni kolangitis, pankreatitis itd. Liječnik mora biti upoznat s time kako bi, posebno u slučaju starijih bolesnika mogao ispravno postupiti u odabiru načina liječenja.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena Rowachol kapsula kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Rowachol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove koji se dobiju bez recepta. To uključuje sljedeće:

- lijekove protiv zgrušavanja krvi (oralni antikoagulansi npr. varfarin)
- lijekove koji se razgrađuju u jetri ili izlučuju putem žuči (posavjetujte se sa Vašim liječnikom u vezi toga)

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena lijeka tijekom trudnoće ili dojenja se ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka o utjecaju Rowachol kapsula na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Mala je vjerojatnost utjecaja Rowachola na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Rowachol sadrži natrijev etilparahidroksibenzoat i natrijev propilparahidroksibenzoat.

Može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

3. Kako uzimati Rowachol

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni provjerite s liječnikom ili ljekarnikom.

Rowachol kapsula se mora progutati cijela s malo tekućine, prije jela. Ne grizite i ne žvačite kapsule.

Uobičajena doza za odrasle

Jedna do dvije kapsule tri puta na dan.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena Rowachol kapsula kod djece.

Ako uzmete više Rowachola nego što ste trebali

Ako ste uzeli više kapsula nego što ste trebali, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom koji će poduzeti potrebne mjere.

Kod predoziranja može doći do iritacije želuca što može prouzročiti mučninu, povraćanje i dijareju.

Ako ste zaboravili uzeti Rowachol

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu. Sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost zabilježenih nuspojava nije utvrđena.

- Povremeno se može pojaviti blagi okus po pepermintu. To se može ublažiti ili izbjeći uzimanjem lijeka na prazan želudac pola sata prije jela.
- Zabilježena je bol u ustima i ulceracije sluznice u ustima.
- Zabilježeni su blaži slučajevi preosjetljivosti na lijek koji su se očitovali reakcijama na koži.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rowachol

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rowachol sadrži?

Djelatna tvar u svakoj želučanootpornoj mekoj kapsuli sadrži: α -pinen 13,6 mg, β -pinen 3,4 mg, mentol 32,0 mg, menton 6,0 mg, borneol 5 mg, kamfen 5,0 mg, cineol 2,0 mg. Preostali sastojak je djevičansko maslinovo ulje.

Ovojnica kapsule sadrži: želatinu; glicerol 85%; natrijev etilparahidroksibenzoat (E215); natrijev propilparahidroksibenzoat (E217); natrijev bakar klorofilin (E 141) (100% topljiv u vodi)

Kako Rowachol izgleda i sadržaj pakiranja

Rowachol kapsule su zelene, ovalne, meke želatinske, želučanootporne kapsule koje sadrže zelenkasto žutu otopinu s jakim aromatičnim mirisom.

Svako pakiranje sadrži 50 kapsula u blister pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Rowa Pharmaceuticals, Ltd.
Newtown, Bantry, Co. Cork
Irska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medical Intertrade d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 3
10 431 Sveta Nedelja
Tel: 01/3336036

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 28. siječnja 2021.