

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ruksolitinib Sandoz 5 mg tablete
Ruksolitinib Sandoz 10 mg tablete
Ruksolitinib Sandoz 15 mg tablete
Ruksolitinib Sandoz 20 mg tablete

ruksolitinib

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Informacije u ovoj uputi su za Vas ili Vaše dijete – ali u uputi će pisati samo „Vi“.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Ruksolitinib Sandoz i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ruksolitinib Sandoz
3. Kako uzimati Ruksolitinib Sandoz
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ruksolitinib Sandoz
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ruksolitinib Sandoz i za što se koristi

Ruksolitinib Sandoz sadrži djelatnu tvar ruksolitinib.

Ruksolitinib Sandoz se primjenjuje za liječenje odraslih bolesnika s povećanom slezenom ili sa simptomima povezanim s mijelofibrozom, rijetkim oblikom raka krvi.

Ruksolitinib Sandoz se primjenjuje i za liječenje odraslih bolesnika s policitemijom verom koji su otporni na ili ne podnose hidroksiureju.

Ruksolitinib Sandoz se primjenjuje i za liječenje:

- djece u dobi od 28 dana i starije i odraslih s akutnom bolešću presatka protiv primatelja (engl. *graft-versus-host disease*, GvHD).
- djece u dobi od 6 mjeseci i starije i odraslih s kroničnim GvHD-om.

Postoje dva oblika GvHD-a: rani oblik koji se naziva akutni GvHD i obično se razvija ubrzo nakon presađivanja te može zahvatiti kožu, jetru i probavni sustav, te oblik koji se naziva kronični GvHD, koji se obično razvija kasnije, tjednima ili mjesecima nakon presađivanja. Kronični GvHD može zahvatiti skoro bilo koji organ.

Kako Ruksolitinib Sandoz djeluje

Povećanje slezene jedna je od karakteristika mijelofibroze. Mijelofibroza je poremećaj koštane srži, u kojoj se srž zamjenjuje ožiljnim tkivom. Patološka koštana srž više ne može stvarati dovoljno normalnih krvnih stanica i zbog toga se slezena značajno povećava. Blokiranjem djelovanja određenih enzima (koji se nazivaju Janus kinaze), ovaj lijek može smanjiti veličinu slezene u bolesnika s mijelofibrozom i ublažiti simptome kao što su vrućica, noćno znojenje, bolovi u kostima i gubitak tjelesne težine u bolesnika s mijelofibrozom. Ovaj lijek može pomoći u smanjenju rizika od ozbiljnih komplikacija s krvlju ili krvnim žilama.

Policitemija vera je poremećaj koštane srži u kojem srž stvara previše crvenih krvnih stanica. Krv postaje gušća kao rezultat povećane razine crvenih krvnih stanica. Ovaj lijek može ublažiti simptome, smanjiti veličinu slezene i volumen crvenih krvnih stanica koje se stvaraju u bolesnika s policitemijom verom tako što selektivno blokira enzime koji se zovu Janus kinaze (JAK1 i JAK2) te tako može smanjiti rizik od ozbiljnih komplikacija s krvlju ili krvnim žilama.

Bolest presatka protiv primatelja komplikacija je koja se javlja nakon presađivanja kada specifične stanice (T stanice) u darivateljevom presatku (npr. koštanoj srži) ne prepoznaju stanice/organe primatelja i napadaju ih. Selektivnim blokiranjem enzima koji se nazivaju Janus kinaze (JAK1 i JAK2), ovaj lijek smanjuje znakove i simptome akutnih i kroničnih oblika bolesti presatka protiv primatelja, što dovodi do poboljšanja bolesti i preživljenja presađenih stanica.

Ako imate bilo kakvih pitanja vezano uz djelovanje lijeka Ruksolitinib Sandoz ili o tome zašto Vam je propisan ovaj lijek, obratite se svom liječniku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ruksolitinib Sandoz

Pažljivo slijedite sve upute svoga liječnika. One se mogu razlikovati od općenitih informacija navedenih u ovoj uputi.

Nemojte uzimati Ruksolitinib Sandoz

- ako ste alergični na ruksolitinib ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako ste trudni ili dojite (pogledajte dio 2 „Trudnoća, dojenje i kontracepcija“).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ruksolitinib Sandoz ako:

- imate bilo kakve infekcije. Možda će biti potrebno liječiti Vašu infekciju prije početka uzimanja ovog lijeka
- ste ikada imali tuberkulozu ili bili u bliskom kontaktu s nekim tko ima ili je imao tuberkulozu. Vaš liječnik može provesti pretrage kako bi provjerio imate li tuberkulozu ili neku drugu infekciju.
- ste ikada imali hepatitis B
- imate poteškoća s bubrezima ili imate ili ste ikada imali poteškoća s jetrom, jer će Vam liječnik možda trebati propisati drugačiju dozu ovog lijeka
- ste ikada imali rak, osobito rak kože
- imate ili ste imali problema sa srcem
- ste u dobi od 65 godina ili stariji. Bolesnici u dobi od 65 godina i stariji mogu imati povećani rizik od problema sa srcem, uključujući srčani udar, i nekih oblika raka
- ste trenutni ili bivši pušač.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku tijekom liječenja lijekom Ruksolitinib Sandoz ako:

- osjetite vrućicu, zimicu ili druge simptome infekcije
- imate kronični kašalj s krvavo obojenim iskašljajem, vrućicu, noćno znojenje i gubitak tjelesne težine (to mogu biti znakovi tuberkuloze)
- imate bilo koji od sljedećih simptoma ili ako netko blizu Vas primijeti da imate bilo koji od ovih simptoma: smetenost ili poteškoće u razmišljanju, gubitak ravnoteže ili poteškoće u hodanju, nespretnost, poteškoće s govorom, smanjena snaga ili slabost na jednoj strani tijela, zamućeni vid i/ili gubitak vida. Ovo mogu biti znakovi ozbiljne infekcije mozga i Vaš liječnik može predložiti daljnje pretrage i praćenje.

- razvijete bolni kožni osip s mjehurićima (to su znakovi herpesa zoster).
- imate bilo kakve promjene na koži. To bi moglo zahtijevati daljnje promatranje, budući da su prijavljene određene vrste raka kože (nemelanomske).
- primijetite iznenadni nedostatak zraka ili otežano disanje, bol u prsnom košu ili bol u gornjem dijelu leđa, oticanje noge ili ruke, bol u nozi ili osjetljivost na dodir, ili crvenilo ili promjenu boje noge ili ruke, jer to mogu biti znakovi krvnih ugrušaka u venama.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina koji imaju bolest mijelofibrozu ili policitemiju veru zato što nije ispitivan u toj dobnoj skupini.

Za liječenje bolesti presatka protiv primatelja, Ruksolitinib Sandoz se može primjenjivati u bolesnika u dobi od 28 dana i starije.

Drugi lijekovi i Ruksolitinib Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Dok uzimate ovaj lijek, ne smijete početi uzimati novi lijek ako to prethodno ne provjerite s liječnikom koji Vam je propisao ovaj lijek. To uključuje lijekove koji se izdaju na recept, lijekove koji se izdaju bez recepta te biljne ili alternativne lijekove.

Osobito je važno da spomenete lijekove koji sadrže bilo koju od niže navedenih djelatnih tvari, budući da će liječnik možda morati prilagoditi dozu lijeka:

- neki lijekovi koji se primjenjuju za liječenje infekcija:
 - lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, flukonazol i vorikonazol)
 - antibiotici koji se primjenjuju za liječenje bakterijskih infekcija (kao što su klaritromicin, telitromicin, ciprofloksacin, ili eritromicin)
 - lijekovi za liječenje virusnih infekcija, uključujući infekciju HIV-om/AIDS (kao što su amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir/ritonavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir)
 - lijekovi za liječenje hepatitisa C (boceprevir, telaprevir).
- lijek za liječenje depresije (nefazodon).
- lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije) i stezanja, težine i boli u prsnom košu (kronične angine pectoris) (mibefradil ili diltiazem).
- lijek za liječenje žgaravice (cimetidin).
- lijek za liječenje srčane bolesti (avasimib).
- lijekovi koji se primjenjuju za zaustavljanje konvulzija i napadaja (fenitoin, karbamazepin ili fenobarbital i drugi antiepileptici).
- lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje tuberkuloze (TB) (rifabutin ili rifampicin).
- biljni lijek koji se primjenjuje za liječenje depresije (gospina trava (*Hypericum perforatum*)).

Razgovarajte sa svojim liječnikom ako niste sigurni odnosi li se gore navedeno na Vas.

Trudnoća, dojenje i kontracepcija

Trudnoća

- Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
- Ne uzimajte Ruksolitinib Sandoz tijekom trudnoće (pogledajte dio 2 „Nemojte uzimati Ruksolitinib Sandoz“).

Dojenje

- Nemojte dojiti dok uzimate ovaj lijek (pogledajte dio 2 „Nemojte uzimati Ruksolitinib Sandoz“). Obratite se svom liječniku za savjet.

Kontracepcija

- Uzimanje lijeka Ruksolitinib Sandoz nije preporučeno u žena koje mogu zatrudnjeti i ne uzimaju kontracepciju. Razgovarajte sa svojim liječnikom o tome kako koristiti odgovarajuću kontracepciju kako biste izbjegli trudnoću tijekom liječenja lijekom Ruksolitinib Sandoz.
- Razgovarajte sa svojim liječnikom ako zatrudnite dok uzimate Ruksolitinib Sandoz.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako osjetite omaglicu nakon uzimanja ovog lijeka, nemojte upravljati vozilom ili strojevima.

Ruksolitinib Sandoz sadrži laktozu i natrij

Ovaj lijek sadrži laktozu (mliječni šećer). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Ruksolitinib Sandoz

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Prije nego započnete liječenje i tijekom liječenja lijekom Ruksolitinib Sandoz, Vaš liječnik će Vam obaviti krvne pretrage kako bi pronašao najbolju dozu, kako bi vidio kako odgovarate na liječenje, te ima li Ruksolitinib Sandoz neželjeni učinak. Liječnik će Vam možda trebati prilagoditi dozu ili prekinuti liječenje. Vaš liječnik će pažljivo provjeriti imate li bilo kakve znakove ili simptome infekcije prije započinjanja i tijekom liječenja lijekom Ruksolitinib Sandoz.

Mijelofibroza

- Odrasli: Preporučena početna doza je 5 do 20 mg dvaput na dan. Najveća doza je 25 mg dvaput na dan.

Policitemija vera

- Odrasli: Preporučena početna doza je 10 mg dvaput na dan. Najveća doza je 25 mg dvaput na dan.

Akutna i kronična bolest presatka protiv primatelja

- Djeca u dobi od 6 do manje od 12 godina: Preporučena početna doza je 5 mg dvaput na dan.
- Djeca u dobi od 12 i više godina i odrasli: Preporučena početna doza je 10 mg dvaput na dan.

Ako imate poteškoća s gutanjem cijele tablete te za djecu mlađu od 6 godina, dostupni su drugi, prikladniji farmaceutski oblici lijeka drugog nositelja odobrenja.

Ruksolitinib Sandoz trebate uzimati svaki dan u isto vrijeme, bilo uz obrok ili bez obroka.

Liječnik će Vam uvijek reći koliko točno tableta lijeka Ruksolitinib Sandoz trebate uzeti.

Trebate nastaviti uzimati Ruksolitinib Sandoz dokle god Vam liječnik to kaže.

Ako uzmete više lijeka Ruksolitinib Sandoz nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više lijeka Ruksolitinib Sandoz nego što Vam je liječnik propisao, odmah se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili uzeti Ruksolitinib Sandoz

Ako ste zaboravili uzeti Ruksolitinib Sandoz jednostavno uzmite sljedeću dozu u planirano vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Većina nuspojava lijeka Ruksolitinib Sandoz blage je do umjerene prirode i općenito nestane nakon nekoliko dana do nekoliko tjedana liječenja.

Mijelofibroza i policitemija vera

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Odmah zatražite liječničku pomoć prije uzimanja sljedeće doze prema rasporedu ako osjetite sljedeće ozbiljne nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- bilo koji znak krvarenja u želucu ili crijevima, kao što su crna ili krvava stolica ili povraćanje krvi
- neočekivano stvaranje modrica i/ili krvarenje, neuobičajen umor, nedostatak zraka tijekom fizičke aktivnosti ili u mirovanju, neuobičajeno blijeda koža ili česte infekcije (mogući simptomi poremećaja krvi)
- bolni kožni osip s mjehurićima (mogući simptomi herpesa zostera)
- vrućica, zimica ili drugi simptomi infekcije
- niska razina eritrocita (*anemija*), niska razina leukocita (*neutropenija*) ili niska razina trombocita (*trombocitopenija*).

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- bilo koji znak krvarenja u mozgu, kao što je iznenadna promjena razine svijesti, ustrajna glavobolja, utrnulost, trnci, slabost ili paraliza.

Druge nuspojave

Druge moguće nuspojave uključuju one navedene u nastavku. Ako primijetite te nuspojave, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Vrlo česte (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- visoka razina kolesterola ili masnoća u krvi (*hipertrigliceridemija*)
- odstupanja u rezultatima pretraga jetrene funkcije
- omaglica
- glavobolja
- infekcije mokraćnog sustava
- porast tjelesne težine
- vrućica, kašalj, otežano ili bolno disanje, piskanje, bol u prsnoj koži prilikom disanja (mogući simptomi upale pluća)
- visoki krvni tlak (*hipertenzija*), koji također može uzrokovati omaglicu i glavobolje zatvor
- visoka razina lipaze u krvi.

Česte (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- smanjen broj sve tri vrste krvnih stanica - crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i trombocita (*pancitopenija*)
- učestali vjetрови (*nadutost*).

Manje česte (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- tuberkuloza
- ponovna infekcija hepatitisom B (što može uzrokovati žutilo kože i očiju, tamnosmeđu mokraću, bolove u trbuhu s desne strane, vrućicu i osjećaj mučnine ili povraćanje).

Bolest presatka protiv primatelja (engl. *graft versus host disease*, GvHD)

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Odmah zatražite liječničku pomoć prije uzimanja sljedeće doze prema rasporedu ako osjetite sljedeće ozbiljne nuspojave:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- znakovi infekcija s vrućicom povezani s:
 - bolovima u mišićima, crvenilom kože i/ili poteškoćama s disanjem (infekcija citomegalovirusom)
 - bolovima kod mokrenja (infekcija mokraćnog sustava)
 - ubrzanim otkucajima srca, smetenošću i ubrzanim disanjem (sepsa, koja je stanje povezano s infekcijom i raširenom upalom)
- učestale infekcije, vrućica, zimica, grlobolja ili čirevi u ustima
- spontano krvarenje ili stvaranje modrica - mogući simptomi trombocitopenije koju uzrokuju niske razine trombocita.

Druge nuspojave

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):

- glavobolja
- visoki krvni tlak (*hipertenzija*)
- odstupanja u rezultatima pretraga krvi, uključujući:
 - visoku razinu lipaze i/ili amilaze
 - visoku razinu kolesterola
 - odstupanja pretraga jetrenih funkcija
 - povišenu razinu enzima iz mišića (povišena kreatin fosfokinaza u krvi)
 - povišenu razinu kreatinina, enzima koji može ukazivati da Vaši bubrezi ne rade kako treba
 - niske razine svih triju vrsta krvnih stanica: crvenih krvnih stanica, bijelih krvnih stanica i trombocita (*pancitopenija*)
- mučnina
- umor, blijeda koža - mogući simptomi anemije koju uzrokuje niska razina crvenih krvnih stanica.

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- vrućica, bolovi u mišićima, bol ili poteškoće kod mokrenja, zamagljen vid, kašalj, prehlada ili poteškoće s disanjem - mogući simptomi infekcije BK virusom
- porast tjelesne težine
- zatvor.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ruksolitinib Sandoz

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ruksolitinib Sandoz sadrži

- Djelatna tvar je ruksolitinib
- Jedna tableta sadrži 5 mg, 10 mg, 15 mg ili 20 mg ruksolitiniba (u obliku ruksolitinibklorida).
- Drugi sastojci su: laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza (PH 101) (E 460), povidon (K29/32), hidroksipropilceluloza (E 463), natrijev škroboglikolat (vrste A), mikrokristalična celuloza (PH 102) (E 460), koloidni bezvodni silicijev dioksid i magnezijev stearat

Kako Ruksolitinib Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja

Ruksolitinib Sandoz 5 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „C24“ na jednoj strani.

Ruksolitinib Sandoz 10 mg tablete su bijele do gotovo bijele, okrugle, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „C25“ na jednoj strani.

Ruksolitinib Sandoz 15 mg tablete su bijele do gotovo bijele, ovalne, bikonveksne tablete, s utisnutom oznakom „C26“ na jednoj strani.

Ruksolitinib Sandoz 20 mg tablete su bijele do gotovo bijele, bikonveksne tablete oblika kapsule, s utisnutom oznakom „C27“ na jednoj strani.

Ruksolitinib Sandoz tablete dolaze u blisterima koji sadrže 14, 28, 56, 60, 140 ili 168 tableta ili u perforiranim blisterima s jediničnom dozom koji sadrže 14x1, 28x1, 56x1, 60x1, 140x1 ili 168x1 tabletu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Republika Hrvatska

Proizvođač

Coripharma ehf., Reykjavíkurvegur 78 – 80, 220 Hafnarfjörður, Island
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova Ulica 57, 1526, Ljubljana, Slovenija

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	Ruxolitinib 1A Pharma 5 mg – Tabletten
	Ruxolitinib 1A Pharma 10 mg – Tabletten
	Ruxolitinib 1A Pharma 15 mg – Tabletten
	Ruxolitinib 1A Pharma 20 mg - Tabletten
Belgija	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tabletten
Bugarska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tablets
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tablets
Cipar	Ruxolitinib/Sandoz
Češka	Ruxolitinib Sandoz
Danska	Ruxolitinib Sandoz
Estonija	Ruxolitinib Sandoz
Finska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tabletti
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tabletti
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tabletti
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tabletti
Francuska	RUXOLITINIB SANDOZ 5 mg, comprimé
	RUXOLITINIB SANDOZ 10 mg, comprimé
	RUXOLITINIB SANDOZ 15 mg, comprimé
	RUXOLITINIB SANDOZ 20 mg, comprimé
Grčka	Ruxolitinib/Sandoz
Irska	Ruxolitinib Rowex 5 mg tablets
	Ruxolitinib Rowex 10 mg tablets
	Ruxolitinib Rowex 15 mg tablets
	Ruxolitinib Rowex 20 mg tablets
Island	Ruxolitinib Sandoz
Litva	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tabletės
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tabletės
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tabletės
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tabletės
Latvija	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tabletes
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tabletes
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tabletes
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tabletes
Mađarska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tableta
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tableta
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tableta
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tableta
Malta	Ruxolitinib Sandoz 5 mg tablets
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg tablets
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg tablets
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg tablets
Nizozemska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg, tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg, tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg, tabletten
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg, tabletten
Norveška	Ruxolitinib Sandoz

Njemačka	Ruxolitinib - 1 A Pharma 5 mg Tabletten
	Ruxolitinib - 1 A Pharma 10 mg Tabletten
	Ruxolitinib - 1 A Pharma 15 mg Tabletten
	Ruxolitinib - 1 A Pharma 20 mg Tabletten
Poljska	Ruxolitinib Sandoz
Rumunjska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg comprimate
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg comprimate
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg comprimate
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg comprimate
Slovačka	Ruxolitinib Sandoz
Slovenija	Ruksolitinib Sandoz 5 mg tablete
	Ruksolitinib Sandoz 10 mg tablete
	Ruksolitinib Sandoz 15 mg tablete
	Ruksolitinib Sandoz 20 mg tablete
Španjolska	Ruxolitinib Sandoz 5 mg comprimidos EFG
	Ruxolitinib Sandoz 10 mg comprimidos EFG
	Ruxolitinib Sandoz 15 mg comprimidos EFG
	Ruxolitinib Sandoz 20 mg comprimidos EFG
Švedska	Ruxolitinib Sandoz

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2026.