

## Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

### Sinecod 7,5 mg/5 ml sirup

butamiratcitrat

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Sinecod sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sinecod sirup
3. Kako uzimati Sinecod sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Sinecod sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Sinecod sirup i za što se koristi

Sinecod sirup sadrži djelatnu tvar butamiratcitrat, koja pripada skupini lijekova za liječenje kašlja koji se zovu antitusici.

Sinecod sirup se koristi u odraslih i djece starije od 3 godine za liječenje simptoma kašlja različitog porijekla.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sinecod sirup

##### Nemojte uzimati Sinecod sirup:

- ako ste alergični na butamirat ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

##### Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sinecod sirup.

Posavjetujte se sa svojim liječnikom ako simptomi potraju ili se ne poboljšaju unutar 7 dana i/ili ako se pojave uz vrućicu, osip ili ustrajnu glavobolju.

##### Djeca i adolescenti

Nemojte davati ovaj lijek djeci mlađoj od 3 godine.

### **Drugi lijekovi i Sinecod sirup**

Budući da ovaj lijek koči refleks kašlja, mora se izbjegavati istodobna uporaba s lijekovima za iskašljavanje (ekspektoransima) jer to može uzrokovati zadržavanja sluzi u Vašem dišnom sustavu i time povećati rizik od stezanja i infekcije dišnih puteva.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

### **Trudnoća, dojenje i plodnost**

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Lijek se tijekom trudnoće smije primijeniti samo ako je neophodno, po preporuci liječnika.

Nije poznato izlučuje li se ovaj lijek u majčino mlijeko, stoga se posavjetujte s liječnikom koji će pažljivo razmotriti korist liječenja za Vas te moguće rizike za dojenče.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Sinecod sirup, u rijetkim slučajevima, u nekih ljudi može izazvati izrazitu pospanost. U tom slučaju morate biti oprezni prilikom upravljanja vozilima i rada na strojevima.

### **Važne informacije vezane uz učinak nekih pomoćnih tvari**

Sinecod sirup sadrži:

- sorbitol (E420): sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šećere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, savjetujte se s liječnikom prije nego Vi (ili Vaše dijete) primite (primi) ovaj lijek. Sorbitol može izazvati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak.
- etanol: ovaj lijek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.
- natrij: ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi od 5 ml, tj. zanemarive količine natrija.

## **3. Kako uzimati Sinecod sirup**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

### **Primjena u djece i adolescenata:**

- Djeca od 3 do 6 godina starosti: 5 ml 3 puta dnevno.
- Djeca od 6 do 12 godina starosti: 10 ml 3 puta dnevno.
- Djeca starija od 12 godina (adolescenti): 15 ml 3 puta dnevno.

### **Odrasli:**

- 15 ml 4 puta dnevno.

Upotrijebite najmanju dozu koja Vam je dovoljna za liječenje simptoma, a lijek koristite kroz najkraće potrebno vrijeme.

Ovaj lijek se primjenjuje kroz usta. Isperite i posušite odmjernu čašicu nakon svake uporabe i između različitih korisnika.

#### **Ako uzmete više Sinecod sirupa nego što ste trebali**

Ako uzmete više lijeka nego što ste trebali, odmah obavijestite liječnika. Mogu se pojaviti simptomi kao što su izrazita pospanost, mučnina, povraćanje, proljev, omaglica i pad krvnog tlaka.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Sinecod sirup**

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

#### **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

U rijetkim slučajevima (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba) može doći do sljedećih nuspojava:

- izrazita pospanost
- mučnina i proljev
- koprivnjača.

Ove nuspojave bi se trebale povući nakon smanjenja doze ili prestanka uzimanja lijeka.

Ako se ne povuku, prestanite uzimati Sinecod sirup i potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

#### **5. Kako čuvati Sinecod sirup**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nikada nemojte vraćati ostatak sirupa iz čašice natrag u bocu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

#### **6. Sadržaj pakiranja i druge informacije**


### Što Sinecod sirup sadrži?

- Djelatna tvar je butamiratcitrata.  
5 ml sirupa sadržava 7,5 mg butamiratcitrata.
- Pomoćne tvari su sorbitol, tekući, nekristalizirajući (E420); glicerol (E422); saharinnatrij; benzoatna kiselina (E210); vanilin; etanol (96%-tni); natrijev hidroksid (30%-tni); voda, pročišćena.

### Kako Sinecod sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Sinecod sirup je bistra, bezbojna do smečkastožuta tekućina, s aromom vanilije, slatka i blago gorka.

200 ml sirupa u smeđoj staklenoj boci sa zaštitnim poklopcem i plastičnom odmjernom čašicom smještenom na čepu, u kutiji.



### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

#### Nositelj odobrenja:

Haleon Hungary Kft., Csörsz u. 43, 1124 Budimpešta, Mađarska

#### Proizvođač:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG  
Barthstraße 4, 80339 München  
Njemačka

#### Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.  
Srebrnjak 61  
10 000 Zagreb  
Tel: 01 23 96 900

#### Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji put revidirana u svibnju 2024.**