

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Strepsils 0,6 mg/1,2 mg pastile bez šećera s okusom jagode

amilmetakrezol
2,4-diklorbenzilni alkohol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode
3. Kako uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode i za što se koriste

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode sadrže dvije djelatne tvari - amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina. Polagano otapanje pastile u ustima omogućuje djelovanje djelatnih tvari u području infekcije te pomaže podmazivanju i umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode prikladne su za primjenu u osoba koje boluju od šećerne bolesti (dijabetesa).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

Nemojte uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- djeca mlađa od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Djeca

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nisu poznate značajne interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim razdobljima ne preporučuje.

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode se ne smiju koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

- Jedna pastila sadrži 458 mg maltitola (E965) i 1830 mg izomalta (E953). Izomalt i maltitol mogu imati blagi laksativni učinak. Kalorijska vrijednost maltitola i izomalta je 2,3 kcal/g. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
- Jedna pastila sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija, tj. zanemarive količine natrija.
- Jedna pastila sadrži 7,30 mg propilen glikola (E1520).
- Jedna pastila sadrži 0,0028 mg benzilnog alkohola. Benzilni alkohol može uzrokovati alergijske reakcije. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet ako ste trudni ili dojite, ili ako imate bolesti jetre ili bubrega jer se velike količine benzilnog alkohola mogu nakupiti u Vašem tijelu i uzrokovati nuspojave (zване “metabolička acidoza”).

3. Kako uzimati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Za ublažavanje simptoma lijek je potrebno primijeniti kratkotrajno u najnižim učinkovitim dozama!

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Odrasli i djeca starija od 6 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 12 pastila tijekom 24 sata. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Ako uzmete više Strepsils pastila bez šećera s okusom jagode nego što ste trebali

Veća količina lijeka može izazvati nelagodu u želucu i crijevima. U tom slučaju prestanite uzimati ovaj lijek.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Učestalost niže navedenih nuspojava je nepoznata, odnosno ne može se procijeniti iz dostupnih podataka:

- preosjetljivost (reakcije preosjetljivosti mogu se pojaviti u obliku osipa, angioedema (oticanje lica, jezika i dušnika koje uzrokuje velike poteškoće u disanju koje su znak teške alergijske reakcije), urtikarije (koprivnjača), bronhospazama (otežano disanje) i hipotenzija (nizak tlak) sa sinkopom (nesvjestica)),

- bol u trbuhu, mučnina, nelagoda u ustima (nelagoda u ustima može se pojaviti u obliku iritacije grla, oralne parestezije (neuobičajeni/poremećeni osjećaj u ustima), edema (oticanja) usta i glosodinije (poremećaj osjeta i boli u jeziku)).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode**

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. **Sadržaj pakiranja i druge informacije**

Što Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode sadrže

Djelatne tvari su amilmetakrezola i 2,4-diklorbenzilnog alkohola.
Jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola i 2,4-diklorbenzilnog alkohola.

Pomoćne tvari su: aroma jagode (sadrži propilen glikol E1520 i benzilni alkohol), boja Pink Antho P-WS (E163), saharinnatrij (E954), tartaratna kiselina, izomalt (E953) i maltitol (E965). Vidjeti dio 2 za važne informacije uz: propilen glikol, benzilni alkohol, natrij, izomalt i maltitol.

Kako Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode izgledaju i sadržaj pakiranja

Strepsils pastile bez šećera s okusom jagode su ružičaste, okrugle pastile karakterističnog okusa jagode, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

Proizvođači

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2022.