

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Strepsils Plus 0,6 mg/1,2 mg/10 mg pastile

amilmetakrezol
2,4-diklorbenzilni alkohol
lidokainklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su Strepsils Plus pastile i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils Plus pastile
3. Kako uzimati Strepsils Plus pastile
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Strepsils Plus pastile
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Strepsils Plus pastile i za što se koriste

Strepsils Plus pastile sadrže tri djelatne tvari - amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i lidokainklorid.

Amilmetakrezol i 2,4-diklorbenzilni alkohol su antiseptici koji imaju blago djelovanje kojim suzbijaju bakterije, uzročnike infekcija usne šupljine i ždrijela. Lidokainklorid je lokalni anestetik koji brzo ublažava grlobolju.

Strepsils Plus pastile namijenjene su za ublažavanje simptoma infekcija usne šupljine i ždrijela, uključujući jaku grlobolju u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina. Polagano otapanje pastile u ustima omogućuje djelovanje djelatnih tvari u području infekcije te pomaže podmazivanju i umirivanju bolnog područja. Time se ublažava bol i nelagoda kod infekcije usne šupljine i ždrijela.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Strepsils Plus pastile

Nemojte uzimati Strepsils Plus pastile:

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- djeca mlađa od 12 godina
- ako u anamnezi imate alergiju na lokalne anestetike
- ako u anamnezi imate methemoglobinemiju, ili postoji sumnja da je imate
- ako bolujete od astme ili bronhospazma.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Strepsils Plus pastile.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Djeca

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Drugi lijekovi i Strepsils Plus pastile

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

U teoriji su moguće interakcije s lidokainom, no nisu vjerojatne kod lijeka koji se primjenjuje lokalno, kao ovaj lijek.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Sigurnost uporabe ovog lijeka u trudnoći i za vrijeme dojenja nije utvrđena, stoga se primjena u tim razdobljima ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka

- Jedna pastila sadrži 980 mg glukoze i 1523 mg saharoze. O tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti (dijabetesom). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.
- Jedna pastila sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po pastili, tj. zanemarive količine natrija.
- Jedna pastila ne sadrži više od 19,60 mikrograma glutena. Ovaj lijek sadrži samo vrlo nisku razinu glutena (iz pšeničnog škroba koji je prisutan u tekućoj glukozu). Smatra se da je „bez glutena” i malo je vjerojatno da će uzrokovati probleme ako imate celijakiju. Ako imate alergiju na pšenicu (što je stanje koje je različito od celijakije) ne smijete uzimati ovaj lijek.
- Ovaj lijek sadrži sulfite (sumporov dioksid E220 koji je prisutan u tekućoj glukozu) što rijetko može uzrokovati teške reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.
- Ovaj lijek sadrži eterična ulja s anizilnim alkoholom, d-limonenom i linaloolom koji mogu uzrokovati alergijske reakcije.
- Ovaj lijek sadrži eterično ulje paprene metvice. Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju (kila na želucu) ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon uzimanja eteričnog ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

3. Kako uzimati Strepsils Plus pastile

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Za ublažavanje simptoma lijek je potrebno primijeniti kratkotrajno u najnižim učinkovitim dozama.

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

Jednu pastilu polako otopiti u ustima svaka 2 do 3 sata, do najviše 8 pastila tijekom 24 sata.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu lijeka.

Starije osobe

Nije potrebno smanjenje doze kod starijih osoba.

Lijek nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Obratite se liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Primjena u djece

Lijek se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina.

Ako uzmete više Strepsils Plus pastila nego što ste trebali

Veća količina lijeka može izazvati prekomjerni gubitak osjeta (anesteziju) u gornjem dijelu probavnog trakta te želučano-crijevnu nelagodu. Međutim, trovanje lidokainom može dovesti do ozbiljnog sniženja krvnog tlaka, asistole, usporenog rada srca, apneje, napadaja, kome, zastoja srca i disanja te smrti.

Ako tegobe ne prestaju, molimo Vas da se javite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Strepsils Plus pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom Strepsils Plus pastila, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Učestalost niže navedenih nuspojava je nepoznata, odnosno ne može se procijeniti iz dostupnih podataka:

- methemoglobinemija (poremećaj krvi),
- bol u trbuhu, mučnina, nelagoda u ustima (nelagoda u ustima može se pojaviti u obliku iritacije grla, oralne parestezije (neuobičajeni/poremećeni osjećaj u ustima), edema (oticanja) usta i glosodinije (poremećaj osjeta i boli u jeziku),
- preosjetljivost (reakcije preosjetljivosti mogu se javiti u obliku osipa, angioedema (oticanje lica, jezika i dušnika koje uzrokuje velike poteškoće u disanju koje su znak teške alergijske reakcije), urtikarije (koprivnjača), bronhospazma (otežano disanje) i hipotenzije (nizak tlak) sa sinkopom (nesvjestica)).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Strepsils Plus pastile

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi do 25 °C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Neiskorišteni lijek kao i druge lijekove ili otpadni materijal nikada nemojte bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako zbrinuti na siguran način lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Strepsils Plus pastile sadrže

Djelatne tvari su: amilmetakrezol, 2,4-diklorbenzilni alkohol i lidokainklorid.

Jedna pastila sadrži 0,6 mg amilmetakrezola, 1,2 mg 2,4-diklorbenzalnog alkohola i 10 mg lidokainklorida.

Pomoćne tvari su: tartaratna kiselina, saharinnatrij, levomentol, eterično ulje paprene metvice (sadrži d-limonen), eterično ulje zvjezdastog anisa (sadrži anizilni alkohol, d-limonen i linalool), boja Quinoline Yellow (E104), boja Indigo Carmine (E132), tekuća saharoza i tekuća glukoza. Vidjeti dio 2 za važne informacije uz: glukozu, saharozu, natrij (iz saharinnatrija i boja indigokarmin i kinolin žuta), gluten, pšenični škrob i sumporov dioksid E220 (iz tekuće glukoze) te anizilni alkohol, d-limonen, linalool i eterično ulje paprene metvice.

Kako Strepsils Plus pastile izgledaju i sadržaj pakiranja

Strepsils Plus pastile su blijedo plavo-zelene, okrugle pastile, sa zaštitnim znakom utisnutim na obje strane pastile.

Pakirane su po 12 pastila u blisteru, u 2 blistera, u kartonskoj kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.

Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb

Proizvođači

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u listopadu 2022.