

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Streptusan bršljan sirup

suhu ekstrakt bršljanovog lista

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Streptusan bršljan sirup i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan bršljan sirup
3. Kako uzimati Streptusan bršljan sirup
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Streptusan bršljan sirup
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Streptusan bršljan sirup i za što se koristi

Streptusan bršljan sirup je biljni lijek koji se primjenjuje kao ekspektorans kod produktivnog kašlja.

Streptusan bršljan sirup je indiciran kod odraslih, adolescenata i djece od 2 godine starosti.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Streptusan bršljan sirup

Nemojte uzimati Streptusan bršljan sirup

- ako ste alergični na suhi ekstrakt bršljanovog lista, druge biljke iz porodice bršljana (lat. *Araliaceae*) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Nemojte davati Streptusan bršljan sirup djeci mlađoj od 2 godine jer može doći do pogoršanja dišnih simptoma (npr. kratkoća daha, poteškoće kod disanja, kašljivanje ili piskanje).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Streptusan bršljan sirup:

- ako bolujete od gastritisa ili čira na želucu.

Ako se dispneja, vrućica ili gnojna ili krvava sluz pojave prije ili tijekom uzimanja ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Pri pojavi prvih znakova teških alergijskih reakcija, odmah prestanite uzimati ovaj lijek i obratite se liječniku (pogledajte dio 4.).

Primjena kod bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega i/ili jetre

Ako bolujete od zatajenja bubrega ili oštećenja funkcije jetre, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije uzimanja Streptusan bršljan sirupa. Podaci o preporučenoj dozi nisu ustanovljeni u ovih bolesnika.

Djeca

Ovaj lijek ne smije se primjenjivati u djece mlađe od 2 godine. Pogledajte dio „Nemojte uzimati Streptusan bršljan sirup“.

Djeca u dobi od 2 do 4 godine s dugotrajnim ili ponavljačim kašljem zahtijevaju postavljanje medicinske dijagnoze prije liječenja.

Drugi lijekovi i Streptusan bršljan sirup

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nije prijavljeno da Streptusan bršljan sirup utječe na učinak drugih lijekova.
Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Sigurnost tijekom trudnoće nije utvrđena. Zbog nedostatka odgovarajućih podataka, ne preporučuje se primjena Streptusan bršljan sirupa tijekom trudnoće.

Dojenje

Nije poznato izlučuje li se djelatna tvar ili njeni metaboliti u majčino mlijeko. Ne može se isključiti rizik za dojenče. Stoga se Streptusan bršljan sirup ne smije koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja o učincima lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Streptusan bršljan sirup sadrži sorbitol

Ovaj lijek sadrži do 469 mg sorbitola u 1 ml sirupa.

Sorbitol je izvor fruktoze. Ako Vam je liječnik rekao da Vi (ili Vaše dijete) ne podnosite (podnosi) neke šćere ili ako Vam je dijagnosticirano nasljedno nepodnošenje fruktoze, rijetki nasljedni poremećaj kod kojeg bolesnik ne može razgraditi fruktozu, obratite se liječniku prije nego Vi (ili Vaše dijete) uzmete (uzme) ovaj lijek.

Sorbitol može uzrokovati nelagodu u probavnom sustavu i blagi laksativni učinak kod djece.

3. Kako uzimati Streptusan bršljan sirup

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Adolescenti u dobi od 12 godina, odrasli i stariji:

6 ml sirupa dva puta dnevno (što odgovara 99 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista dnevno)

Djeca u dobi od 6 do 11 godina:

4 ml sirupa dva puta dnevno (što odgovara 66 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista dnevno)

Djeca u dobi od 2 do 5 godina:

2 ml sirupa dva puta dnevno (što odgovara 33 mg suhog ekstrakta bršljanovog lista dnevno)

Primjena u djece

Djeca u dobi od 2 do 4 godine s dugotrajnim ili ponavljajućim kašljem zahtijevaju postavljanje medicinske dijagnoze prije liječenja.

Primjena u djece mlađe od 2 godine je kontraindicirana (pogledajte dio „Nemojte uzimati Streptusan bršljan sirup“).

Primjena u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega i/ili jetre

Molimo pogledajte dio 2.

Način primjene

Za primjenu kroz usta.

Primijenite priloženu odmjernu žlicu s oznakama od 2 i 4 ml.

Preporučeno je dozu od 6 ml primijeniti s punom odmjernom žlicom (4 ml) + polovicom odmjerne žlice (2 ml).

Dobro protresite bočicu prije uporabe.

Trajanje liječenja

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje, ako se osjećate lošije ili ako se simptomi ne povuku nakon 7 dana.

Ako uzmete više Streptusan bršljan sirupa nego što ste trebali

Unos doza većih od preporučenih može izazvati mučninu, povraćanje, proljev i uznemirenost. Ako uzmete više Streptusan bršljan sirupa nego što biste trebali, obratite se liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Streptusan bršljan sirup

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadjili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Nuspojave koje se mogu pojaviti prilikom liječenja Streptusan bršljan sirupom:

Učestalost je nepoznata (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

- reakcije probavnog sustava kao što su mučnina, povraćanje i proljev
- alergijske reakcije kao što su urtikarija, kožni osip, otežano disanje i anafilaktička reakcija

Pri pojavi prvih znakova ozbiljne alergijske reakcije, odmah prekinite uzimanje ovog lijeka i obratite se liječniku.

Ako se pojave druge nuspojave koje nisu prethodno navedene, potrebno je potražiti savjet liječnika ili ljekarnika.

Prijavljivanje sumnji na nuspojavu

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Streptusan bršljan sirup

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja u originalno zatvorenom pakiranju.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25 °C nakon prvog otvaranja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek se može upotrebljavati 3 mjeseca nakon prvog otvaranja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Streptusan bršljan sirup sadrži

- Djetalna tvar je suhi ekstrakt bršljanovog lista. Svaki ml lijeka sadrži 8,25 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz *Hedera helix* L., folium (bršljanov list) (4-8:1). Ekstrakcijsko otapalo: etanol 30% m/m.
- Pomoćne tvari su: tekući sorbitol (nekristalizirajući) (E420), kalijev sorbat (E202), ksantanska guma (E415), citratna kiselina (E330), pročišćena voda.

Kako Streptusan bršljan sirup izgleda i sadržaj pakiranja

Streptusan bršljan sirup je smeđa, opalescentna tekućina slatkog okusa i mogućom malom količinom taloga.

Sirup se puni u smeđu staklenu bočicu s bijelim plastičnim (polietilenskim) zatvaračem s navojem. Bočica je pakirana u kartonsku kutiju zajedno s odmjernom žlicom (izrađena od polipropilena s oznakama od 2 i 4 ml).

Veličina pakiranja: 100 ml, 200 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Reckitt Benckiser d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269d
10000 Zagreb
Hrvatska

Proizvođač

Phytopharm Kleka S.A.
Ul. Kleka 1 Kleka
63-040 Nowe Miasto Nad Warta
Poljska

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija	StrepHustan Efeu Hustenlöser 8,25 mg/ml Sirup
Belgija	Streptuss klimop siroop
Bugarska	StrepTuss Active Naturals Ivy 8.25 mg/ml syrup СтрепТус Актив Нечъралс Бършлян 8.25 mg/ml сироп
Češka	Strevox s břečťanem
Njemačka	Dobendant Hustenlöser
Danska	StrepHost Muco
Grčka	StrepCough Ivy
Estonija	Starkspept
Španjolska	Streptos hiedra 8,25 mg/ml jarabe

Francuska	STREPSILS EXPECTORANT LIERRE 8,25 mg/ml, sirop
Hrvatska	Streptusan bršljan sirup
Mađarska	StrepTuss borostyán 8,25 mg/ml szirup
Island	StrepHost Muco
Italija	Benactuss Tosse grassa
Litva	Starkspept
Latvija	Starkspept
Nizozemska	Streptuss klimop siroop
Norveška	Strepmuco
Poljska	Strepsils Natur kaszel mokry
Portugal	Streptosse Active Naturals Tosse Produtiva, xarope
Rumunjska	StrepTuss iederă 8,25 mg/ml sirop
Švedska	Strepmuco
Slovenija	Bršljan Streptusan sirup
Slovačka	Strevox s brečtanom

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u lipnju 2024.