

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Sulpirid Grindeks 50 mg tablete
Sulpirid Grindeks 100 mg tablete
Sulpirid Grindeks 200 mg tablete

sulpirid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Sulpirid Grindeks i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sulpirid Grindeks
3. Kako uzimati Sulpirid Grindeks
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Sulpirid Grindeks
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sulpirid Grindeks i za što se koristi

Sulpirid Grindeks sadrži lijek imena sulpirid. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju „atipični antipsihotični lijekovi“ koji djeluju na mozak da smire bolesnike koji su uznemireni te povratu normalno ponašanje.

Sulpirid Grindeks se koristi u liječenju odraslih osoba s:

- depresivnim poremećajima s psihotičnim simptomima, kada liječenje antidepresivima nije uspješno, te za liječenje drugih teških oblika depresije koji su otporni na antidepresive;
- akutnim i kroničnim oblicima šizofrenije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sulpirid Grindeks

Nemojte uzimati Sulpirid Grindeks:

- Ako ste alergični na sulpirid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- U slučaju akutnog trovanja alkoholom, tabletama za spavanje, analgeticima (opijatima) i psihotropne intoksikacije.
- U slučaju maničnih psihoza.
- U slučaju psihosindroma organskog porijekla: bolesti mozga s organskim uzrokom koje obično uzrokuju uznemirenost, pogotovo u starijoj populaciji.
- Kod Parkinsonove bolesti.
- Sulpirid se ne smije koristiti u kombinaciji s levodopom (pogledajte dio Drugi lijekovi i Sulpirid Grindeks).
- Ako imate napadaje (npr. epilepsija).
- Ako imate tumor nadbubrežne žlijezde koji se naziva feokromocitom.
- Ako imate razinu hormona prolaktina u krvi višu od normalne (hiperprolaktinemija).
- Ako imate hormonski ovisan tumor, na primjer rak hipofize ili rak dojke.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako se išta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete ovaj lijek.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Sulpirid Grindeks.

Sulpirid Grindeks djeluje ovisno o upotrijebljenoj dozi. Stoga morate uzeti lijek točno onako kako Vam je savjetovao Vaš liječnik.

Kao i kod ostalih neuroleptika (antipsihotični lijekovi), zabilježeni su rijetki slučajevi potencijalno fatalnog „neuroleptičkog malignog sindroma“ (pogledajte dio 4). Ako primijetite bilo kakav neobjašnjivi porast tjelesne temperature, bljedilo, pretjerano znojenje ili ukočenost mišića, morate se **odmah javiti svom liječniku ili u bolnicu.**

Provjerite s Vašim liječnikom prije nego uzmete ovaj lijek ako:

- imate akutnu porfiriju (rijetka nasljedna metabolička bolest)
- imate niske razine kalija u tijelu (hipokalemija);
- imate problema sa srcem ili srčane probleme u obiteljskoj povijesti. Vaš liječnik će možda provjeriti rad Vašeg srca prije uzimanja ovog lijeka;
- imate povišen ili snižen krvni tlak;
- imate problema s jetrom ili bubrezima;
- imate visoku razinu šećera u krvi;
- imate povećanu prostatu;
- imate povijest glaukoma, crijevne opstrukcije, urođene probavne stenoze, zadržavanja mokraće, jer sulpirid ima antikolinergijsko djelovanje;
- Vi ili netko u Vašoj obitelji ima povijest krvnih ugrušaka, jer lijekovi poput ovog su povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka (pogledajte dio 4);
- Vi ili netko u Vašoj obitelji ima povijest raka dojke.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, provjerite s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja Sulpirid Grindeks tableta.

Kod bolesnika s demencijom je uočen povećan rizik od cerebrovaskularnih poremećaja (poremećaji krvnih žila u mozgu), stoga se u bolesnika s čimbenicima rizika od moždanog udara sulpirid treba uzimati s oprezom.

Agresivno, uznemireno i uzbuđeno ponašanje se ponekad može pogoršati.

Stariji bolesnici s demencijom ovaj lijek trebaju uzimati s oprezom (pogledajte dio 4).

Poremećaji kretanja su prijavljeni u malom broju slučajeva (pogledajte dio 4).

Slučajevi konvulzija su prijavljeni, ponekad kod bolesnika bez prethodne povijesti.

Prijavljeni su leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica zvanih leukociti), neutropenija (smanjenje broja vrste bijelih krvnih stanica zvanih neutrofili) i agranulocitoza (smanjenje vrste bijelih krvnih stanica zvanih granulociti) s antipsihoticima, uključujući sulpirid. Infekcije ili vrućica nepoznatog podrijetla mogu biti dokaz promjena u krvnoj slici i zahtijevaju žurnu hematološku obradu.

Djeca i stariji bolesnici će vjerojatnije razviti nuspojave.

Stariji bolesnici su podložniji posturalnoj hipotenziji (vrtoglavica ili omaglica prilikom ustajanja), sedaciji i ekstrapiramidnim učincima. Prilagođavanje doze može biti potrebno kod starijih (pogledajte dio 3).

Potrebno je izbjegavati istodobno uzimanje sulpirida i alkohola.

Djeca

Nije ustanovljena sigurnost i djelotvornost lijeka Sulpirid Grindeks u djece. Nema dostupnih podataka. Stoga se ne preporučuje uzimanje sulpirida u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Sulpirid Grindeks

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta.

Sulpirid Grindeks može utjecati na način kako neki lijekovi djeluju. Također, neki lijekovi mogu utjecati na način na koji Sulpirid Grindeks djeluje.

Nemojte uzimati i obavijestite svog liječnika ako uzimate:

- levodopu (koristi se za Parkinsonovu bolest).

Posebno obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- antiparkinsonike tj. lijekove za uklanjanje ili ublažavanje simptoma Parkinsonove bolesti (uključujući ropinirol);
- lijekove za kontroliranje Vašeg srčanog ritma (kinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol);
- lijekove za povišeni krvni tlak ili poremećaje rada srca (beta blokatori, diltiazem, verapamil, klonidin, guanfacin, glikozidi digitalisa (na primjer digoksin));
- tablete za mokrenje (diuretici) koji mogu sniziti razinu kalija u krvi;
- laksative (lijekovi za zatvor) koji mogu sniziti razinu kalija u krvi;
- glukokortikoide (koriste se za ublažavanje upala, na primjer prednizolon);
- tetrakosaktide (koriste se za ispitivanje funkcije nadbubrežne žlijezde);
- pentamidin, sparfloksacin, intravenski amfotericin B, intravenski eritromicin (koriste se za liječenje infekcija);
- druge antipsihotične lijekove kao što su pimozid, sultoprid, haloperidol, tioridazin;
- metadon (koristi za ublažavanje boli i kao zamjena za lijek);
- bepridil (koristi se za liječenje kronične angine pektoris), cisaprid (koristi se za liječenje poremećaja probavne pokretljivosti), vinkamin i.v. (lijevak koji može pomoći poboljšati krvotok u mozgu);
- imipramin antidepresivi (koriste se za liječenje depresije);
- halofantrin (za liječenje malarije);
- preparate litija (koriste se za liječenje manično-depresivnog poremećaja, poznatog i kao bipolarni afektivni poremećaj);
- depresore središnjeg živčanog sustava (uključujući lijekove za popuštanje boli (opiodni analgetici), sedativni H1 antihistaminici, barbiturati, benzodiazepini i drugi anksiolitici, klonidin i derivati);
- lijekovi za probavnu smetnje i žgaravicu (antacidi) te sukralfati (za čir u želucu) smanjuju probavnu apsorpciju lijeka. Stoga Sulpirid Grindeks treba primijeniti dva sata prije ovih lijekova.

Sulpirid Grindeks s hranom, pićem i alkoholom

Alkohol potencira sedacijski učinak antipsihotika. Treba izbjegavati konzumaciju alkohola i lijekova koji sadrže alkohol za vrijeme liječenja lijekom Sulpirid Grindeks.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena lijeka Sulpirid Grindeks ne preporučuje se tijekom trudnoće te u žena generativne dobi koje ne koriste pouzdane metode kontracepcije.

Sljedeći se simptomi mogu pojaviti u novorođenčadi čije su majke uzimale Sulpirid Grindeks u zadnjem

tromjesečju (zadnja tri mjeseca trudnoće): tresenje, ukočenost mišića i/ili slabost, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem, i poteškoće pri hranjenju. Ako Vaše dijete razvije bilo koji od ovih simptoma možda ćete se trebati obratiti liječniku.

Ne biste trebali dobiti za vrijeme uzimanja ovog lijeka. Razgovarajte s liječnikom o najboljem načinu hranjenja Vašeg djeteta ako morate uzimati Sulpirid Grindeks.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omamljenost, omaglicu, smetnje vida i može usporiti sposobnost reagiranja (pogledajte dio 4). Stoga treba izbjegavati rizične aktivnosti koje zahtijevaju vještinu ili pozornost (na primjer upravljanje vozilima i strojevima) za vrijeme liječenja lijekom Sulpirid Grindeks, pogotovo jer posebna osjetljivost svakog bolesnika na lijek nije ustanovljena.

Sulpirid Grindeks sadrži laktozu

Sulpirid Grindeks tablete sadrže laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Sulpirid Grindeks

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ne smijete svojevóljno mijenjati dozu ili prekinuti liječenje lijekom Sulpirid Grindeks bez savjeta liječnika. Ne prekoračujte preporučenu dozu.

Sulpirid Grindeks tablete se trebaju uzeti kroz usta.

Tableta se treba progutati cijela s dovoljnom količinom vode.

Smjernice za doziranje

Treba prilagoditi dozu i trajanje liječenja prema individualnoj reakciji bolesnika, kao i prema tipu i težini nuspojava.

Liječenje deficitarnog tipa šizofrenije

Liječenje započeti s 200 mg sulpirida na dan, podijeljeno u 2 pojedinačne doze. Uobičajena dnevna doza je 200-600 mg, podijeljena u 2 do 4 pojedinačne doze.

Liječenje produktivnog tipa šizofrenije

Liječenje započeti s 300 mg sulpirida na dan, podijeljeno u 3 pojedinačne doze. Uobičajena dnevna doza je 300-600 mg, podijeljena u 2 do 4 pojedinačne doze.

Dnevna doza od 1000 mg sulpirida, podijeljena u višestruke doze, općenito se ne smije prekoračiti.

Šizofrenija otporna na liječenje

Najviša dnevna doza od 1600 mg sulpirida može se primijeniti samo u pojedinim slučajevima i isključivo na recept psihijatra.

Akutna stanja bolesti mogu zahtijevati početno liječenje sulpiridom koji se primjenjuje parenteralno.

Na tržištu nije dostupan Sulpirid Grindeks za parenteralnu primjenu.

Liječenje depresije s psihotičnim simptomima i depresije otporne na liječenje

Liječenje započeti s 50 do 150 mg sulpirida dnevno, podijeljeno u 3 pojedinačne doze. Dnevna doza održavanja je 150 do 300 mg.

Obično nisu potrebne veće dnevne doze, ali mogu se primijeniti u pojedinim slučajevima prema procjeni liječnika.

Akutna stanja bolesti mogu zahtijevati početno liječenje sulpiridom koji se primjenjuje parenteralno.

Na tržištu nije dostupan Sulpirid Grindeks za parenteralnu primjenu.

Primjena u djece

Nije ustanovljena sigurnost i djelotvornost lijeka Sulpirid Grindeks u djece. Nema dostupnih podataka. Stoga se ne preporučuje uzimanje lijeka Sulpirid Grindeks u ovoj dobnoj skupini.

Starije osobe

Vaš liječnik Vam može propisati niže doze na početku liječenja. Liječnik zatim može postupno povećati dozu.

Kod starijih bolesnika primjenjuje se polovina gore navedene doze za odrasle.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

Kod bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega mora se primijeniti niža dnevna doza. Liječnik će prilagoditi dozu prema rezultatima laboratorijskih nalaza.

Moraju se primijeniti sljedeće smjernice za vrijednosti:

- Za klirens kreatinina 30-60 ml/min: primijeniti 50 % uobičajene dnevne doze.
- Za klirens kreatinina 10-30 ml/min: primijeniti 30 % uobičajene dnevne doze.
- Za klirens kreatinina manji od 10 ml/min: primijeniti 20% uobičajene dnevne doze.

Ako Vam se učinak ovog lijeka čini prejak ili preslab, obratite se svom liječniku.

Ako uzmete više lijeka Sulpirid Grindeks nego što ste trebali

U slučaju predoziranja primijećeni su simptomi kao što su nemir, zbunjenost, poremećena svijest nevoljno drhtanje, ukočenost ili grč mišića, nekontrolirane kretnje oka, vrata, ruke ili noge, poteškoće u govoru (nevoljni pokreti usta), uznemirenost, sniženi krvni tlak. Sniženi krvni tlak uz omaglicu, i koma se ponekad mogu javiti. Izvještaji o smrtnim ishodima su obično povezani s primjenom u kombinaciji s drugim psihotropnim lijekovima.

U slučaju predoziranja odmah se obratite liječniku! Uzmite pakiranje lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Sulpirid Grindeks

Ako ste zaboravili uzeti Vašu redovnu dozu, uzmite ju čim se sjetite. Ako je skoro vrijeme da uzmete sljedeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu. Nastavite uzimati lijek kako je propisano. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Sulpirid Grindeks

Primjena lijeka Sulpirid Grindeks se ne smije iznenada prekinuti. Ne smijete mijenjati doze ili prekinuti liječenje lijekom Sulpirid Grindeks bez liječničkog savjeta.

Nagli prekid liječenja može uzrokovati mučninu, povraćanje, znojenje, nesanicu, nemir i pojavu nevoljnih pokreta (pogledajte također dio 4). Stoga se lijek mora postupno ukinuti prema uputama Vašeg liječnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Odmah prestanite uzimati Sulpirid Grindeks tablete i potražite liječničku pomoć ako:

- primijetite neobjašnjivu veoma visoku tjelesnu temperaturu, pretjerano znojenje, bljedilo, ukočenost mišića, promijenjenu svijest, poremećaje srčanog ritma; ovo mogu biti simptomi veoma rijetkog, ali moguće fatalnog „neuroleptičkog malignog sindroma“ (pogledajte također dio *Upozorenja i mjera opreza*)
- imate krvne ugruške u venama, pogotovo u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo noge), koji mogu putovati krvnim žilama do pluća uzrokujući bol u prsima i otežano disanje. Ako primijetite bilo koji od ovih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć.

Ostale nuspojave:

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 bolesnika):

- hiperprolaktinemija (povećana koncentracija hormona prolaktina u krvi);
- nesаница (poteškoće sa spavanjem);
- sedacija ili izrazita pospanost, poremećaji kretnji, parkinsonizam, nevoljno drhtanje, stalna potreba za kretanjem;
- povišenje jetrenih enzima;
- makulopapularni osip (vrsta osipa karakterizirana ravnim, crvenim područjem na koži prekrivenim s malim konfluentnim kvržicama);
- galaktoreja (spontano ispuštanje mlijeka iz grudi), bol u prsima;
- porast tjelesne težine;
- zatvor.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 bolesnika)

- leukopenija (smanjenje broja bijelih krvnih stanica);
- povećani tonus mišića, diskinezija (nenormalni i nevoljni pokreti), distonija (mišićne kontrakcije)
- ortostatska hipotenzija (niski krvni tlak pri ustajanju);
- pojačano izlučivanje slinе;
- amenoreja (izostanak menstruacije kod plodne žene), povećanje grudi, nenormalni orgazam, impotencija.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 bolesnika)

- okulogirijske krize (kružni pokreti oka);
- ventrikularna aritmija (promjena u otkucaju srca), ventrikularna tahikardija (brzi, nenormalni otkucaji srca), ventrikularna fibrilacija.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

- promjene u krvnoj slici (agranulocitoza i neutropenija);
- anafilaktičke reakcije (ozbiljne alergijske reakcije): urtikarija (koprivnjača), dispneja (otežano disanje), hipotenzija (sniženi krvni tlak) i anafilaktički šok (ozbiljna alergijska reakcija koja može biti opasna po život);
- napadaji, neuroleptički maligni sindrom (pogledajte dio *Upozorenja i mjere opreza*), hipokinezija (smanjeno tjelesno kretanje), tardivna diskinezija (karakterizirana ritmičnim, nevoljnim pokretima prvenstveno jezika i/ili lica);
- promjene u elektrokardiogramu (produljenje QT intervala), određeni tip poremećaja srčanog ritma (*torsades de pointes*), srčani zastoje, iznenadna smrt;
- venska tromboembolija, plućna embolija (ponekad fatalna), duboka venska tromboza, i povišeni krvni tlak;
- grč mišića vilice (trismus) i vrata (tortikolis), razgradnja mišića što može dovesti do oštećenja bubrega (rabdomioliza);
- ekstrapiramidni simptomi (nevoljni pokreti), sindrom ustezanja kod novorođenčadi (pogledajte dio *Trudnoća i dojenje*);
- ginekomastija (povećanje mliječnih žlijezda kod muškaraca);
- hiponatremija (snižene razine natrija u krvi), sindrom neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH);
- zbunjenost;
- aspiracijska upala pluća (uglavnom u vezi s ostalim depresorima SŽS);
- hepatocelularna, kolestatska ili miješana ozljeda jetre;
- vrućica;
- povišenje kreatin fosfokinaze u krvi (ukazuje na oštećenje mišića).

Preosjetljivi bolesnici mogu iskusiti povećan broj otkucaja srca, nestabilni krvni tlak, omaglicu, osjećaj vrućine, osjećaj peckanja, bockanja ili obamrlost (obično na nozi ili ruci), pojačano znojenje, poremećaji mokrenja, opća slabost, zbog djelovanja sulpirida na autonomni živčani sustav.

U starijih osoba s demencijom je zabilježeno malo povećanje broja smrtnih slučajeva u bolesnika koji su primali antipsihotike u usporedbi s onima koji nisu primali antipsihotike.

Nakon naglog prekidanja liječenja lijekom Sulpirid Grindeks prijavljeni su simptomi kao što su mučnina, povraćanje, znojenje i poremećaji spavanja te povratak psihotičnih simptoma, kao i pojava poremećaja nevoljnih kretanja. Stoga je preporučljiv postupni prekid (pogledajte također *Ako prestanete uzimati Sulpirid Grindeks*).

Ako ijedna od ovih nuspojava postane ozbiljna, ili ako primijetite neku nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obratite se liječniku ili ljekarniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sulpirid Grindeks

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sulpirid Grindeks sadrži

- Djelatna tvar je sulpirid.

Jedna tableta sadrži 50 mg, 100 mg ili 200 mg sulpirida.

- Drugi sastojci su:

laktoza hidrat, metilceluloza, krumpirov škrob, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, talk.

Kako Sulpirid Grindeks izgleda i sadržaj pakiranja

50 mg: bijele ili gotovo bijele okrugle ravne tablete s kosim rubovima. Dimenzije tablete: promjer približno 6,0 mm, visina 2,1 mm.

100 mg: bijele ili gotovo bijele okrugle ravne tablete s kosim rubovima. Dimenzije tablete: promjer približno 7,0 mm, visina 3,1 mm.

200 mg: bijele ili gotovo bijele okrugle ravne tablete s kosim rubovima i jednim razdjelnim urezom na jednoj strani. Dimenzije tablete: promjer približno 10,0 mm, visina 3,1 mm. Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

PVC/Al blister.

10 tableta po blisteru. Pakiranje od 3 ili 10 blistera po kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53

Rīga, LV-1057

Latvija

Telefon: +371 67083205

Faks: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.com

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61

10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 23 96 900

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Estonija	Betamaks
Litva	Betamaks 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletės
Republika Slovačka	Betamaks 50 mg, 100 mg, 200 mg tablety
Austrija	Sulpirid Grindeks 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletten
Belgija	Sulpiride Grindeks 50 mg, 100 mg, 200 mg comprimés
Republika Češka	Sulpiride Grindeks
Njemačka	Sulpirid Grindeks 50 mg, 100 mg, 200 mg tabletten
Portugal	Sulpirida Grindeks 50 mg, 100 mg, 200 mg comprimidos

Način i mjesto izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u siječnju 2024.