

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Syreleno 2,5 mg tablete
Syreleno 5 mg tablete
Syreleno 10 mg tablete
everolimus

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Syreleno i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Syreleno
3. Kako uzimati Syreleno
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Syreleno
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Syreleno i za što se koristi

Syreleno je lijek protiv raka koji sadrži djelatnu tvar everolimus. Everolimus smanjuje dovod krvi do tumora i usporava rast i širenje tumorskih stanica.

Lijek Syreleno primjenjuje se za liječenje odraslih bolesnika sa sljedećim bolestima i stanjima:

- uznapredovali rak dojke pozitivan na hormonske receptore u žena u postmenopauzi, u kojih se drugim lijekovima (takozvanim „nesteroidnim inhibitorima aromataze”) bolest više ne može kontrolirati. Primjenjuje se zajedno s lijekom koji se zove eksemestan, a koji je steroidni inhibitor aromataze i primjenjuje se za hormonsku terapiju protiv raka.
- uznapredovali tumori koji se zovu neuroendokrini tumori, a potječu iz želuca, crijeva, pluća ili gušterića. Lijek se primjenjuje ako se tumori ne mogu operirati i ako ne proizvode previše specifičnih hormona ili drugih sličnih prirodnih tvari.
- uznapredovali rak bubrega (uznapredovali karcinom bubrežnih stanica) u slučaju kada drugi lijekovi (takozvani „lijekovi protiv vaskularnog endotelnog čimbenika rasta”, odnosno „anti-VEGF lijekovi”) nisu pomogli u zaustavljanju bolesti.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Syreleno

Lijek Syreleno propisat će Vam samo liječnik s iskustvom u liječenju raka. Pažljivo slijedite sve upute liječnika. Upute se mogu razlikovati od općenitih informacija navedenih u ovoj uputi o lijeku. Obratite se svojem liječniku ako imate bilo kakvih pitanja o lijeku Syreleno ili ako Vas zanima zašto Vam je taj lijek propisan.

Nemojte uzimati Syreleno:

- ako ste **alergični na everolimus, na slične tvari kao što su sirolimus ili temsirolimus ili neki drugi sastojak** ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Obratite se svojem liječniku za savjet ako mislite da biste mogli biti alergični.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Syrleno:

- ako imate bilo kakvih **problema s jetrom** ili ako ste ikada imali ikakvu **bolest** koja je možda **zahvatila Vašu jetru**. U tom slučaju liječnik će možda morati propisati drugačiju dozu lijeka Syrleno.
- ako imate **šećernu bolest** (visoku razinu šećera u krvi). Lijek Syrleno može povećati razine šećera u krvi i pogoršati šećernu bolest. To može dovesti do potrebe za inzulinom i/ili antidiabeticima za primjenu kroz usta. Obratite se svojem liječniku ako osjetite prekomjernu žđ ili ako dođe do povećane učestalosti mokrenja.
- ako morate primiti **cjepivo** dok uzimate lijek Syrleno.
- ako imate **visok kolesterol**. Lijek Syrleno može povisiti kolesterol i/ili druge masnoće u krvi.
- ako ste nedavno imali **tešku operaciju** ili ako i dalje imate **nezacijeljenu ranu** nakon operacije. Lijek Syrleno može povećati rizik od problema sa zacjeljivanjem rane.
- ako imate **infekciju**. Možda će biti potrebno liječiti infekciju prije početka primjene lijeka Syrleno.
- ako ste prethodno imali **hepatitis B** jer se ovaj virus može ponovno aktivirati tijekom liječenja lijekom Syrleno (pogledajte dio 4. „Moguće nuspojave”).
- ako ste primali ili čete primiti **liječenje zračenjem**.

Lijek Syrleno također može:

- oslabiti imunološki sustav. Stoga biste mogli biti izloženi riziku od infekcije dok uzimate lijek Syrleno. Obratite se svojem liječniku ako imate vrućicu ili druge znakove infekcije. Neke infekcije mogu biti teške i dovesti do smrtnog ishoda.
- utjecati na funkciju bubrega. Stoga će liječnik nadzirati Vašu funkciju bubrega dok uzimate lijek Syrleno.
- uzrokovati nedostatak zraka, kašalj i vrućicu.
- uzrokovati razvoj čireva i groznica u ustima. Liječnik će možda morati privremeno ili trajno prekinuti Vaše liječenje lijekom Syrleno. Možda će Vam biti potrebno liječenje vodicom za ispiranje usta, gelom ili drugim lijekovima. Neke vodice za ispiranje usta i gelovi mogu pogoršati čireve, stoga nemojte pokušati primjenjivati ništa bez da se najprije savjetujete sa svojim liječnikom. Liječnik će možda ponovno započeti liječenje lijekom Syrleno pri istoj ili nižoj dozi.
- uzrokovati komplikacije liječenja zračenjem. Teške komplikacije liječenja zračenjem (kao što su nedostatak zraka, mučnina, proljev, kožni osip i bol u ustima, desnima i grlu), uključujući smrtnе ishode, uočene su u nekih bolesnika koji su uzimali everolimus istovremeno dok su primali liječenje zračenjem ili koji su uzimali everolimus neposredno nakon liječenja zračenjem. Također, takozvani sindrom upalne reakcije na ozračenom mjestu (čiji su simptomi crvenilo kože ili upala plućnog tkiva na prethodno ozračenom mjestu) prijavljen je u bolesnika koji su prethodno bili liječeni zračenjem.

Obratite se svojem liječniku ako se planirate liječiti zračenjem u bliskoj budućnosti ili ako ste prethodno bili liječeni zračenjem.

Obavijestite svojeg liječnika ako dođe do pojave tih simptoma.

Redovito ćete obavljati krvne pretrage tijekom liječenja. Tim će se pretragama provjeravati količina krvnih stanica (bijele krvne stanice, crvene krvne stanice i trombociti) u Vašoj krvi da bi se utvrdilo ima li lijek Syrleno štetan učinak na te stanice. Krvne pretrage također će se provoditi da bi se provjerila funkcija Vaših bubrega (razina kreatinina) i jetre (razina transaminaza) te razine šećera i kolesterola u Vašoj krvi. Razlog tomu je što lijek Syrleno može utjecati i na navedeno.

Djeca i adolescenti

Lijek Syrleno ne smije se primjenjivati u djece ili adolescenata (mlađih od 18 godina).

Drugi lijekovi i Syrleno

Lijek Syrleno može utjecati na djelovanje drugih lijekova. Ako uzimate druge lijekove istodobno s lijekom Syrleno, Vaš liječnik možda će morati promijeniti dozu lijeka Syrleno ili drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Sljedeći lijekovi mogu povećati rizik od nuspojava lijeka **Syrleno**:

H A L M E D
26 - 07 - 2024
O D O B R E N O

- **ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol ili flukonazol i drugi antimikotici** koji se primjenjuju za liječenje gljivičnih infekcija.
- **klaritromicin, telitromicin ili eritromicin, antibiotici** koji se primjenjuju za liječenje bakterijskih infekcija.
- **ritonavir i drugi lijekovi koji se primjenjuju za liječenje infekcije virusom humane imunodefijencije (HIV) i/ili sindroma stećene imunodefijencije (AIDS).**
- **verapamil ili diltiazem,** koji se primjenjuju za liječenje srčanih stanja ili visokog krvnog tlaka.
- **dronedaron,** lijek koji se primjenjuje za pomoć pri kontroli otkucaja srca.
- **ciklosporin,** lijek koji se primjenjuje za sprječavanje organizma od odbacivanja presađenih organa.
- **imatinib,** koji se primjenjuje za sprječavanje rasta abnormalnih stanica.
- **inhibitori angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE)** (kao što je **ramipril**) koji se primjenjuju za liječenje visokog krvnog tlaka ili drugih kardiovaskularnih problema.
- **nefazodon,** koji se primjenjuje za liječenje depresije.
- **kanabidiol** (koji se između ostalog primjenjuje za liječenje napadaja).

Sljedeći lijekovi mogu smanjiti djelotvornost lijeka Syrlelo:

- **rifampicin,** koji se primjenjuje za liječenje tuberkuloze (TBC).
- **efavirenz ili nevirapin,** koji se primjenjuju za liječenje infekcije HIV-om / AIDS-a.
- **gospina trava (*Hypericum perforatum*),** biljni pripravak koji se primjenjuje za liječenje depresije i drugih stanja.
- **deksametazon,** kortikosteroid koji se primjenjuje za liječenje brojnih stanja, uključujući upale ili probleme s imunološkim sustavom.
- **fenitoin, karbamazepin ili fenobarbital** i drugi **antiepileptici** koji se primjenjuju za sprječavanje napadaja.

Te je lijekove potrebno izbjegavati tijekom liječenja lijekom Syrlelo. Ako uzimate bilo koji od tih lijekova, liječnik Vam može propisati drugi lijek ili promijeniti dozu lijeka Syrlelo.

Syrlelo s hranom i pićem

Izbjegavajte **grejp i sok od grejpa** dok uzimate lijek Syrlelo. Može doći do povećanja količine lijeka Syrlelo u krvi, a razina može biti štetna.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Trudnoća

Lijek Syrlelo mogao bi naškoditi Vašem nerođenom djetetu, stoga se ne preporučuje tijekom trudnoće. Obavijestite svojeg liječnika ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni. Vaš liječnik razgovarat će s Vama o tome biste li trebali uzimati ovaj lijek tijekom trudnoće.

Žene koje mogu zatrudnjeti trebaju primjenjivati visokoučinkovitu kontracepciju tijekom liječenja i još najviše osam tjedana nakon završetka liječenja. Ako unatoč tim mjerama mislite da biste mogli biti trudni, obratite se svojem liječniku za savjet *prije* nego nastavite uzimati lijek Syrlelo.

Dojenje

Lijek Syrlelo mogao bi naškoditi Vašem dojenčetu. Ne smijete dojiti tijekom liječenja i još dva tjedna nakon posljednje doze everolimusa. Obavijestite svojeg liječnika ako dojite.

Plodnost u žena

Izostanak menstruacije (amenoreja) uočen je u nekim bolesnicama koje su primale lijek Syrlelo. Lijek Syrlelo može utjecati na plodnost u žena. Obratite se svojem liječniku ako želite imati djecu.

Plodnost u muškaraca

Lijek Syrlelo može utjecati na plodnost u muškaraca. Obratite se svojem liječniku ako želite začeti dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako se osjećate neuobičajeno umorno (umor je vrlo česta nuspojava), budite iznimno oprezni prilikom upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

Syrleno sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svojem liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Syrleno

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena je doza 10 mg jednom dnevno. Liječnik će Vam reći koliko tableta lijeka Syrleno trebate uzeti.

Ako imate problema s jetrom, liječnik Vam može propisati nižu dozu lijeka Syrleno (2,5, 5 ili 7,5 mg dnevno).

Ako razvijete određene nuspojave dok uzimate lijek Syrleno (pogledajte dio 4.), Vaš liječnik može sniziti dozu ili prekinuti liječenje, privremeno ili trajno.

Uzmite lijek Syrleno jednom dnevno, u otprilike isto vrijeme svaki dan, dosljedno s hranom ili bez hrane.

Progutajte cijelu tabletu ili tablete uz času vode. Nemojte žvakati ni drobiti tablete.

Ako uzmete više lijeka Syrleno nego što ste trebali

- Ako ste uzeli previše lijeka Syrleno ili ako netko drugi slučajno uzme Vaše tablete, odmah se obratite liječniku ili idite u bolnicu. Možda će biti potrebno hitno liječenje.
- Ponesite kutiju i ovu uputu o lijeku sa sobom tako da liječnik može znati što ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Syrleno

Ako propustite dozu, uzmite sljedeću dozu prema uobičajenom rasporedu. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljene tablete.

Ako prestanete uzimati Syrleno

Nemojte prestati uzimati lijek Syrleno osim ako Vam liječnik to nije rekao.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

PRESTANITE uzimati lijek Syrleno i odmah potražite liječničku pomoć ako imate bilo koji od sljedećih znakova alergijske reakcije:

- otežano disanje ili gutanje
- oticanje lica, usana, jezika ili grla
- jaki svrbež kože, s crvenim osipom ili odignutim kvržicama

Ozbiljne nuspojave lijeka Syrleno uključuju:

Vrlo često (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Povišena temperatura, zimica (znakovi infekcije) • vrućica, kašalj, otežano disanje, piskanje (znakovi upale plućnog tkiva, također poznato kao pneumonitis)

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Prekomjerna žed, pojčano mokrenje, povećan apetit uz gubitak težine, umor (znakovi šećerne bolesti) • krvarenje (hemoragija), na primjer u stijenci crijeva • izrazito smanjeno mokrenje (znak zatajenja bubrega)

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Vrućica, kožni osip, bol i upala u zglobovima, umor, gubitak apetita, mučnina, žutica (žuta boja kože), bol u gornjem desnom dijelu trbuha, bijeda stolica, tamna mokraća (to mogu biti znakovi ponovne aktivacije hepatitis B) • nedostatak zraka, otežano disanje u ležećem položaju, oticanje stopala ili nogu (znakovi zatajenja srca) • oticanje i/ili bol u jednoj nozi, obično u listu, crvena ili topla koža na zahvaćenom području (znakovi začepljenja krvne žile (vene) u nogama koje je uzrokovano zgrušavanjem krvi) • iznenadna pojava nedostatka zraka, bol u prsnom košu ili iskašljavanje krvi (mogući znakovi plućne embolije, odnosno stanja koje se javlja kada dođe do začepljenja jedne ili više arterija u plućima) • izrazito smanjeno mokrenje, oticanje u nogama, zbumjenost, bol u ledima (znakovi iznenadnog zatajenja bubrega) • osip, svrbež, koprivnjača, otežano disanje ili gutanje, omaglica (znakovi teške alergijske reakcije, također poznato kao preosjetljivost)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Nedostatak zraka ili ubrzano disanje (znakovi akutnog respiratornog distres sindroma)

Ako primijetite bilo koju od navedenih nuspojava, odmah se obratite liječniku jer posljedice mogu biti opasne po život.

Ostale moguće nuspojave lijeka Syrleto uključuju:**Vrlo često** (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba)

Umor, nedostatak zraka, omaglica, bijeda koža, znakovi niske razine crvenih krvnih stanica (anemija) • visoka razina šećera u krvi (hiperglikemija) • gubitak apetita, visoka razina lipida (masnoća) u krvi (hiperkolesterolemija) • poremećaj okusa (disgeuzija), glavobolja • krvarenje iz nosa (epistaksia) • kašalj • čirevi u ustima • nelagoda u želucu, uključujući mučninu ili proljev • kožni osip • svrbež (pruritus) • osjećaj slabosti ili umora, oticanje ruku, šaka, stopala, gležnjeva ili drugog dijela tijela (znakovi edema) • gubitak težine

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba)

Spontano krvarenje ili stvaranje modrica (znakovi niske razine trombocita, što je također poznato kao trombocitopenija), vrućica, grlobolja, čirevi u ustima uzrokovani infekcijama (znakovi niske razine bijelih krvnih stanica, leukopenija, limfopenija i/ili neutropenijski) • nedostatak zraka (dispneja) • žed, smanjeno mokrenje, tamna mokraća, suha i crvena koža, nadraženost (znakovi dehidracije) • poteškoće sa spavanjem (nesanica) • glavobolja, omaglica (znak visokog krvnog tlaka, odnosno hipertenzije), oticanje jednog dijela ili cijele ruke (uključujući prste na ruci) ili noge (uključujući prste na nozi), osjećaj težine, ograničeni pokreti, nelagoda (mogući simptomi limfedema) • vrućica • upala sluznice usta, želuca, crijeva • suha usta • žgaravica (dispepsija) • mučnina (povraćanje) • otežano gutanje (disfagija) • bol u trbuhi • akne • osip i bol u dlanovima šaka ili tabanima stopala (sindrom šaka-stopalo) • crvenilo kože (eritem) • bol u zglobovima • bol u ustima • poremećaji menstruacije, kao što su neredovite menstruacije • visoka razina lipida (masti) u krvi (hiperlipidemija, povišeni trigliceridi) • niska razina kalija u krvi (hipokalijemija) • niska razina fosfata u krvi (hipofosfatemija) • niska razina kalcija u krvi (hipokalcemija) • suha koža, ljuštenje kože, lezije na koži • poremećaji noktiju, pucanje noktiju • blagi gubitak kose • abnormalni rezultati krvnih pretraga funkcije jetre (povišena alanin aminotransferaza i aspartat aminotransferaza) • abnormalni rezultati krvnih pretraga funkcije bubrega (povišen kreatinin) • oticanje kapka • bjelančevine u mokraći

Manje često (mogu se javiti u do 1 na 100 osoba)

Slabost, spontano krvarenje ili stvaranje modrica i česte infekcije sa znakovima kao što su vrućica, zimica, grlobolja ili čirevi u ustima (znakovi niske razine krvnih stanica, također poznato kao pancitopenija) • gubitak osjeta okusa (ageuzija) • iskašljavanje krvi (hemoptiza) • poremećaji menstruacije, kao što je izostanak menstruacije (amenoreja) • češće mokrenje tijekom dana • bol u prsnom košu • abnormalno zacjeljivanje rana • navale vrućine • iscijedak iz oka uz svrbež i crvenilo, upala spojnica oka ili crvenilo oka (konjunktivitis)

Rijetko (mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba)

Umor, nedostatak zraka, omaglica, bijeda koža (znakovi niske razine crvenih krvnih stanica, moguće zbog vrste anemije koja se zove čista aplazija crvenih krvnih stanica) • oticanje lica, područja oko očiju,

HALMED

26 - 07 - 2024

ODOBRENO

usta i unutrašnjosti usta i/ili gbla te jezika i otežano disanje ili gutanje (također poznato kao angioedem), što mogu biti znakovi alergijske reakcije

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti na temelju dostupnih podataka)

Reakcija na prethodno ozračenom mjestu, tj. crvenilo kože ili upala plućnog tkiva (takozvani sindrom upalne reakcije na ozračenom mjestu), pogoršanje nuspojave uzrokovanih zračenjem

Obavijestite liječnika i/ili ljekarnika ako navedene nuspojave postanu teške. Većina nuspojava blage su do umjerene i obično se povlače ako se liječenje prekine na nekoliko dana.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljinjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Syrleto

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetla.

Ovaj lijek ne zahtijeva nikakve posebne temperaturne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Syrleto sadrži

- Djetalna tvar je everolimus. Jedna tableta sadrži 2,5 mg, 5 mg ili 10 mg everolimusa.
- Drugi sastojci su: butilhidroksitoluen (E321), hipromeloza (E464), laktosa, laktosa hidrat, kropsovidon (E1202) i magnezijev stearat (E470b).

Kako Syrleto izgleda i sadržaj pakiranja

Tablete everolimusa dostupne su u trima jačinama:

Syrleto 2,5 mg bijele su do sivkasto bijele ovalne bikonveksne tablete (približnih dimenzija 10 x 5 mm), s utisnutom oznakom „E9VS” na jednoj strani i „2,5” na drugoj strani.

Syrleto 5 mg bijele su do sivkasto bijele ovalne bikonveksne tablete (približnih dimenzija 13 x 6 mm), s utisnutom oznakom „E9VS 5” na jednoj strani.

Syrleto 10 mg bijele su do sivkasto bijele ovalne bikonveksne tablete (približnih dimenzija 16 x 8 mm), s utisnutom oznakom „E9VS 10” na jednoj strani.

Syrleto 2,5 mg tablete dostupne su u blisterima ili perforiranim blisterima s jediničnom dozom. Svako pakiranje sadrži 30 tableta, 90 tableta ili 30 x 1 tabletu.

Syrleto 5 mg i 10 mg tablete dostupne su u blisterima ili perforiranim blisterima s jediničnom dozom. Svako pakiranje sadrži 10 tableta, 30 tableta, 90 tableta ili 30 x 1 tabletu.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Alkaloid-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovenija

Tel.: + 386 1 300 42 90

Fax: + 386 1 300 42 91

email: info@alkaloid.si

Proizvođač

Synthon BV

Microweg 22,

6545 CM Nijmegen,

Nizozemska

Alkaloid-INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

1231 Ljubljana-Črnuče

Slovenija

Synthon Hispania S.L.

Castelló no1, Polígono las Salinas, Sant Boi de Llobregat,

08830 Barcelona,

Španjolska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alkaloid d.o.o.

Slavonska avenija 6 A

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6311 920

Fax: +385 1 6311 922

e-mail: alkaloid@alkaloid.hr

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Bugarska	Syreleno 2,5 mg tablets Syreleno 5 mg tablets Syreleno 10 mg tablets
Hrvatska	Syreleno 2,5 mg tablete Syreleno 5 mg tablete Syreleno 10 mg tablete
Slovenija	Syreleno 2,5 mg tablete Syreleno 5 mg tablete Syreleno 10 mg tablete
Rumunjska	Syreleno 2,5 mg tablete Syreleno 5 mg tablete Syreleno 10 mg tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2024.