

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Temazol 5 mg tvrde kapsule
Temazol 20 mg tvrde kapsule
Temazol 100 mg tvrde kapsule
Temazol 140 mg tvrde kapsule
Temazol 180 mg tvrde kapsule
Temazol 250 mg tvrde kapsule
temozolomid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Temazol i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Temazol
3. Kako uzimati Temazol
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Temazol
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Temazol i za što se koristi

Temazol sadrži lijek pod nazivom temozolomid. To je lijek protiv tumora.

Temazol se koristi za liječenje određenih vrsta tumora mozga:

- u odraslih bolesnika s novodijagnosticiranim multiformnim glioblastomom. Temazol se najprije koristi zajedno sa zračenjem (faza istodobnog liječenja), a zatim kao jedini lijek (faza monoterapije).
- u djece u dobi od 3 godine i starije te u odraslih bolesnika s malignim gliomom, kao što je multiformni glioblastom ili anaplastični astrocitom. U ovom slučaju Temazol se koristi ako se tumor ponovno pojavio ili se pogoršava nakon standardne terapije.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Temazol

Nemojte uzimati Temazol

- ako ste alergični na temozolomid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako ste imali alergijsku reakciju na dakarbazin (antitumorski lijek, poznat i kao DTIC). Znakovi alergijske reakcije uključuju osjećaj svrbeži, ostajanje bez daha ili piskanje pri disanju, oticanje lica, usana, jezika ili grla.
- ako je znatno smanjen broj određenih vrsta krvnih stanica (mijelosupresija), kao na primjer broj bijelih krvnih stanica i krvnih pločica. Te su krvne stanice od značaja u borbi protiv infekcije te za pravilno zgrušavanje krvi. Liječnik će provjeriti Vašu krvnu sliku da bi se ustanovilo imate li dovoljan broj tih stanica prije početka liječenja.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego uzmete Temazol:

- jer će Vas morati pomno nadzirati zbog moguće pojave teškog oblika upale pluća uzrokovane s *Pneumocystis jirovecii*. Ako ste bolesnik s novodijagnosticiranim multififormnim glioblastomom, uzimat ćete Temazol u kombinaciji sa zračenjem tijekom 42 dana. U tom slučaju liječnik će Vam propisati i lijekove za sprječavanje ove vrste upale pluća.
- ako ste ikada imali ili trenutno možda imate infekciju hepatitisom B. Ovo je zato što Temazol može uzrokovati ponovnu aktivaciju hepatitisa B, što u nekim slučajevima može imati smrtni ishod. Liječnik će detaljno pregledati bolesnike prije početka liječenja kako bi se utvrdilo postoje li znakovi ove infekcije.
- ako imate smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemiju), bijelih krvnih stanica i trombocita ili problema sa zgrušavanjem krvi prije početka liječenja, ili se ti poremećaji razvijaju tijekom liječenja. Vaš liječnik će možda odlučiti smanjiti dozu, privremeno odnosno trajno prekinuti liječenje ili promijeniti Vaše liječenje. Možda će Vam biti potrebna i druga terapija. U nekim će slučajevima možda biti neophodno prekinuti liječenje lijekom Temazol. Tijekom liječenja će se često provoditi krvne pretrage radi praćenja nuspojava lijeka Temazol na krvne stanice.
- jer može postojati malen rizik od razvoja drugih promjena krvnih stanica, uključujući leukemiju.
- ako imate mučninu i/ili povraćanje, što su vrlo česte nuspojave lijeka Temazol (pogledajte dio 4.), Vaš liječnik Vam može propisati lijek koji sprječava povraćanje (antiemetik). Ako često povraćate prije ili za vrijeme liječenja, upitajte svog liječnika u koje je vrijeme najbolje uzimati Temazol dok povraćanje ne bude pod kontrolom. Ako povratite nakon uzimanja doze, nemojte uzeti sljedeću dozu istoga dana.
- ako dobijete vrućicu ili simptome infekcije, odmah se javite svom liječniku.
- ako ste stariji od 70 godina, možete biti skloniji infekcijama, stvaranju modrica ili krvarenju.
- ako imate problema s jetrom ili bubrezima, možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka Temazol.

Djeca i adolescenti

Ovaj lijek nije ispitivan u djece mlađe od 3 godine te im ga stoga nemojte davati. Informacije o primjeni lijeka Temazol u djece starije od 3 godine su ograničene.

Drugi lijekovi i Temazol

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. To je zbog toga što se ne smijete liječiti lijekom Temazol tijekom trudnoće, osim ako ga Vaš liječnik nije izričito propisao.

Bolesnice koje mogu zatrudnjeti moraju primjenjivati učinkovite mjere kontracepcije tijekom liječenja lijekom Temazol i još najmanje 6 mjeseci nakon završetka liječenja.

Morate prekinuti dojenje dok se liječite lijekom Temazol.

Plodnost muškaraca

Temazol može uzrokovati trajnu neplodnost. Bolesnicima muškog spola moraju primjenjivati učinkovite mjere kontracepcije te ne smiju pokušavati začeti dijete tijekom najmanje 3 mjeseca nakon prestanka liječenja. Preporučuje se da potraže savjet kako pohraniti spermiju prije početka liječenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Temazol može uzrokovati umor ili pospanost. U tom slučaju nemojte voziti niti rukovati alatima ili strojevima ili voziti bicikl dok ne vidite kako ovaj lijek djeluje na Vas (vidjeti dio 4).

Temazol sadrži laktozu

Ovaj lijek sadrži laktozu (vrstu šećera). Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere,

obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Temazol sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po kapsuli, tj. zanemarive količine natrija.

Temazol 20 mg tvrde kapsule također sadrže pomoćnu tvar, boju Sunset yellow FCF (E110), koja može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Temazol

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doza i trajanje liječenja

Vaš liječnik će izračunati točnu dozu lijeka Temazol primjerenu za Vas. Ona ovisi o Vašoj veličini (visini i težini) te o tome je li se tumor ponovno pojavio i jeste li ranije već primali kemoterapiju. Liječnik Vam može dati i neke druge lijekove (antiemetike) koje ćete uzimati prije i/ili nakon što uzmete lijek Temazol radi izbjegavanja ili kontrole mučnine i povraćanja.

Bolesnici s novodijagnosticiranim multifornim glioblastomom:

Ako ste novodijagnosticirani bolesnik, liječenje će se odvijati u dvije faze:

- prvo liječenje zajedno sa zračenjem (faza istodobnog liječenja)
- zatim liječenje samo lijekom Temazol (faza monoterapije).

U fazi istodobnog liječenja liječnik će započeti primjenu Temazola u dozi od 75 mg/ m² (uobičajena doza). Tu ćete dozu uzimati svakodnevno tijekom 42 dana (do najviše 49 dana) u kombinaciji sa zračenjem. Uzimanje lijeka Temazol može se odgoditi ili prekinuti ovisno o broju Vaših krvnih stanica i o tome kako podnosite lijek tijekom faze istodobnog liječenja. Nakon završetka terapije zračenjem, prekinut ćete liječenje na 4 tjedna. Tako će se Vaše tijelo moći oporaviti. Potom ćete započeti fazu monoterapije.

Doza i način uzimanja lijeka Temazola u fazi monoterapije razlikovat će se od prethodne faze. Liječnik će izračunati točnu dozu lijeka koja Vam je potrebna. Liječenje se može odvijati u ukupno 6 terapijskih razdoblja (ciklusa). Svaki ciklus traje 28 dana. Uzimat ćete novu dozu lijeka Temazol jedanput dnevno tijekom prvih 5 dana (“dani doziranja”) svakog ciklusa. Prva doza iznositi će 150 mg/ m². Zatim slijede 23 dana bez uzimanja lijeka Temazol, što čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa. Nakon 28. dana započinje sljedeći ciklus. Ponovno ćete uzimati Temazol jedanput na dan tijekom 5 dana, nakon čega slijede 23 dana bez lijeka Temazol. Ovisno o broju Vaših krvnih stanica i o tome kako podnosite lijek u svakom terapijskom ciklusu, može se prilagoditi doza lijeka Temazol, odnosno odgoditi ili prekinuti uzimanje lijeka.

Bolesnici s tumorom koji se ponovno pojavio ili pogoršao (maligni gliom, kao što je multifornni glioblastom ili anaplastični astrocitom), a koji uzimaju samo Temazol

Ciklus liječenja s lijekom Temazol traje 28 dana.

Uzimat ćete samo Temazol jedanput na dan prvih 5 dana. Ova dnevna doza ovisi o tome jeste li već prije primali kemoterapiju.

Ako niste prethodno liječeni kemoterapijom, prva doza lijeka Temazol bit će od 200 mg/m² jedanput na dan tijekom prvih 5 dana. Ako ste ranije već liječeni kemoterapijom, prva doza lijeka Temazol bit će 150 mg/ m² jedanput na dan tijekom prvih 5 dana. Zatim slijede 23 dana bez uzimanja lijeka Temazol, što čini ukupno 28 dana terapijskog ciklusa.

Nakon 28. dana, započet će sljedeći ciklus. Tada ćete ponovo dobivati Temazol jedanput na dan tijekom 5 dana, nakon čega slijede 23 dana bez lijeka Temazol.

Prije svakog novog terapijskog ciklusa napraviti će Vam krvne pretrage kako bi se utvrdilo treba li prilagoditi dozu lijeka Temazol. S obzirom na rezultate krvnih pretraga liječnik može prilagoditi dozu lijeka za sljedeći ciklus.

Kako uzimati Temazol

Uzmite propisanu dozu Temazola jedanput na dan, po mogućnosti u isto vrijeme svakog dana.

Kapsule uzmite na prazan želudac; primjerice, najmanje jedan sat prije nego što planirate doručkovati. Kapsule progutajte cijele, s čašom vode. Nemojte otvarati, drobiti niti žvakati kapsule. Ako je kapsula oštećena, izbjegavajte kontakt praška s kožom, očima ili nosom. Ako prah slučajno dospije u oči ili nos, isperite ih vodom. Ovisno o dozi koju Vam je liječnik propisao, možda ćete morati uzimati više od jedne kapsule, koje su različite jačine (sadrže različitu količinu djelatne tvari u miligramima). Svaka jačina kapsule ima kapicu druge boje (vidjeti tablicu u nastavku).

Jačina	Boja/oznake
Temazol 5 mg tvrde kapsule	dvije zelene linije na kapi kapsule i zelena oznaka „T 5 mg“ na tijelu kapsule
Temazol 20 mg tvrde kapsule	dvije narančaste linije na kapi kapsule i narančasta oznaka „T 20 mg“ na tijelu kapsule
Temazol 100 mg tvrde kapsule	dvije ružičaste linije na kapi kapsule i ružičasta oznaka „T 100 mg“ na tijelu kapsule
Temazol 140 mg tvrde kapsule	dvije plave linije na kapi kapsule i plava oznaka „T 140 mg“ na tijelu kapsule
Temazol 180 mg tvrde kapsule	dvije crvene linije na kapi kapsule i crvena oznaka „T 180 mg“ na tijelu kapsule
Temazol 250 mg tvrde kapsule	dvije crne linije na kapi kapsule i crna oznaka „T 250 mg“ na tijelu kapsule

Budite sigurni da ste točno razumjeli i zapamtili sljedeće:

- koliko kapsula morate uzeti svaki dan. Zamolite liječnika ili ljekarnika da Vam to zapiše (uključujući boju).
- koji dani su Vaši dani za uzimanje lijeka.

Svaki puta kada započinjete novi ciklus, provjerite s Vašim liječnikom dozu lijeka jer se ona može razlikovati od prethodnog ciklusa.

Uvijek uzmite Temazol točno kako Vam je rekao liječnik. Vrlo je važno da provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako u nešto niste sigurni. Pogreške u načinu uzimanja ovog lijeka može imati ozbiljne posljedice za zdravlje.

Ako uzmete više Temazol kapsula nego što ste trebali

Ako uzmete više Temazol kapsula nego što ste trebali, odmah se javite liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

Ako ste zaboravili uzeti Temazol kapsule

Uzmite propuštenu dozu što je prije moguće tijekom istog dana. Ako je prošao cijeli dan, provjerite s liječnikom što da učinite. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu, osim ako Vam to nijerekao liječnik.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Odmah se obratite liječniku ako imate neki od sljedećih simptoma:

- jaku alergijsku reakciju (reakciju preosjetljivost) (koprivnjača, piskanje pri disanju ili druge tegobe pri disanju),
- nekontrolirano krvarenje,
- napadaje (konvulzije),
- vrućicu,
- zimicu,
- jaku glavobolju koja ne prestaje.

Liječenje lijekom Temazol može izazvati smanjenje broja nekih vrsta krvnih stanica. To može uzrokovati povećanu sklonost modricama ili krvarenju, anemiju (smanjen broj crvenih krvnih stanica), vrućicu i smanjenu otpornost na infekcije. Smanjenje broja krvnih stanica obično je kratkotrajno. U nekim slučajevima može biti dugotrajno te dovesti do vrlo teškog oblika anemije (aplastična anemija). Liječnik će Vam redovito kontrolirati krvnu sliku kako bi uočio eventualne promjene i odlučiti je li potrebno specifično liječenje. U nekim će slučajevima smanjiti dozu lijeka Temazol ili prekinuti liječenjeovim lijekom.

U nastavku su navedene ostale prijavljene nuspojave:

Vrlo česte (javljaju se u 1 na 10 bolesnika):

- gubitak teka, glavobolja, otežan govor
- zatvor, mučnina, povraćanje, proljev
- osip, gubitak kose
- umor

Česte (javljaju se u 1 do 10 na 100 bolesnika):

- infekcije, infekcije usne šupljine
- smanjen broj krvnih stanica (neutropenija, limfopenija, trombocitopenija)
- alergijska reakcija
- povišena razina šećera u krvi
- poremećaj pamćenja, depresija, tjeskoba, smetenost, nemogućnost bolesnika da zaspi ili spava
- poremećaj koordinacije i ravnoteže
- poteškoće s koncentracijom, promjena psihičkog stanja ili pozornosti, zaboravljivost
- omaglica, poremećaj osjeta, trnci, drhtavica, promjene osjeta okusa
- djelomičan gubitak vida, poremećaj vida, dvoslike, bolne oči
- gluhoća, zvonjava u ušima, bol u uhu
- krvni ugrušak u plućima ili nogama, visok krvni tlak

- upala pluća, nedostatak zraka, bronhitis, kašalj, upala sinusa
- bol u želucu ili trbuhu, nadražen želudac/žgaravica, otežano gutanje
- suha koža, svrbež
- oštećenje mišića, mišićna slabost, bolovi u mišićima
- bolni zglobovi, bol u leđima
- učestalo mokrenje, poteškoće sa zadržavanjem mokraće
- vrućica, simptomi nalik gripi, bol, loše osjećanje, prehlada ili gripa
- zadržavanje tekućine, otečene noge
- povišene vrijednosti jetrenih enzima
- gubitak tjelesne težine, povećanje tjelesne težine
- oštećenje zbog zračenja

Manje česte (javljaju se u 1 do 10 na 1 000 bolesnika):

- infekcije mozga (herpesni meningoencefalitis), uključujući slučajeve sa smrtnim ishodom
- infekcije rana
- nove ili ponovno aktivirane infekcije citomegalovirusom
- ponovno aktivirane infekcije virusom hepatitisa B
- sekundarni rak, uključujući leukemiju
- smanjen broj krvnih stanica (pancitopenija, anemija, leukopenija)
- crvene potkožne mrlje
- dijabetes insipidus (simptomi uključuju pojačano mokrenje i žeđ), niska razina kalija u krvi
- promjene raspoloženja, halucinacije
- djelomična paraliza, promjena osjeta mirisa
- oštećenje sluha, infekcija srednjeg uha
- palpitacije (osjećaj lupanja srca), navale vrućine
- oticanje trbuha, poteškoće s kontroliranjem stolice, hemoroidi, suha usta
- hepatitis i oštećenje jetre (uključujući zatajenje jetre sa smrtnim ishodom), kolestaza (otežan protok žuči), povišene vrijednosti bilirubina
- mjehurići po tijelu ili u ustima, ljuštenje kože, izbijanje kožnih promjena, bolno crvenilo kože, težak osip praćen oticanjem kože (uključujući kožu dlanova i tabana)
- povećana osjetljivost na sunčevu svjetlost, urtikarija (koprivnjača), pojačano znojenje, promjena boje kože
- otežano mokrenje
- krvarenje iz rodnice, nadraženost rodnice, izostanak mjesečnica ili obilne mjesečnice, bol u dojkama, spolna nemoć
- drhtanje, oticanje lica, promjena boje jezika, žeđ, poremećaj zuba
- suhe oči

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Temazol?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece, najbolje u zaključanom ormariću. Nehotično gutanjekapsula može biti smrtonosno za djecu.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici i kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju na temperaturi ispod 30°C.

Bočicu dobro zatvoriti zbog zaštite od vlage.

Obavijestite svog ljekarnika ako primjetite bilo kakvu promjenu u izgledu kapsula.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Temazol sadrži

Djelatna tvar je temozolomid.

Temazol 5 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 5 mg temozolomida.

Temazol 20 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 20 mg temozolomida.

Temazol 100 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 100 mg temozolomida.

Temazol 140 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 140 mg temozolomida.

Temazol 180 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 180 mg temozolomida.

Temazol 250 mg tvrde kapsule: Svaka kapsula sadrži 250 mg temozolomida.

Drugi sastojci su:

Sadržaj kapsule:

Bezvodna laktoza; natrijev škroboglikolat, vrste A, koloidni bezvodni silicijev dioksid; tartaratna kiselina; stearatna kiselina

Tijelo i kapa kapsule:

Temazol 5 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, boja Indigo carmine (E132), žuti željezov oksid (E172).

Temazol 20 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, boja Sunset yellow FCF (E110).

Temazol 100 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, žuti željezov oksid (E172), crveni željezov oksid (E172).

Temazol 140 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, boja Indigo carmine (E132).

Temazol 180 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, crveni željezov oksid (E172).

Temazol 250 mg tvrde kapsule: (uključujući tintu): želatina, titanijev dioksid (E171), šelak, propilenglikol, crni željezov oksid (E172).

Kako Temazol izgleda i sadržaj pakiranja

Temazol 5 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije zelene linije na kapi kapsule kao i zelenom oznakom „T 5 mg“ na tijelu kapsule.

Temazol 20 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije narančaste linije na kapi kapsule kao i narančastom oznakom „T 20 mg“ na tijelu kapsule.

Temazol 100 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije ružičaste linije na kapi kapsule kao i ružičastom oznakom „T 100 mg“ na tijelu kapsule.

Temazol 140 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije plave linije na kapi kapsule kao i plavom oznakom „T 140 mg“ na tijelu kapsule.

Temazol 180 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije crvene linije na kapi kapsule kao i crvenom oznakom „T 180 mg“ na tijelu kapsule.

Temazol 250 mg tvrde kapsule: tvrde kapsule s bijelim neprozirnim tijelom i kapom kapsule, te s dvije crne linije na kapi kapsule kao i crnom oznakom „T 250 mg“ na tijelu kapsule.

Sadržaj pakiranja

Temazol tvrde kapsule dostupne su u pakiranju od 5 kapsula u smeđoj staklenoj bočici s bijelim plastičnim sigurnosnim zatvaračem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Proizvođači

PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Haupt Pharma Amareg GmbH
Donaustauer Straße 378
93055 Regensburg
Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u lipnju 2023.