

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Teriparatid Zentiva 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici teriparatid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Teriparatid Zentiva i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Teriparatid Zentiva
3. Kako primjenjivati Teriparatid Zentiva
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Teriparatid Zentiva
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Teriparatid Zentiva i za što se koristi

Teriparatid Zentiva sadrži djelatnu tvar teriparatid, koja se koristi za jačanje kostiju i smanjuje rizik od prijeloma tako što potiče stvaranje kosti.

Teriparatid Zentiva se koristi za liječenje osteoporoze u odraslih osoba. Osteoporoza je bolest koja kosti čini tankima i krhkima. Ta je bolest osobito česta u žena nakon menopauze, no može se javiti i u muškaraca. Osteoporoza se često javlja i u bolesnika koji primaju kortikosteroide.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Teriparatid Zentiva

Nemojte primjenjivati Teriparatid Zentiva

- ako ste alergični na teriparatid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
- ako imate visoke razine kalcija u krvi (postojeća hiperkalcijemija).
- ako imate ozbiljnih tegoba s bubrezima.
- ako Vam je ikada dijagnosticiran rak kosti ili neka druga vrsta raka koji se proširio (metastazirao) u kosti.
- ako bolujete od određenih bolesti kostiju. Ako imate neku koštanu bolest, obavijestite o tome svog liječnika.
- ako imate nerazjašnjena povišenja vrijednosti alkalne fosfataze u krvi, što znači da možda bolujete od Pagetove bolesti kostiju (bolest kod koje dolazi do abnormalnih promjena na kostima). Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.
- ako ste primili terapiju zračenjem koja je obuhvaćala kosti.
- ako ste trudni ili dojite.

Upozorenja i mjere opreza

Teriparatid Zentiva može povećati količinu kalcija u krvi ili mokraći.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije ili tijekom liječenja lijekom Teriparatid Zentiva:

- ako imate stalne mučnine, povraćate, imate zatvor, osjećate nedostatak energije ili slabost u mišićima. To mogu biti znakovi prekomjerne količine kalcija u krvi.
- ako patite od bubrežnih kamenaca ili ste nekada imali bubrežne kamence.
- ako imate tegoba s bubrežima (umjereno oštećenje bubrega).

U nekih se bolesnika nakon prvih nekoliko doza lijeka može javiti omaglica ili ubrzano kucanje srca. Prve injekcije lijeka Teriparatid Zentiva primijenite na mjestu gdje možete odmah sjesti ili leći ako osjetite omaglicu.

Ne smije se prekoračiti preporučeno trajanje liječenja od 24 mjeseca.

Teriparatid Zentiva se ne smije primjenjivati u odraslih osoba u rastu.

Djeca i adolescenti

Teriparatid Zentiva se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata (mlađih od 18 godina).

Drugi lijekovi i Teriparatid Zentiva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, jer oni ponekad mogu imati interakcije s lijekom Teriparatid Zentiva (npr. digoksin/digitalis, lijek za liječenje srčanih bolesti).

Trudnoća i dojenje

Nemojte primjenjivati Teriparatid Zentiva ako ste trudni ili dojite. Ako ste žena reproduktivne dobi, morate koristiti djelotvorne metode kontracepcije tijekom primjene lijeka Teriparatid Zentiva. Ako zatrudnite, primjenu lijeka Teriparatid Zentiva treba prekinuti. Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon injektiranja lijeka Teriparatid Zentiva neki bolesnici mogu osjetiti omaglicu. Ako osjetite omaglicu, ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok se ne budete osjećali bolje.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Teriparatid Zentiva

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako primjenjivati Teriparatid Zentiva

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza iznosi 20 mikrograma (što odgovara 80 mikrolitara) jedanput na dan, a primjenjuje se injekcijom pod kožu (supkutanom injekcijom) u bedro ili trbuh. Kako ne biste zaboravili primijeniti lijek, injicirajte ga svakoga dana u približno isto vrijeme.

Brizgalica se treba pripremiti prije nego što je prvi put upotrijebite. Pogledajte priloženi priručnik za korisnike.

Svakodnevno primjenjujte injekcije lijeka Teriparatid Zentiva sve dok Vam ih liječnik propisuje. Liječenje lijekom Teriparatid Zentiva ne smije trajati dulje od 24 mjeseca. Tijekom života ne smijete primiti više od jednog 24-mjesečnog ciklusa liječenja. Teriparatid Zentiva možete injicirati u vrijeme obroka.

Za upute o uporabi Teriparatid Zentiva brizgalice, pročitajte priručnik za korisnike koji je priložen u kutiji. Uz brizgalicu nisu priložene igle za injiciranje. Primjerice, možete koristiti igle za brizgalice veličine 29-31 G (promjera 0,25-0,33 mm) i duljine 12,7, 8 ili 5 mm proizvođača Becton, Dickinson and Company.

Injekciju lijeka Teriparatid Zentiva trebate primijeniti ubrzo nakon što ste brizgalicu izvadili iz hladnjaka, kako je opisano u priručniku za korisnike. Vratite brizgalicu u hladnjak odmah nakon uporabe. Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu i zbrinite je nakon svake uporabe. Nikada nemojte spremati brizgalicu s pričvršćenom iglom. Nikada nemojte Teriparatid Zentiva brizgalicu dijeliti s drugim osobama.

Liječnik će Vam možda savjetovati da uz Teriparatid Zentiva uzimate kalcij i vitamin D. Liječnik će Vam reći koliko kalcija i vitamina D trebate uzimati svakoga dana. Teriparatid Zentiva se može primjenjivati s hranom ili bez nje.

Ako primijenite više lijeka Teriparatid Zentiva nego što ste trebali

Ako ste greškom primijenili više lijeka Teriparatid Zentiva nego što ste trebali, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Očekivani učinci predoziranja mogu biti mučnina, povraćanje, omaglica i glavobolja.

Ako ste zaboravili ili ne možete primijeniti Teriparatid Zentiva u uobičajeno vrijeme, primijenite ga što prije istoga dana. Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. U istom danu ne smijete primijeniti više od jedne injekcije. Nemojte pokušati nadoknaditi propuštenu dozu.

Ako prestanete primjenjivati Teriparatid Zentiva

Ako razmišljate o prekidu liječenja lijekom Teriparatid Zentiva, razgovarajte o tome sa svojim liječnikom. Liječnik će Vas savjetovati i odlučiti koliko dugo se trebate liječiti lijekom Teriparatid Zentiva.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najčešće nuspojave su bol u udovima (vrlo često, može se javiti u više od 1 na 10 osoba) te mučnina, glavobolja i omaglica (često). Ako osjetite omaglicu (ošamućenost) nakon injekcije, sjednite ili legnite dok se ne budete osjećali bolje. Ako se ne osjećate bolje, nazovite liječnika prije nego nastavite liječenje. Prijavljeni su slučajevi nesvjestice povezani s primjenom lijeka Teriparatid Zentiva.

Ako osjetite neugodu, poput crvenila kože, boli, oticanja, svrbeža, nastanka modrica ili blagog krvarenja oko mjesta injiciranja (često), te bi se nuspojave trebale povući za nekoliko dana ili tjedana. Ako se ne povuku, obratite se liječniku što je prije moguće.

U nekih su se bolesnika ubrzo nakon injekcije pojavile alergijske reakcije, koje su uključivale nedostatak zraka, oticanje lica, osip i bol u prsnom košu (rijetko). U rijetkim se slučajevima mogu pojaviti ozbiljne alergijske reakcije koje mogu biti opasne po život, uključujući anafilaksiju.

Ostale nuspojave uključuju:

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

- povišene razine kolesterola u krvi
- depresija
- neuralgična bol u nozi
- nesvjestica
- nepravilno kucanje srca
- zaduha
- pojačano znojenje
- grčevi mišića
- nedostatak energije
- umor
- bol u prsištu
- nizak krvni tlak
- žgaravica (bol ili pečenje neposredno ispod prsne kosti)
- povraćanje
- kila jednjaka (cijevi kojom se hrana prenosi u želudac)
- niska razina hemoglobina ili malen broj crvenih krvnih stanica (anemija).

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

- ubrzano kucanje srca
- neuobičajen zvuk srca
- nedostatak daha
- hemoroidi
- nehotično ispuštanje mokraće
- pojačan nagon na mokrenje
- porast tjelesne težine
- bubrežni kamenci
- bol u mišićima i zglobovima. U nekih su se bolesnika pojavili jaki grčevi ili bolovi u leđima, koje je trebalo liječiti u bolnici.
- povišene razine kalcija u krvi
- povišene razine mokraćne kiseline u krvi
- povišene razine enzima koji se zove alkalna fosfataza

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

- smanjena bubrežna funkcija, uključujući zatajenje bubrega
- oticanje, uglavnom šaka, stopala i nogu

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Teriparatid Zentiva

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i brizgalici iza oznake 'EXP'. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Brizgalicu zatvorite s zatvaračem nakon upotrebe (zbog osjetljivosti otopine za injekciju na svjetlost). Teriparatid Zentiva se uvijek mora čuvati u hladnjaku (od 2°C do 8°C). Teriparatid Zentiva se može primjenjivati najdulje 28 dana nakon prve injekcije ako se brizgalica čuva u hladnjaku (2°C do 8°C).

Nemojte zamrzavati Teriparatid Zentiva. Pazite da brizgalicu ne stavljate blizu zamrzivača u hladnjaku da se ne bi zamrzнула. Teriparatid Zentiva se ne smije upotrijebiti ako je zamrznut ili je bio zamrznut.

Svaku brizgalicu morate na odgovarajući način zbrinuti nakon 28 dana, čak i ako nije potpuno prazna.

Teriparatid Zentiva sadrži bistru i bezbojnu otopinu. Teriparatid Zentiva se ne smije primijeniti ako sadrži čvrste čestice ili je otopina zamućena ili obojana.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Teriparatid Zentiva sadrži

- Djelatna tvar je teriparatid. Svaki ml otopine za injekciju sadrži 250 mikrograma teriparatida.
- Drugi sastojci su ledena acetatna kiselina, bezvodni natrijev acetat, manitol, metakrezol i voda za injekcije. Osim toga, za podešavanje pH može biti dodana otopina kloridne kiseline i/ili natrijevog hidroksida.

Kako Teriparatid Zentiva izgleda i sadržaj pakiranja

Teriparatid Zentiva je bezbojna i bistra otopina. Dostupan je u ulošku koji se nalazi u napunjenoj brizgalici za jednokratnu uporabu. Jedna brizgalica sadrži 2,4 ml otopine, što je dovoljno za 28 doza. Brizgalice su dostupne u kutijama koje sadrže 1 ili 3 brizgalice. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
102 37 Prag 10
Češka

Proizvođač

GP-PHARM, S.A.
Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C-244, Km 22
08777 Sant Quintí de Mediona
Španjolska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Zentiva d.o.o.

Av. V. Holjevca 40

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 6641 830

PV-Croatia@zentiva.com

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Njemačka	Teriparatid Alvogen 20 Mikrogramm/80 Mikroliter Injektionslosung im Fertigpen
Hrvatska	Teriparatid Zentiva 20 mikrograma/80 mikrolitara otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici
Mađarska	Teriparatid Zentiva 20 mikrogramm/80 mikroliter oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
Island	Teriparatid Zentiva 20/80 mikróg/ml stungulyf, lausn í áfylltum lyfjapenna
Rumunjska	Teriparatid Labormed 20 micrograme/80 microlitri soluție injectabilă în stilou injector preumplut
Danska	Teriparatid Zentiva
Švedska	Teriparatid Zentiva

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji put revidirana u svibnju 2022.


PRIRUČNIK ZA KORISNIKE BRIZGALICE

Priručnik za korisnike Upute za primjenu

Dijelovi brizgalice

Teriparatid Zentiva je lijek koji se isporučuje u brizgalici. Brizgalica sadrži količinu lijeka za jednu injekciju dnevno, za 28 uzastopnih dana.

Koristite novu iglu za svaku injekciju. Igle nisu priložene uz brizgalicu.



1. zatvarač brizgalice
2. uložak s lijekom
3. naljepnica
4. prozorčić s prikazom doze
5. kotačić za doziranje
6. aktivator doze
7. veliki vanjski štitnik igle
8. mali unutarnji štitnik igle
9. igla
10. pokrovna folija

Radi Vaše sigurnosti

Važne informacije

- Pročitajte upute za primjenu u potpunosti. Pažljivo slijedite sve upute.
- Pročitajte uputu o lijeku priloženu uz brizgalicu.
- U slučaju bilo kakvih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili njegovatelju.

Prevenција zaraznih bolesti

- Ne dijelite svoju brizgalicu s drugima jer postoji rizik od prijenosa zaraznih bolesti.
- Koristite novu sterilnu iglu za svaku injekciju. Korištene igle predstavljaju rizik od prenošenja zaraznih bolesti.

Korištenje brizgalice

- Provjerite naljepnicu na brizgalici prilikom vađenja brizgalice iz hladnjaka. Budite sigurni da koristite pravi lijek.
- Provjerite rok valjanosti, nemojte koristiti brizgalicu u slučaju da je istekao rok valjanosti.
- Provjerite lijek: mora biti bistar, bezbojan i bez čestica.
- Nemojte prebacivati lijek u štrcaljku. Teriparatid Zentiva mora se primijeniti samo s ovom brizgalicom.
- Ne koristite brizgalicu za više od 28 injekcija. Zabilježite prvi dan injiciranja u Dnevnik primjene injekcija u nastavku. Izračunajte datum za 28. injekciju pomoću kalendara i zabilježite taj datum u Dnevnik primjene injekcija.
- Ne preporučuje se da slijepe ili slabovidne osobe primjenjuju brizgalicu bez pomoći osobe koja je obučena za pravilno korištenje brizgalice.

Čuvanje

- Brizgalicu čuvajte u hladnjaku, najbolje u vratima hladnjaka.
- Brizgalicu i igle čuvajte izvan dohvata djece.

Rješavanje problema

- Ako imate problem s injekcijom, nemojte ponavljati injiciranje isti dan.
- Pročitajte odlomak "Što ako..." u ovom priručniku.
- Nemojte koristiti brizgalicu ako je oštećena.
- Koristite brizgalicu samo ako je lijek bistar, bezbojan i bez čestica.
- Ako ne možete sami riješiti problem ili niste sigurni, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili njegovatelju.

Priprema brizgalice prije prve primjene

Prije PRVE injekcije, brizgalicu treba pripremiti kao što je ovdje opisano.


Ovaj korak treba napraviti samo jednom. NE trebate ponavljati ovaj postupak za drugu i svaku sljedeću injekciju.

Pričvrščivanje igle


1. Uklonite zatvarač brizgalice.
2. Uzmite novu iglu i uklonite pokrovnu foliju s vanjskog štitnika igle.



3. Pričvrstite iglu s velikim vanjskim štitnikom na brizgalicu. Okrenite veliki vanjski štitnik igle u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.




4. Uklonite veliki vanjski štitnik igle i spremite ga za kasniju uporabu.




Namještanje doze


5. Okrenite kotačić za doziranje dok se ne zaustavi. Provjerite je li vrijednost "80" u potpunosti vidljiva i centrirana u prozorčiću s prikazom doze, a bijela oznaka poravnata s urezom na prozorčiću.



6. Uklonite mali unutarnji štitnik igle i odložite ga.



7. Brizgalicu okrenite s iglom prema gore. Pritisnite aktivator doze do zaustavljanja i zadržite 5 sekundi (pogledati sliku u nastavku). Tekućinu koja je izašla, pobrišite maramicom.



8. Potvrdite dozu. Provjerite je li vrijednost "0" u potpunosti vidljiva i centrirana u prozorčiću s prikazom doze, a bijela oznaka poravnata s urezom na prozorčiću te jesu li otisnute oznake aktivatora doze i tijelo brizgalice poravnati.



Uklanjanje igle

Izvadite iglu nakon pripreme brizgalice jer ona predstavlja rizik od kontaminacije.

9. Pažljivo umetnite iglu u veliki vanjski štitnik igle kojeg ste sačuvali (pogledajte sliku u nastavku). Ne dirajte iglu kako biste spriječili ubod igle.



10. Odvijte iglu okretanjem velikog vanjskog štitnika u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite iglu iz brizgalice.



11. Odložite iglu sa štitnikom u sigurni spremnik za igle koji možete nabaviti u ljekarni ili kod njegovatelja.

Vođenje Dnevnika primjene injekcija

12. Zabilježite trenutni datum i datum 28. injekcije u Dnevnik primjene injekcija na kraju ovog priručnika.

Sada je Vaša brizgalica pripremljena za prvu i sve daljnje injekcije, kako je opisano u sljedećem poglavlju.

Injektiranje lijeka Teriparatid Zentiva

Pripremite se za injekciju

- Prije svake injekcije operite ruke.
- Pripremite mjesto injiciranja (bedro ili trbuh) prema uputama liječnika, ljekarnika ili njegovatelja.


Koristite novu iglu za svaku injekciju jer je nova igla oštra i omogućuje gotovo bezbolnu injekciju. Korištena igla predstavlja rizik od začepljenja igle ili kontaminacije.

Pričvršćivanje igle


1. Uklonite zatvarač brizgalice.
2. Uzmite novu iglu i uklonite pokrovnu foliju s vanjskog štitnika igle.



3. Pričvrstite iglu s velikim vanjskim štitnikom na brizgalicu. Okrenite veliki vanjski štitnik igle u smjeru kazaljke na satu dok se ne zaustavi.




4. Uklonite veliki vanjski štitnik igle i spremite ga za kasniju uporabu.




Namještanje doze

5. Okrenite kotačić za doziranje dok se zaustavi. Provjerite je li vrijednost "80" u potpunosti vidljiva i centrirana u prozorčiću s prikazom doze, a bijela oznaka poravnata s urezom na prozorčiću.




6. Uklonite mali unutarnji štitnik igle i odložite ga.




7. Nježno držite nabor kože ili trbuha.

8. Umetnite iglu na pripremljeno mjesto ubrizgavanja, po mogućnosti pod kutom od 90 stupnjeva. Pritisnite aktivator doze dok se ne zaustavi i držite 5 sekundi. Polako brojite do 5.



9. Izvucite iglu iz kože.




10. Potvrdite dozu. Provjerite je li vrijednost "0" u potpunosti vidljiva i centrirana u prozorčiću s prikazom doze, a bijela oznaka poravnata s urezom na prozorčiću te jesu li otisnute oznake aktivatora doze i tijelo brizgalice poravnati.



Uklanjanje igle

Uvijek izvadite iglu odmah nakon uporabe brizgalice.

11. Pažljivo umetnite iglu u veliki vanjski štitnik igle kojeg ste sačuvali. Ne dirajte iglu kako biste spriječili ubod igle.



12. Odvijte iglu okretanjem velikog vanjskog štitnika u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i izvucite iglu iz brizgalice.



13. Odložite iglu sa štitnikom u sigurni spremnik za igle koji možete nabaviti u ljekarni ili kod njegovatelja.

14. Vratite zatvarač brizgalice na brizgalicu.

Čuvanje brizgalice

Nemojte čuvati brizgalicu s pričvršćenom iglom. To može uzrokovati pojavu mjehurića zraka u ulošku lijeka. Brizgalicu uvijek zatvorite sa zatvaračem brizgalice.

Brizgalicu vadite iz hladnjaka samo kada je trebate upotrijebiti. Brizgalicu čuvajte u hladnjaku, najbolje u vratima hladnjaka. Ne čuvajte brizgalicu pored stražnjeg zida hladnjaka ili u zamrzivaču. Lijek postaje neupotrebljiv ako se smrzne.

U slučaju da Vaša brizgalica nije bila pohranjena u hladnjaku duže vrijeme, ne biste je trebali baciti. Stavite brizgalicu u hladnjak i obratite se svom liječniku, ljekarniku ili njegovatelju.

Zbrinjavanje brizgalice

Brizgalica se mora zbrinuti na dan zadnje injekcije (vidjeti Dnevnik primjene injekcija). Brizgalicu zbrinite čak i u slučaju preostalog lijeka u ulošku.

Brizgalicu odložite prema uputama liječnika ili ljekarnika.

Stavite zatvarač brizgalice na brizgalicu prije zbrinjavanja. Ne zbrinjavajte brizgalicu s pričvršćenom iglom.

Što ako...

U ulošku lijeka nalaze se mjehurići zraka: bez brige možete koristiti brizgalicu.

Prilikom pripreme brizgalice za prvu uporabu, lijek nije izašao iz brizgalice: ponovite korake kao što je opisano u „Namještanje doze“ (korak 5).

Aktivator doze je blokiran ili imate dojam da niste injicirali punu dozu: Nemojte primijeniti drugu injekciju istog dana. Nastavite s redovnom injekcijom sljedeći dan. Obavezno okrenite kotačić za doziranje do zaustavljanja, vrijednost "80" mora biti potpuno vidljiva i centrirana u prozorčiću s prikazom doze, a bijela oznaka poravnata s urezom na prozorčiću.

Dnevnik primjene injekcija		
Datum prve injekcije: Proizvođač: GP-PHARM, S.A. Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C-244, Km 22 08777 Sant Quintí de Mediona Španjolska Datum zadnje injekcije:	dan 1	
	dan 2	
	dan 3	
	dan 4	
	dan 5	
	dan 6	
	dan 7	
	dan 8	
	dan 9	
	dan 10	
	dan 11	
	dan 12	
	dan 13	
	dan 14	
	dan 15	
	dan 16	
	dan 17	
	dan 18	
	dan 19	
	dan 20	
	dan 21	
	dan 22	
	dan 23	
	dan 24	
	dan 25	
	dan 26	
	dan 27	
	dan 28	

Ovaj priručnik za korisnike zadnji put je ažuriran u rujnu 2020.