

## Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

### Tikagrelor Abdi 90 mg filmom obložene tablete tikagrelor

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Tikagrelor Abdi i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tikagrelor Abdi
3. Kako uzimati Tikagrelor Abdi
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tikagrelor Abdi
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

## 1. Što je Tikagrelor Abdi i za što se koristi

### Što je Tikagrelor Abdi

Tikagrelor Abdi sadrži djelatnu tvar koja se naziva tikagrelor. Pripada skupini lijekova koji se zovu antitrombotici.

### Za što se Tikagrelor Abdi koristi

Tikagrelor Abdi, u kombinaciji s acetilsalicilatnom kiselinom (još jednim antitrombocitnim lijekom), primjenjuje se samo kod odraslih. Dobili ste ovaj lijek zato što ste imali:

- srčani udar, ili
- nestabilnu anginu (anginu ili bol u prsnoj koži koja nije dobro kontrolirana).

Tikagrelor Abdi smanjuje vjerojatnost drugog srčanog, moždanog udara ili smrti uslijed bolesti povezane s Vašim srcem ili krvnim žilama.

### Kako Tikagrelor Abdi djeluje

Tikagrelor Abdi djeluje na stanice koje se nazivaju krvne pločice (ili trombociti). Ove vrlo male krvne stanice pomažu u zaustavljanju krvarenja tako što se nakupljaju kako bi začepile sitne rupe na krvnim žilama koje su oštećene ili porezane.

Međutim, krvne pločice također mogu stvoriti krvne ugruške u oboljelim krvnim žilama srca ili mozga. To može biti vrlo opasno iz sljedećih razloga:

- ugrušak može zaustaviti dotok krvi u potpunosti; to može uzrokovati srčani udar (infarkt miokarda) ili moždani udar, ili
- ugrušak može djelomično blokirati krvne žile koje vode do srca; to smanjuje protok krvi prema srcu i može izazvati prolaznu bol u prsnoj koži (koja se naziva „nestabilna angina“).

Tikagrelor Abdi pomaže u sprječavanju nakupljanja krvnih pločica, što smanjuje mogućnost stvaranja krvnog ugruška koji može dovesti do smanjenog protoka krvi.

## 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Tikagrelor Abdi

### Nemojte uzimati Tikagrelor Abdi:

- ako ste alergični na tikagrelor ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- ako trenutno krvarite.

- ako ste imali moždani udar izazvan krvarenjem u mozgu.
- ako imate tešku bolest jetre.
- ako uzimate bilo koji od ovih lijekova:
  - ketokonazol (za liječenje gljivičnih infekcija),
  - klaritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija),
  - nefazodon (antidepresiv),
  - ritonavir i atazanavir (za liječenje infekcije HIV-om i SIDA-e).

Nemojte uzimati Tikagrelor Abdi ukoliko se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

### **Upozorenja i mjere opreza**

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Tikagrelor Abdi ako:

- Imate povećani rizik od krvarenja zbog:
  - nedavne ozbiljne ozljede
  - nedavne operacije (uključujući i zahvate kod zubara, upitajte o tome svog zubara)
  - ako imate neko stanje koje utječe na zgrušavanje krvi
  - ako ste nedavno imali krvarenje u želucu ili crijevima (na primjer, zbog čira u želucu ili polipa na debelom crijevu)
- Ako trebate imati operaciju (uključujući i zahvate kod zubara) u bilo koje vrijeme dok uzimate Tikagrelor Abdi. Ovo se odnosi na povećani rizik od krvarenja. Vaš će liječnik možda htjeti da prestanete uzimati ovaj lijek 5 dana prije operacije.
- Ako je Vaš puls neuobičajeno nizak (obično niži od 60 otkucaja u minuti) a nemate već ugrađen uređaj koji stimulira rad srca (elektrostimulator).
- Ako imate astmu ili druge probleme s plućima ili teškoće pri disanju.
- Ako razvijete oblike nepravilnog disanja kao što su ubrzano disanje, usporeno disanje ili kratke pauze u disanju. Vaš liječnik će odlučiti ukoliko trebate dodatnu procjenu.
- Ako ste ikada imali problema s jetrom ili ste prethodno patili od bolesti koja je mogla utjecati na Vašu jetru.
- Ako ste na krvnim pretragama imali vrijednosti mokraćne kiseline više od uobičajenih.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se odnosi na Vas), obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

Ako istodobno uzimate Tikagrelor Abdi i heparin:

- Ako Vaš liječnik posumnja na rijedak poremećaj trombocita uzrokovan heparinom, možda će mu trebati uzorak Vaše krvi za dijagnostičke pretrage. Važno je da kažete svom liječniku da uzimate i Tikagrelor Abdi i heparin, jer Tikagrelor Abdi može utjecati na nalaze dijagnostičkog testa.

### **Djeca i adolescenti**

Tikagrelor Abdi se ne preporučuje za djecu i adolescente u dobi ispod 18 godina.

### **Drugi lijekovi i Tikagrelor Abdi**

Obavijestite liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Razlog tomu je što Tikagrelor Abdi može utjecati na način djelovanja drugih lijekova, a i neki drugi lijekovi mogu utjecati na Tikagrelor Abdi.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

- rosuvastatin (lijek za liječenje visokog kolesterola)
- više od 40 mg dnevno simvastatina ili lovastatina (lijekovi za liječenje visokog kolesterola)
- rifampicin (antibiotik),
- fenitoin, karbamazepin i fenobarbital (za kontrolu epileptičkih napadaja),
- digoksin (za liječenje zatajenja srca),
- ciklosporin (za smanjenje obrane Vašeg organizma),
- kinidin i diltiazem (za liječenje poremećaja srčanog ritma),
- beta blokatore i verapamil (za liječenje visokog krvnog tlaka),
- morfij i druge opioide (za liječenje teške boli).

Svakako obavijestite svog liječnika ili ljekarniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova koji povećavaju rizik od krvarenja:

- „oralne antikoagulanse“, često se nazivaju lijekovima „za razrjeđivanje krvi“, što uključuje varfarin.
- nesteroidne protuupalne lijekove (skraćeno NSAIL) kao što su lijekovi protiv bolova poput ibuprofena i naproksena.
- selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (skraćeno SSRI) koji se uzimaju kao antidepresivi, kao što su paroksetin, sertralin i citalopram.
- druge lijekove kao što su ketokonazol (za liječenje gljivičnih infekcija), klaritromicin (za liječenje bakterijskih infekcija), nefazodon (antidepresiv), ritonavir i atazanavir (koristi se za liječenje infekcije HIV-om i SIDA-e), cisaprid (za liječenje žgaravice), ergot alkaloida (za liječenje migrena i glavobolja).

Također obavijestite svog liječnika da ste zbog uzimanja lijeka Tikagrelor Abdi izloženi većem riziku od krvarenja, ako Vam liječnik propiše fibrinolitike (koji se često nazivaju lijekovima „koji otapaju ugruške“ kao što su streptokinaza ili alteplaza).

### **Trudnoća i dojenje**

Ne preporučuje se uzimanje lijeka Tikagrelor Abdi ako ste trudni ili planirate imati dijete. Tijekom uzimanja ovog lijeka, žene trebaju koristiti odgovarajuću kontracepcijsku zaštitu kako bi izbjegle trudnoću.

Ako dojite, prije uzimanja ovog lijeka razgovarajte sa svojim liječnikom. Vaš liječnik će Vam objasniti koristi i rizike od uzimanja lijeka Tikagrelor Abdi tijekom razdoblja dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

### **Upravljanje vozilima i strojevima**

Nije vjerojatno da Tikagrelor Abdi utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima. Ukoliko osjetite omaglicu ili smetenost tijekom uzimanja ovog lijeka, budite oprezni tijekom vožnje ili rada sa strojevima.

### **Sadržaj natrija**

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po dozi, tj. zanemarive količine natrija.

## **3. Kako uzimati Tikagrelor Abdi**

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

### **Koliko lijeka treba uzeti**

- Početna doza je dvije tablete u isto vrijeme (udarna doza od 180 mg). Ovu ćete dozu obično primiti u bolnici.
- Nakon ove početne doze uobičajena je doza jedna tableta od 90 mg dva puta dnevno kroz najviše 12 mjeseci, osim ako liječnik drugačije ne propiše.
- Uzimajte ovaj lijek otprilike u isto vrijeme svakog dana (primjerice, jednu tabletu ujutro i jednu navečer).

### **Uzimanje lijeka Tikagrelor Abdi s drugim lijekovima koji sprječavaju zgrušavanje krvi**

Liječnik će Vam obično reći da uzimate i acetilsalicilatnu kiselinu. Ova je tvar prisutna u mnogim lijekovima koji sprječavaju zgrušavanje krvi. Liječnik će Vam reći koju dozu trebate uzimati (obično između 75-150 mg dnevno).

### **Kako uzimati Tikagrelor Abdi**

- Tablet u možete uzimati s hranom ili bez nje.
- Možete provjeriti kada ste zadnji put uzeli tabletu lijeka Tikagrelor Abdi tako da pogledate na

blister. Jutro je označeno simbolom sunca, a večer simbolom mjeseca. To će Vam pokazati jeste li uzeli dozu.

#### **Ukoliko imate problema sa gutanjem tablete**

Ukoliko imate problema sa gutanjem tablete možete je zdrobiti i pomiješati sa vodom na sljedeći način:

- Zdrobite tabletu u fini prašak
- Naspite prašak u pola čaše vode
- Promućkajte i odmah popijte
- Kako biste bili sigurni da nema zaostalog lijeka, isperite praznu čašu sa još pola čaše vode i to popijte

Ako ste u bolnici, ovu tabletu možete dobiti pomješanu s malo vode putem cijevi kroz nos (nazogastrična cijev).

#### **Ako uzmete više lijeka Tikagrelor Abdi nego što ste trebali**

Ako ste uzeli veću dozu lijeka Tikagrelor Abdi nego što Vam je liječnik propisao, posavjetujte se s liječnikom ili odmah otidite u bolnicu. Uzmite pakiranje lijeka sa sobom. Mogli biste biti izloženi povećanom riziku od krvarenja.

#### **Ako ste zaboravili uzeti Tikagrelor Abdi**

- Ako ste zaboravili uzeti dozu, samo uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
- Nemojte uzimati dvostruku dozu (dvije doze u isto vrijeme) kako biste nadomjestili zaboravljenu dozu.

#### **Ako prestanete uzimati Tikagrelor Abdi**

Nemojte prestati uzimati Tikagrelor Abdi bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Uzimajte ovaj lijek redovito i onoliko dugo koliko Vam ga liječnik propisuje. Ukoliko prestanete uzimati Tikagrelor Abdi, to može povećati vjerojatnost za još jedan srčani ili moždani udar ili rizik od smrti zbog bolesti povezanih s Vašim srcem i krvnim žilama.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

## **4. Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Pri uzimanju ovog lijeka moguće su sljedeće nuspojave:

Tikagrelor Abdi utječe na zgrušavanje krvi, stoga je većina nuspojava povezana s krvarenjem. Do krvarenja može doći u bilo kojem dijelu tijela. Neka krvarenja su česta (poput stvaranja modrica ili krvarenja iz nosa). Teško krvarenje je manje često, ali može biti opasno po život.

**Odmah se javite liječniku ako primijetite bilo što od dolje navedenog - možda Vam je potrebno hitno medicinsko liječenje:**

- **Krvarenje u mozgu ili unutar lubanje manje je česta nuspojava, a može uzrokovati znakove moždanog udara kao što su:**
  - iznenadna utrnulost ili slabost ruke, noge ili lica, osobito ako se pojavi samo na jednoj strani tijela
  - iznenadna smetenost, poteškoće pri govoru ili razumijevanju drugih
  - iznenadne teškoće u hodanju, gubitak ravnoteže ili koordinacije
  - iznenadan osjećaj omaglice ili iznenadna jaka glavobolja bez poznatog uzroka
- **Znakovi krvarenja poput:**
  - teško krvarenje ili krvarenje koje ne možete kontrolirati
  - neočekivano ili dugotrajno krvarenje
  - urin roze, crvene ili smeđe boje
  - povraćanje crvene krvi ili Vaš sadržaj povraćanja izgleda kao „mljevena kava“

- crvena ili crna stolica (izgleda kao katran)
- iskašljavanje ili povraćanje krvnih ugrušaka
- **Nesvjestica (sinkopa)**
  - privremeni gubitak svijesti zbog iznenadnog smanjenja dotoka krvi u mozak (često)
- **Znakovi poteškoća u zgrušavanju krvi nazvani trombotična trombocitopenična purpura (TTP) poput:**
  - vrućica i crvene točkice na koži ili u ustima (purpura), sa ili bez žute boje kože ili očiju (žutica), neobjašnjivog teškog umora ili smetenosti

**Ako primijetite bilo što od dolje navedenog, razgovarajte s liječnikom:**

- **Nedostatak zraka – vrlo česta nuspojava.** Razlog tomu može biti Vaša srčana bolest ili drugi uzrok, ili može biti nuspojava lijeka Tikagrelor Abdi. Nedostatak zraka povezan s lijekom Tikagrelor Abdi općenito je blaga nuspojava za koju je karakteristična iznenadna, neočekivana glad za zrakom, koja se obično javlja u mirovanju i može se javiti u prvim tjednima liječenja te nestati nakon dužeg vremena. Ako se osjećaj nedostatka zraka pogorša ili ako traje dulje vrijeme, recite to liječniku. Vaš će liječnik odlučiti trebate li liječenje ili daljnje pretrage.

**Druge moguće nuspojave**

**Vrlo često (može se javiti u više od 1 na 10 osoba)**

- Visoka razina mokraćne kiseline u Vašoj krvi (kako se vidi na pretragama)
- Krvarenje uzrokovano poremećajima krvi

**Često (može se javiti u do 1 na 10 osoba)**

- Modrice
- Glavobolja
- Osjećaj omaglice ili osjećaj da se soba okreće
- Proljev ili probavne tegobe
- Mučnina
- Zatvor
- Osip
- Svrbež
- Jaka bol i oticanje Vaših zglobova – ovo su znakovi gihta
- Osjećaj omaglice ili ošamućenosti, ili zamućen vid – ovo su znakovi niskog krvnog tlaka
- Krvarenje iz nosa
- Krvarenje nakon operacije ili iz posjekotina (na primjer tijekom brijanja) i rana više od normalnog
- Krvarenje iz sluznice želuca (čira)
- Krvarenje desni

**Manje često (može se javiti u do 1 na 100 osoba)**

- Alergijske reakcije – osip, svrbež, oticanje lica ili oticanje usana/jezika mogu biti znakovi alergijske reakcije
- Smetenost
- Smetnje vida uzrokovane krvi u Vašem oku
- Vaginalno krvarenje koje je obilnije ili se događa izvan normalnog menstrualnog ciklusa
- Krvarenje u Vaše zglobove i mišiće koje uzrokuje bolno oticanje
- Krv u uhu
- Unutarnje krvarenje, koje može uzrokovati omaglicu ili ošamućenost

**Prijavljivanje nuspojave**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojave: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojave možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

<b>H A L M E D</b> 28 - 03 - 2022 <b>ODOBRENO</b>
---

## 5. Kako čuvati Tikagrelor Abdi

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP“. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### Što Tikagrelor Abdi sadrži

- Djelatna tvar je tikagrelor. Jedna filmom obložena tableta sadrži 90 mg tikagrelora.
- Drugi sastojci su:  
*Jezgra tablete:* manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; umrežena karmelozanatrij; hidroksipropilceluloza (E463); etanol (96-postotni); manitol granule; koloidni, bezvodni silicijev dioksid; magnezijev stearat (E470b).

*Film ovojnica tablete:* titanijev dioksid (E171); (makrogol (PEG), HPMC2910/hipromeloza (E464); žuti željezov oksid (E172); talk.

### Kako Tikagrelor Abdi izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložena tableta (tableta): okrugle, bikonveksne, svijetlo žute filmom obložene tablete, s utisnutom oznakom „ $\frac{9}{T}$ “ s jedne strane, s druge strane bez oznake.

Tikagrelor Abdi je dostupan u blisterima s 14, 56, 60, 100 i 168 tableta, u kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

#### Nositelj odobrenja:

ABDI FARMA, Unipessoal Lda  
Quinta da Fonte, Rua dos Malhães,  
Edifício D. Pedro I  
2770-071 Paço de Arcos,  
Portugal

#### Proizvođači:

Interpharma Services Ltd.  
43A Cherni Vrach Blvd. Sofia 1407  
Bugarska

Flavine Pharma France  
3 Voie d'Allemagne,  
13127 Vitrolles,  
Francuska

Pharmadox Healthcare Ltd.  
1. KW20A Kordin Industrial Park,  
Paola PLA3000, 2. Warehouse  
No.1 and No.2, Hal Farrug Road,  
Luqa LQA9040,  
Malta

**Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku**

Alpha-Medical d.o.o.

Dragutina Golika 36

10000 Zagreb

[alpha-medical@alpha-medical.hr](mailto:alpha-medical@alpha-medical.hr)

**Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:**

Portugal Ticagrelor Abdi

Malta Ticagrelor Abdi 60 mg film coated tablets

Ticagrelor Abdi 90 mg film coated tablets

**Način i mjesto izdavanja lijeka**

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2022.**