

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Tyrosur 1 mg/g gel

tirotricin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 7 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Tyrosur gel i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur gel
3. Kako primjenjivati Tyrosur gel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Tyrosur gel
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Tyrosur gel i za što se koristi

Tyrosur gel je lokalni antibiotik. Sadrži djelatnu tvar tirotricin.

Tyrosur gel koristi se za liječenje manjih, površinskih, umjereno vlažnih rana.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Tyrosur gel

Nemojte primjenjivati Tyrosur gel

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
- na sluznicu nosa.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite Tyrosur gel.

Pri nanošenju u blizini očiju, gel ne smije doći u dodir s očima jer može izazvati osjećaj peckanja.

Drugi lijekovi i Tyrosur gel

Nisu poznati lijekovi koji utječu na djelotvornost Tyrosur gela. Tyrosur gel ne utječe na djelotvornost drugih lijekova.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nema podataka o sigurnosti korištenja Tyrosur gela tijekom trudnoće. Na osnovi ograničenih studija na životinjama nije zaključeno postoji li potencijalni rizik za ljude. Stoga se, Tyrosur gel ne smije koristiti tijekom trudnoće.

Nije poznato izlučuju li se tirotricin ili cetilpiridinijev klorid (sastavni dijelovi Tyrosur gela) u majčino mlijeko. Stoga se, Tyrosur gel ne smije koristiti tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Tyrosur gel sadrži propilenglikol koji može izazvati iritaciju kože.

3. Kako primjenjivati Tyrosur gel

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ako Vaš liječnik nije drukčije propisao, preporučena doza je:

Tyrosur gel nanosi se dva ili tri puta dnevno u dovoljnoj količini da potpuno prekrije ozlijeđene dijelove kože.

Način primjene

Nanošenje na kožu.

Gel se nanosi ujutro (ili sredinom dana) i navečer u dovoljnoj količini kako bi se pokrila područja kože koja se žele liječiti. Ako je potrebno, može se prekriti zavojem.

Kako dugo smijete primjenjivati Tyrosur gel

Trajanje liječenja ovisi o ozbiljnosti i tijeku kliničkog stanja. Ako se simptomi pogoršaju ili ako nema promjene tijekom tjedan dana, morate se obratiti svom liječniku.

Ako mislite da je učinak Tyrosur gela previše jak ili previše slab, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako primijenite više Tyrosur gela nego što ste trebali

Ne očekuju se nikakve posljedice. Nastavite liječenje kao što je gore opisano. Ako su, unatoč tome, prisutni neobični simptomi, obratite se svom liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Tyrosur gel

Nastavite s liječenjem kao što je gore opisano.

Ako prestanete primjenjivati Tyrosur gel

Ako ste prekinuli liječenje Tyrosur gelom, nećete postići željeni terapijski učinak.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Vrlo rijetko, u manje od 1 na 10 000 liječenih bolesnika, lijek može uzrokovati alergijske reakcije na koži, poput peckanja kože.

Ako nastupe alergijske reakcije, nemojte dalje koristiti Tyrosur gel. U tom slučaju obratite se svom liječniku.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: **navedenog u [Dodatku V](#)**.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Tyrosur gel

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i tubi. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Nakon prvog otvaranja Tyrosur gel se može koristiti šest mjeseci.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Tyrosur gel sadrži

- Djelatna tvar je tirotricin.
- 1 g gela sadrži 1 mg tirotricina.
100 g gela sadrži 0,1 g tirotricina.
- Drugi sastojci su cetilpiridinijev klorid, propilenglikol, etanol (96 postotni), karbomeri, trometamol, pročišćena voda.

Kako Tyrosur gel izgleda i sadržaj pakiranja

Bezbojni, opalescentni, viskozni gel blagog mirisa na alkohol.

Tyrosur gel dostupan je u pakiranju od 5 g u aluminijskoj tubi s plastičnim zatvaračem, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Salveo d.o.o.

Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Proizvođač

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG

Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u travnju 2024.