

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Nixar 6 mg/ml kapi za oko, otopina

bilastin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Nixar i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nixar
3. Kako primjenjivati Nixar
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Nixar
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nixar i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži bilastin, koji pripada skupini lijekova koji se zovu antihistaminici. Antihistaminici djeluju zaustavljajući učinke tvari koja se zove histamin kojeg organizam proizvodi u alergijskim reakcijama.

Ovaj lijek se koristi za liječenje znakova i simptoma poremećaja očiju koji se pojavljuju u slučaju **sezonskog alergijskog konjunktivitisa** u odraslih.

Ovaj lijek se koristi i za liječenje znakova i simptoma poremećaja očiju prouzročenih alergijom na tvari kao što su kućna prašina ili životinjska dlaka (**cjelogodišnji alergijski konjunktivitis**) u odraslih.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Nixar

Nemojte primjenjivati Nixar

- ako ste alergični na bilastin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Nixar ako se tijekom liječenja pojave nuspojave kao što su iritacija oka, bol, crvenilo oka ili promjene vida, ili ako je Vaše stanje lošije. Možda će biti potrebno prekinuti liječenje.

Nakon kapanja Nixar antialergijskih kapi za oči u konjunktivalnu vrećicu oka, oštrina vida se može pogoršati tijekom nekoliko minuta zbog stvaranja prugastog zamućenja.

U slučaju upale, uključujući alergijski konjunktivitis, pitajte Vašeg oftalmologa možete li upotrebljavati kontaktne leće unatoč simptomima.

Djeca i adolescenti

Nixar je indiciran samo u odraslih.

Nemojte dati ovaj lijek djeci i adolescentima jer djelotvornost i sigurnost u tim populacijama nije još ispitivana.

Drugi lijekovi i Nixar

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ako uzimate druge lijekove za primjenu u oko, ostavite razmak od barem 5 minuta između svakog lijeka. Masti za oči treba primijeniti posljednje.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Nixar se može uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nakon primjene ovog lijeka može doći do prolaznog zamućenja vida ili drugih poremećaja vida, što može utjecati na sposobnost upravljanja vozilom ili rada na strojevima. Pričekajte dok Vam se vid ne razbistri prije nego upravljate vozilima ili strojevima.

Kontaktne leće

Primjena ovog lijeka ne utječe na svojstva kontaktnih leća. Možete nastaviti nositi kontaktne leće tijekom primjene ovog lijeka.

Uklonite kontaktne leće prije primjene lijeka i ponovno ih stavite najmanje 15 minuta nakon primjene kapi za oko.

3. Kako primjenjivati Nixar

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.


Preporučena doza za odrasle je jedna kap u svako zahvaćeno oko jednom dnevno.

Ovaj lijek se može koristiti do 8 tjedana. Vaš će liječnik odlučiti i savjetovati Vam koliko dugo trebate koristiti lijek ovisno o Vašem stanju.

Samo za primjenu u oko.

Način primjene

1. Prije primjene ovog lijeka prvo uvijek operite ruke i osušite ih čistim ručnikom.
2. Nježno očistite vjeđe ukoliko je prisutan osušeni iscjedak iz očiju, brišući vjeđu od unutarnjeg do vanjskog ruba, držeći oči zatvorenima i koristeći pamučnu vaticu umočenu u toplu vodu.
3. Otvorite bočicu i izbjegavajte dodir vrha kapaljke s okom ili bilo čim drugim – kapi za oči i kapaljke moraju biti održavane čistim.
4. Nagnite glavu unazad ili ležite, gledajte prema gore (slika 1). Prstom lagano povucite donju vjeđu prema dolje (slika 2).
5. Gledajte gore i ukapajte jednu kap u oko.
6. Otpustite donju vjeđu i držite oko zatvoreno neko vrijeme kako bi kapljica pokrila cijelu površinu oka (slika 3).
7. Ponovite isto na drugom oku ako je potrebno.



Kako bi se izbjegla kontaminacija tijekom primjene ovog lijeka, nemojte dirati bilo koju površinu (vjeđe, područja oko očiju, ili druge površine) vrhom kapaljke, i nakon primjene očistite vrh kapaljke čistom tkaninom kako biste odstranili ostatak tekućine.

Ako primijenite više Nixara nego što ste trebali

Možete ga isprati toplom vodom.

Ako ste zaboravili primijeniti Nixar

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako zaboravite primijeniti kapi na vrijeme, primijenite zaboravljenu kap čim bude moguće, a zatim nastavite primjenu po uobičajenom rasporedu.

Ako prestanete primjenjivati Nixar

Liječenje ovim lijekom treba biti redovito ako je moguće, sve do nestanka simptoma. Ako prestanete primjenjivati Nixar dok ste još izloženi alergenima, možete očekivati da će se tipični alergijski simptomi vratiti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prijavljene su sljedeće nuspojave:

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

Poremećen osjet okusa (disgeuzija), glavobolja.

Suho oko, iscjedak iz oka, iritacija oka, pojačano stvaranje suza, nelagoda u oku.

Ako se pojavi neka od navedenih nuspojava, prestanite primjenjivati ovaj lijek i odmah se savjetujte sa svojim liječnikom. Navedene nuspojave su obično blage i uvijek brzo prestanu. Stoga nisu potrebne posebne mjere.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nixar

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na naljepnici ili kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nakon prvog otvaranja bočice: nemojte primjenjivati ovaj lijek ako je bočica bila otvorena dulje od 2 mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nixar sadrži

- Djelatna tvar je bilastin 6 mg/ml
Jedna kap sadrži 0,2 mg bilastina
- Druge pomoćne tvari su hidroksipropil- β -ciklodekstrin, metilceluloza, natrijev hijaluronat, glicerol (E 422), natrijev hidroksid 1 N (za prilagodbu pH), voda za injekcije

Kako Nixar izgleda i sadržaj pakiranja

Nixar kapi su bistre, bezbojne kapi za oko, u višedoznoj LDPE bijeloj bočici koja sadrži 5 ml otopine bez konzervansa, s bijelom HDPE kapaljkom s poklopcem s obručem za evidenciju otvaranja.

Veličine pakiranja: 1 bočica x 5 ml.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1, Avenue de la Gare
L-1611 Luksemburg
Luksemburg

Proizvođač

Famar Health Care Services Madrid S.A.U.
Avenida de Leganés 62
28923 Alcorcón
Španjolska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o., Horvatova 80/A, 10 020 Zagreb
Tel: 01/4821361

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Austrija: Olisir 6 mg/ml Augentropfen, Lösung
Belgija: Bellozal 6 mg/ml eye drops, solution
Hrvatska: Nixar 6 mg/ml kapi za oko, otopina
Cipar: Bilaz 6mg/ml οφθαλμικές σταγόνες
Češka Republika: Xados
Estonija: Opexa
Francuska: Bilaska 6 mg/ml collyre en solution
Njemačka: Bilaxten 6 mg/ml Augentropfen, Lösung
Grčka: Bilaz
Mađarska: Lendin 6 mg/ml szemcsepp

Irska: Drynol 6 mg/ml eye drops, solution
Italija: Olisir 6 mg/ml collirio, soluzione
Latvija: Opexa 6 mg/ml acu pilieni, šķīdums
Litva: Opexa 6 mg/ml akių lašai, tirpalas
Luksemburg: Bellozal 6 mg/ml eye drops, solution
Malta: Gosall 6 mg/ml eye drops, solution
Poljska: Clatra
Portugal: Lergonix 6 mg/ml colírio, solução
Rumunjska: Borenar 6 mg/ml picături oftalmice, soluție
Slovačka Republika: Omarit 6 mg/ml očné roztokové kvapky
Slovenija: Bilador 6 mg/ml kapljice za oko, raztopina
Španjolska: Ibis 6 mg/ml colirio en solució

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u kolovozu 2022.