

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Veinofytol želučanootporne tablete

Suhi ekstrakt divljeg kestena
što odgovara 21 mg triterpenskih glikozida, izračunato kao protoescigenin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije, ili ako Veinofytol trebate koristiti više od 8 tjedana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Veinofytol i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Veinofytol
3. Kako uzimati Veinofytol
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Veinofytol
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Veinofytol i za što se koristi

Veinofytol je biljni lijek koji sadrži suhi ekstrakt divljeg kestena.

Veinofytol se primjenjuje za liječenje kronične venske insuficijencije, čiji znakovi su otekle noge, varikozne vene, osjećaj težine, boli, umora, svrbeži, napetosti i grčeva u potkoljenicama.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Veinofytol

Nemojte uzimati Veinofytol

- ako ste alergični na divlji kesten ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Veinofytol.

- Ako se pojavi upala kože, tromboflebitis ili potkožno otvrdnuće, jaka bol, čirevi, iznenadno oticanje jedne ili obje noge, srčano ili bubrežno zatajenje, morate se posavjetovati s liječnikom.

Ako se simptomi pogoršaju ili se tijekom primjene ovog lijeka pojave znakovi kožne infekcije, morate se posavjetovati s liječnikom ili ljekarnikom.

Uzimanje Veinofytola ne zamjenjuje druge preventivne mjere liječenja, kao što je npr. tuširanje hladnom vodom ili nošenje kompresijskih čarapa, ako je tako propisao liječnik.

Obavezno se obratite liječniku ako Veinofytol trebate koristiti više od 8 tjedana za liječenje kronične bolesti vena.

Djeca i adolescenti

Nema relevantne primjene u djece mlađe od 12 godina.

Primjena u adolescenata mlađih od 18 godina se ne preporuča zbog nedostatka podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Drugi lijekovi i Veinofytol

Nema prijavljenih interakcija. Nisu provedena ispitivanja interakcija.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Veinofytol s hranom i pićem

Nije primjenjivo.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zbog nedostatka podataka dostupnih za Veinofytol vezano za primjenu suhog ekstrakta sjemenki divljeg kestena tijekom trudnoće i dojenja, primjena ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja nije preporučena. Nema podataka o utjecaju na plodnost.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega/jetre

Nisu dostupni podaci prema kojima bi se mogla dati uputa za doziranje u slučaju oštećene funkcije bubrega i/ili jetre.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu provedena ispitivanja utjecaja na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Veinofytol sadrži azo bojilo Allura Red AC (E129)

Ovaj lijek sadrži azo bojilo Allura Red AC (E129), koje može uzrokovati alergijske reakcije.

Veinofytol sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Veinofytol

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli

Preporučena doza za odrasle je 1 tableta dva puta dnevno.

Progutajte tablete uz veliku čašu vode.

Da bi se uočio povoljan učinak može biti potrebno najmanje 4 tjedna terapije.

Ako se Vaši simptomi pogoršaju ili ne poprave nakon 8 tjedana, obratite se liječniku.

U slučaju dugotrajne primjene, liječenje povremeno treba procijeniti liječnik.

Ako uzmete više Veinofytola nego što ste trebali

Odmah se obratite liječniku, ljekarniku ili centru za kontrolu otrovanja.

Ako ste zaboravili uzeti Veinofytol

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. **Moguće nuspojave**

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

S nepoznatom učestalošću prijavljene su probavne tegobe, glavobolja, vrtoglavica, svrbež i alergijske reakcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. **Kako čuvati Veinofytol**

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati u originalnom pakiranju.

Lijek ne zahtijeva čuvanje na određenoj temperaturi.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. **Sadržaj pakiranja i druge informacije**

Što Veinofytol sadrži

- Djelatna tvar je suhi ekstrakt divljeg kestena.
Svaka tableta sadrži 192 mg - 258 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) sjemenki divljeg kestena (*Aesculus hippocastanum* L.), što odgovara 21 mg triterpenskih glikozida, izračunatao kao protoescigenin.
Ekstrakcijsko otapalo: etanol 50 % V/V.
- Drugi sastojci su:
Jezgra tablete: maltodekstrin, mikrokristalična celuloza, bezvodni kalcijev hidrogenfosfat, prethodno geliran škrob, talk, bezvodni koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat.
Ovojnica: kopolimer metakrilatne kiseline, talk, trietilcitrat, titanijev dioksid (E171), Allura Red AC (E129), bezvodni koloidni silicijev dioksid, natrijev hidrogenkarbonat, natrijev laurilsulfat.
Pomoćne tvari korištene u ekstraktu: maltodekstrin, bezvodni koloidni silicijev dioksid.

Kako Veinofytol izgleda i sadržaj pakiranja

Veinofytol želučanootporne tablete su crvene, duguljaste i bikonveksne, dimenzija 18 x 8 mm. Dolaze u blisterima u kutijama od 42 ili 98 tableta ili u blisterima s jediničnim dozama u kutijama od 100 x 1 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Tilman s.a., Zone D'activites Sud 15, 5377 Somme-Leuze, Namur, Belgija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Salveo d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb
Tel: 01/562 2000

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora i Ujedinjenoj Kraljevini (Sjevernoj Irskoj) pod sljedećim nazivima:

Belgija	VEINOFYTOL comprimés gastrorésistants
Cipar	VEINOFYTOL
Francuska	Veinotil comprimés gastrorésistants
Grčka	VEINOFYTOL
Hrvatska	Veinofytol želučanootporne tablete
Luksemburg	VEINOFYTOL comprimés gastrorésistants
Malta	VEINOFYTOL gastro-resistant tablets
Njemačka	Veinofytol magensaftresistente Tabletten
Poljska	Veinofytil
Portugal	VENOFYTOL comprimidos gastrorresistentes
Španjolska	VEINOFYTOL COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni

Ova uputa je zadnji puta revidirana u prosincu 2023.