

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

Ventringo 8 mg tablete
Ventringo 16 mg tablete
Ventringo 24 mg tablete
betahistindiklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi

1. Što je Ventringo i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ventringo
3. Kako uzimati Ventringo
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Ventringo
6. Sadržaj pakiranja i ostale informacije

1. Što je Ventringo i za što se koristi

Ventringo sadrži djelatnu tvar betahistin. Ovaj lijek naziva se analogom histamina. Koristi se za liječenje vrtoglavice (vertiga), zvonjave u ušima (tinitus) te gubitka sluha u ljudi s Ménièreovom bolesti te osjećaja vrtoglavice (vertiga) koja nastaje radi nepravilnog rada dijela unutarnjeg uha koji kontrolira vašu ravnotežu (nazvan „vestibularni vertigo“).

Ovaj lijek djeluje tako da poboljšava protoka krvi u unutarnjem uhu. To smanjuje nakupljanje pritiska.

2. Što morate znati prije nego uzmete Ventringo

Nemojte uzimati Ventringo

- ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate povišeni krvni tlak zbog tumora nadbubrežne žlijezde (feokromocitom)

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas, nemojte uzimati ovaj lijek i razgovarajte sa svojim liječnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Ventringo:

- ako imate vrijed na želucu
- ako imate astmu (vaš će liječnik možda htjeti pratiti vašu astmu dok uzimate Ventringo)
- ako ste trudni ili planirati zatrudnjati
- ako dojite.

Ako se nešto od navedenog odnosi na vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka. Vaš liječnik će vam reći da li je sigurno nastaviti uzimati ovaj lijek.

Djeca i adolescenti

Ventringo se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 18 godina zbog nedovoljnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Drugi lijekovi i Ventringo

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Posebice obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate sljedeće lijekove:

- antihistaminike - jer oni mogu (teoretski) smanjiti učinak lijeka Ventringo. Isto tako, Ventringo može smanjiti učinak antihistaminika.
- inhibitore monoaminoooksidaze (MAOI) - koji se koriste za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti. Oni mogu povećati izloženost lijeku Ventringo.

Ventringo s hranom

Možete uzeti Ventringo s hranom ili bez nje. Međutim, Ventringo može uzrokovati blage želučane probleme (pogledajte dio 4). Uzimanje lijeka Ventringo s hranom može smanjiti želučanu nelagodu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati Ventringo ako ste trudni osim ako vaš liječnik ne odredi da je to neophodno. Obratite se liječniku za savjet.

Nemojte dojit dok uzimate Ventringo osim ako to nije odobrio vaš liječnik. Nije poznato izlučuje li se Ventringo u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će Ventringo utjecati na sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima. Međutim, ne zaboravite da bolesti koje liječite s lijekom Ventringo (vrtoglavica, šum u ušima i gubitak sluha povezani s Ménièreovim sindromom) mogu uzrokovati omaglicu ili mučninu što može utjecati na vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

3. Kako uzimati Ventringo

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Odrasli (uključujući i starije osobe):

Lijek Ventringo je dostupan u tri jačine: 8 mg, 16 mg i 24 mg tablete. Uobičajena doza je:

- Ventringo 8 mg tablete - jedna ili dvije tablete tri puta na dan.
- Ventringo 16 mg tablete - pola ili jedna tableta tri puta na dan.
- Ventringo 24 mg tablete - jedna tableta dva puta na dan.

Vaš liječnik može prilagoditi dozu ovisno o vašem odgovoru na terapiju.

Djeca i adolescenti

Ventringo se ne preporučuje za primjenu u djece mlađe od 18 godina zbog nedovoljnih podataka o sigurnosti i djelotvornosti.

Stariji bolesnici te osobe s oštećenjem jetre ili bubrega

Nije potrebna prilagodba doze.

Kako uzimati Ventringo

Progutajte tabletu s čašom vode. Tablet u možete uzeti s hranom ili bez nje. Međutim, s obzirom da Ventringo može uzrokovati blage želučane smetnje (vidjeti dio 4), uzimanje lijeka Ventringo s hranom može smanjiti te tegobe.

Ako uzimate više od 1 tablete svaki dan, raspodijelite tablete podjednako kroz dan. Primjerice, uzmite jednu tabletu ujutro i jednu uvečer.

Tablete treba uzimati svaki dan u isto vrijeme. Na taj će način u vašem tijelu biti stalna količina lijeka te će vam to također pomoći da se sjetite uzeti tabletu.

Nastavite uzimati vaše tablete. Možda će biti potrebno neko vrijeme da lijek Ventringo počne djelovati.

Ventringo 16 mg tablete: Tableta se može razdijeliti na jednake doze.

Ventringo 24 mg tablete: Urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu.

Ako uzmete više lijeka Ventringo nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Ventringo nego što ste trebali, možete osjećati mučninu, pospanost ili bol u trbuhu. Ako ste vi ili netko drugi uzeli previše ovog lijeka (predoziranje), obratite se odmah svom liječniku ili se uputite u najbližu bolnicu. Uzmite pakiranje lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Ventringo

Ako ste propustili uzeti tabletu, pričekajte do vremena uzimanja sljedeće doze. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati lijek Ventringo

Nastavite uzimati tablete sve dok vam liječnik ne kaže da prestanete. Nemojte prestati uzimati lijek Ventringo bez razgovora sa svojim liječnikom, čak i ako se osjećate bolje. Vaš liječnik će možda željeti da nastavite uzimati tablete neko vrijeme kako bi se uvjerio da lijek u potpunosti djeluje.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Sljedeće ozbiljne nuspojave mogu se pojaviti kada uzimate lijek Ventringo:

- teške alergijske reakcije čiji simptomi mogu biti crveni ili kvrgavi osip na koži ili upaljena koža sa svrbežom, oticanje lica, usana, jezika ili vrata, pad krvnog tlaka, gubitak svijesti te poteškoće s disanjem.

Ako se pojavi bilo koja od tih nuspojava, **prestanite uzimati** ovaj lijek bez odlaganja i obratite se svom liječniku.

Ostale nuspojave:

Često (mogu se javiti u do 1 na 10 osoba):

- mučnina
- loša probava (dispepsija)
- glavobolja.

Nepoznato (učestalost se ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

- Blage želučane tegobe poput povraćanja, boli u trbuhu, rastezanja i nadimanja trbuha. Uzimanje lijeka Ventringo s hranom može pomoći smanjiti bilo koje želučane probleme.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V](#). Prijavlivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ventringo

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ventringo sadrži

- Djelatna tvar je betahistindiklorid.
Jedna tableta lijeka Ventringo od 8 mg sadrži 8 mg betahistindiklorida.
Jedna tableta lijeka Ventringo od 16 mg sadrži 16 mg betahistindiklorida.
Jedna tableta lijeka Ventringo od 24 mg sadrži 24 mg betahistindiklorida.
- Drugi sastojci su mikrokristalična celuloza (PH102), manitol (E421), talk (E553b), citratna kiselina (E330), bezvodni, koloidni silicijev dioksid.

Kako Ventringo izgleda i sadržaj pakiranja

Ventringo 8 mg tablete: bijele, okrugle tablete (približnog promjera 7,00 mm), ravne s ukošenim rubom, bez oznaka na obje strane.

Ventringo 16 mg tablete: bijele, okrugle (približnog promjera 8,70 mm), bikonveksne neobložene tablete s urezom na jednoj strani i utisnutom oznakom „I“ te bez ureza na drugoj strani.

Ventringo 24 mg tablete: bijele, okrugle (približnog promjera 10,00 mm), bikonveksne neobložene tablete s urezom na jednoj strani i s utisnutim oznakama „II“ s obje strane ureza te bez ureza na drugoj strani.

Ventringo 8 mg tablete dostupne su u kartonskim kutijama s blisterima (PVC/ACLAR(PCTFE)//Al i PVC/PVDC//Al) koji sadrže 100 tableta.

Ventringo 16 mg tablete dostupne su u kartonskim kutijama s blisterima (PVC/ACLAR(PCTFE)//Al i PVC/PVDC//Al) koji sadrže 48, 60 i 100 tableta.

Ventringo 24 mg tablete dostupne su u kartonskim kutijama s blisterima (PVC/ACLAR(PCTFE)//Al i PVC/PVDC//Al) koji sadrže 32, 60 i 100 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

PharmaS d.o.o.
Radnička cesta 47
10000 Zagreb

Proizvođači

Emona Biopharma d.o.o
WTC, Dunajska cesta 156
1000 Ljubljana
Slovenija

Terapia SA
Str. Fabricii nr. 124
Cluj-Napoca
Rumunjska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Hrvatska	Ventringo 8 mg tablete
	Ventringo 16 mg tablete
	Ventringo 24 mg tablete
Poljska	Verticontrol, 8 mg, tabletki
	Verticontrol, 16 mg, tabletki
	Verticontrol, 24 mg, tabletki
Rumunjska	Diclorhidrat de betahistină Terapia 8 mg comprimate
	Diclorhidrat de betahistină Terapia 16 mg comprimate
	Diclorhidrat de betahistină Terapia 24 mg comprimate

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2026.