

## Uputa o lijeku: Informacija za korisnika

### Viranti 5% štapić za kožu aciclovir

**Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.**

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije u bilo koje vrijeme liječenja.

#### Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Viranti i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Viranti
3. Kako primjenjivati Viranti
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Viranti
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

#### 1. Što je Viranti i za što se koristi

Viranti je namijenjen za liječenje „groznice“ (infekcija usana i lica uzrokovanih herpes simpleks virusom) u odraslih i djece. Djelatna tvar je aciklovir koji pripada skupini antivirusnih lijekova. Primijenite s prvim znakovima nastanka „groznice“ (kao što su peckanje i svrbež). Može se također upotrebljavati kako bi se ubrzalo zacjeljivanje već postojeće „groznice“.

#### 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Viranti

##### Nemojte primjenjivati Viranti

- ako ste alergični na aciklovir, valaciclovir ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (navedeni u dijelu 6.)
- u unutrašnjosti usta
- za liječenje čireva u ustima
- u očima ili genitalnim područjima.

##### Upozorenja i mjere opreza

- Izbjegavajte nepotrebno trljanje inficiranog područja ili dodirivanje ručnikom kako biste spriječili prenošenje ili pogoršanje infekcije.
- Ako Vam je liječnik rekao da imate oslabljen imunološki sustav, posavjetujte se s njim prije početka liječenja bilo kakve infekcije.
- Ako niste sigurni imate li „groznicu“, posavjetujte se s liječnikom.
- Ako simptomi postanu veoma teški, posavjetujte se s liječnikom.

##### Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

**Viranti sadrži ricinusovo ulje** koje može uzrokovati kožne reakcije.

**Viranti sadrži butilhidroksitoluen** koji može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis) ili iritacije očiju i sluznica.

### 3. Kako primjenjivati Viranti

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Viranti je namijenjen za primjenu na kožu.

#### Prilagođeno za sve uzraste:

- Primijenite za pojave prvih znakova „groznice“ (poput peckanja i svrbeži). Liječenje se također može započeti u kasnijim fazama.
- Primijenite obilato na zahvaćeno područje 5 puta dnevno, u približnim intervalima od četiri sata, izbjegavajući noćnu primjenu.
- Nastavite liječenje tijekom najmanje 4 dana. Ako „groznica“ ne zacijeli do tada, možete nastaviti primjenjivati štapić za kožu do ukupno 10 dana.
- Liječite „groznicu“ najmanje 4 dana da bi osigurali ubrzano liječenje.
- Ako ste zaboravili primijeniti lijek, učinite to čim se sjetite i nastavite kao dosad.
- Ako „groznica“ nije zacijelila nakon 10 dana, ili ako se pogoršala, javite se liječniku.
- Nemojte davati svoj Viranti drugima, čak i kada su njihovi simptomi jednaki kao i Vaši.
- Količina u štapiću za kožu u ovom pakiranju dovoljna je za liječenje jedne infekcije. U slučaju budućih infekcija liječenje započnite kod pojave prvih znakova (poput peckanja i svrbeži). Liječenje također može započeti za vrijeme faze mjehurića.
- Ne koristite više od preporučene doze.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

### 4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Prestanite primjenjivati lijeka i recite svom liječniku ako osjetite:

- reakcije slične alergijskima, npr. oticanje usana, lica i očnih kapaka.

Sljedeće nuspojave se također mogu javiti:

- prolazno pečenje ili žarenje nakon primjene. Ovo će brzo prestati.
- crvenilo, svrbež ili blago sušenje ili ljuštenje kože, osip, svrbež ili koprivnjača.

#### **Prijavljivanje nuspojava**

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

### 5. Kako čuvati Viranti

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i štapiću iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.  
Nakon otvaranja, upotrijebiti u roku od 90 dana.

Nikada nemojte nikakve lijekove baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

## 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

### Što Viranti sadrži

- Djelatna tvar je aciklovir, a 1 g štapića za kožu sadrži 50 mg aciklovira (5%).
- Drugi sastojci su: ricinusovo ulje, polusintetični gliceridi, karnauba vosak, pčelinji vosak, oktildodekanol, bijeli vazelin, okus vanilije, butilhidroksitoluen (E321).

### Kako Viranti izgleda i sadržaj pakiranja

Viranti 5% štapić za kožu je cilindrična, bijela do svijetlo žuta masa, blago parfimirana. Nalazi se u polistirenskom štapiću s odvijačem od acetalne smole i zatvoren kapicom.

*Pakiranje:* 1 štapić za kožu u kartonskoj kutiji.

### Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Zentiva, k.s.  
U Kabelovny 130  
102 37 Prag 10  
Češka

### Proizvođač

Laboratorio Chimico Farmaceutico A. SELLA SRL  
Via Vicenza, 67  
36015 SCHIO (Vicenza)  
Italija

### Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

PharmaS d.o.o.,  
Radnička cesta 47,  
10000 Zagreb

### Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim nazivima:

Portugal	Viranti 50 mg/g Lapis cutâneo
Hrvatska	Viranti 5% štapić za kožu
Rumunjska	Viranti 50 mg/g creion cutanat

### Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

**Ova uputa je zadnji put revidirana u prosincu 2023.**