

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Viviton 1000 mg filmom obložene tablete

diosmin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Viviton i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Viviton
3. Kako uzimati Viviton
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Viviton
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Viviton i za što se koristi

Kako djeluje Viviton:

Diosmin, djelatna tvar u lijeku Viviton, djeluje stabilizirajući kapilare. Djelatna tvar u lijeku Viviton utječe na funkcioniranje vena i štiti vene; povećava tonus vena i otpornost kapilara. Djelatna tvar u lijeku Viviton smanjuje pojavu otekline, a također ima protuupalni učinak na krvne žile.

Viviton se koristi u odraslih osoba za liječenje sljedećih stanja:

- ublažavanje simptoma povezanih s kroničnom venskom bolešću donjih udova, poput napetosti, osjećaja težine u nogama, oticanja, boli i grčeva u listovima tijekom noći.
- liječenje simptoma povezanih s akutnom hemoroidalnom bolešću, poput boli, krvarenja i otekline u analnom području.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Viviton

Nemojte uzimati Viviton

- ako ste alergični na diosmin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Viviton.

Djelotvornost i sigurnost ovog lijeka nisu ispitane u sljedećim skupinama/stanjima.

Obratite se svom liječniku za savjet prije primjene ovog lijeka u:

- bolesnika s oštećenjem funkcije jetre,
- bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega.

Kronična venska bolest nogu

Ako se Vaše stanje pogorša tijekom liječenja ili osjetite neuobičajeno teške simptome, poput oticanja jedne ili obje noge, promjene boje kože, osjećaja napetosti ili topline te boli ili čireva na koži, odmah se obratite svom liječniku.

Ovaj lijek nije učinkovit u smanjenju oticanja donjih udova uzrokovanog bolešću srca, bubrega ili jetre.

HALMED
24 - 07 - 2025
ODOBRENO

U liječenju kronične venske bolesti, najbolji učinak postiže se uz pomoć odgovarajućih mjera načina života. Treba izbjegavati sunčanje, dugotrajno stajanje i prekomjernu tjelesnu težinu. Šetnje i nošenje posebnih kompresijskih čarapa mogu poboljšati cirkulaciju krvi u nogama.

Akutna hemoroidalna bolest

Primjena lijeka Viviton za liječenje akutnih simptoma hemoroida je samo kratkotrajna i ne isključuje liječenje drugih analnih poremećaja.

Ako se vaše stanje pogorša tijekom liječenja ili ako primijetite pojačano krvarenje iz rektuma, krv u stolici ili sumnjate na krvarenje hemoroida, odmah se obratite svom liječniku. Liječenje ovim lijekom nije zamjena za specifično liječenje drugih analnih poremećaja.

Djeca i adolescenti

Ne preporučuje se primjena lijeka Viviton 1000 mg filmom obloženih tableta u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka.

Drugi lijekovi i Viviton

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

To je osobito važno ako istodobno uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku:

- diklofenak (koristi se za ublažavanje boli)
- metronidazol (koristi se za liječenje infekcija).

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Kao mjera opreza, preporučuje se izbjegavati primjenu ovog lijeka tijekom trudnoće.

Ovaj lijek nije preporučen za primjenu u dojlja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Viviton ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima.

Viviton sadrži natrij

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po filmom obloženoj tableti, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati Viviton

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza za odrasle:

- Za kroničnu vensku bolest donjih udova: 1 filmom obložena tableta dnevno, uzeti ujutro, uz obrok. Preporučeno minimalno trajanje liječenja je najmanje 4-5 tjedana.
- Akutna hemoroidalna bolest: 1 filmom obložena tableta 3 puta dnevno (ujutro, u podne i navečer, svaki puta po 1 filmom obložena tableta) tijekom prva 4 dana, a zatim 1 filmom obložena tableta dvaput dnevno (ujutro i navečer, svaki puta po 1 filmom obložena tableta) tijekom naredna 3 dana. Nakon toga, doza održavanja je 1 filmom obložena tableta dnevno. Tablete treba uzimati uz obrok.

Trajanje liječenja:

Što se tiče trajanja liječenja, Vaš liječnik će odrediti vrstu bolesti od koje bolujete i odrediti koliko dugo trebate uzimati Viviton.

Primjena u djece i adolescenata:

Primjena lijeka Viviton 1000 mg filmom obložene tablete se ne preporučuje u djece i adolescenata mlađih od 18 godina zbog nedostatka podataka.

Posebne populacije

Nema izravnih kliničkih podataka o sigurnosti vezanih uz primjenu ovog proizvoda u bolesnika s oštećenjem jetre i bubrega.

Ako uzmete više Viviton tableta nego što ste trebali

Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Viviton

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu filmom obloženu tabletu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

- mučnina, povraćanje, proljev, probavne tegobe.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

- upala debelog crijeva.

Rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

- glavobolja, omaglica, malaksalost, osip, svrbež, koprivnjača.

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):

- izolirano oticanje (edem) lica, usana i kapaka povezano s alergijskim reakcijama; iznimno se može pojaviti i takozvani Quinkeov edem (brzo nastupajuće oticanje lica, usana, usne šupljine, jezika ili grkljana što može dovesti do otežanog disanja);
- bolovi u trbuhu.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: [navedenog u Dodatku V.](#)

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Viviton

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Viviton sadrži

- Djelatna tvar je 1000 mg mikroniziranog diosmina u jednoj filmom obloženoj tableti.
- Drugi sastojci su poli(vinilni alkohol), umrežena karmelozanatrij, bezvodni talk, koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, Opadry II 85 F82874 žuta (poli(vinilni alkohol) (E1203), titanijev dioksid (E171), makrogol (E1521), talk (E553b), žuti željezov oksid (E172)).

Kako Viviton izgleda i sadržaj pakiranja

Duguljaste, žute, bikonveksne filmom obložene tablete s urezom na obje strane. Duljina filmom obložene tablete je 19,2 mm, širina 9,2 mm, a visina 7,8 mm. Na presjeku filmom obloženih tableta je sivkasto žuta ili bež, bijelo mramorirana.

Urez na filmom obloženim tabletama služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

20, 30, 60, 90, 120 ili 180 filmom obloženih tableta u prozirnim, bezbojnim PVC/PVdC//Al blisterima i kutiji.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berlin
Njemačka

Proizvođač

MEDITOP Gyógyszeripari Kft.
2097 Pilisborosjenő
Ady Endre u. 1.
Mađarska

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.
Horvatova 80/A
10020 Zagreb
Tel: + 385 1 4821 361

Ovaj lijek odobren je u državama članicama Europskog gospodarskog prostora pod sljedećim nazivima:

Mađarska	Proctec 1000 mg filmtabletta
Bugarska	Лиосмин 1000 mg филмирани таблети
Češka	Ziton
Estonija	Viviton
Litva	Liosmin 1000 mg plėvele dengtos tabletės
Latvija	Viviton 1000 mg apvalkotās tabletes
Slovačka	Ziton 1000 mg

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2025.