

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Xyzal 5 mg filmom obložene tablete

levocetirizindiklorid

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
- Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Xyzal i za što se koristi
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Xyzal
3. Kako uzimati Xyzal
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Xyzal
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Xyzal i za što se koristi

Djelatna tvar u lijeku Xyzal je levocetirizindiklorid.
Xyzal je antialergijski lijek.

Koristi se za liječenje znakova bolesti (simptoma) povezanih s:

- alergijskim rinitisom (uključujući cjelogodišnji alergijski rinitis);
- koprivnjačom (urtikarija).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Xyzal

Nemojte uzimati Xyzal

- ako ste alergični na levocetirizin, hidroksizin, cetirizin, druge lijekove derivate piperazina ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ako imate bubrežnu bolest koja zahtijeva dijalizu.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Xyzal.

Primjena lijeka Xyzal ne preporučuje se u djece mlađe od 6 godina budući da filmom obložene tablete nisu prikladne za prilagodbu doze.

Ako postoji mogućnost da nećete moći isprazniti mjehur (vezano uz stanja poput ozljede leđne moždine ili povećane prostate) obratite se za savjet svom liječniku.

Ako bolujete od epilepsije ili kod Vas postoji rizik od konvulzija, obratite se svom liječniku jer ovaj lijek može uzrokovati pogoršanje napadaja.

Ako ste naručeni na kožne testove na alergije, pitajte svoga liječnika trebate li prestati uzimati Xyzal nekoliko dana prije testiranja. Ovaj lijek može utjecati na rezultate kožnih testova na alergiju.

Drugi lijekovi i Xyzal

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Xyzal s hranom, pićem i alkoholom

Preporučuje se oprez kod uzimanja lijeka Xyzal zajedno s alkoholom.

Istodobna primjena cetirizina ili levocetirizina i alkohola ili drugih tvari koje djeluju na središnji živčani sustav može prouzročiti dodatno smanjenje budnosti i radnog učinka.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Primjena lijeka Xyzal u dojilja se ne preporučuje jer se on izlučuje u mlijeku i može štetno utjecati na dojenče. Ukoliko dojite, Vaš liječnik će procijeniti je li Vam potrebno liječenje lijekom Xyzal, te će Vam u tom slučaju preporučiti prestanak dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Neki bolesnici koji uzimaju Xyzal mogu osjetiti jaku pospanost/omamlijenost, umor i iscrpljenost. Budite oprezni dok vozite ili upravljate strojevima dok ne budete znali kako ovaj lijek utječe na Vas. Posebni testovi nisu pokazali smanjenje mentalne budnosti, sposobnosti reagiranja ili sposobnosti za vožnju u zdravih osoba nakon uzimanja levocetirizina u preporučenoj dozi.

Xyzal sadrži laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Xyzal

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje:

Preporučena doza za odrasle i djecu od navršenih 6 godina i stariju je jedna tableteta dnevno.

Upute za doziranje kod posebnih populacija:

Bolesnicima s oštećenom bubrežnom funkcijom može se dati niža doza ovisno o težini bubrežne bolesti, a kod djece dozu će također trebati odrediti temeljem tjelesne težine. Dozu će odrediti Vaš liječnik.

Bolesnici koji imaju tešku bubrežnu bolest koja zahtijeva dijalizu ne smiju uzimati Xyzal.

Bolesnici koji imaju oštećenu samo jetrenu funkciju uzimaju uobičajenu propisanu dozu.

Bolesnici koji imaju oštećenu i jetrenu i bubrežnu funkciju mogu primiti nižu dozu ovisno o težini bubrežne bolesti, a u djece doza se određuje i na osnovi tjelesne težine. Dozu će odrediti Vaš liječnik.

Xyzal se ne preporučuje djeci mlađoj od 6 godina.

Kod starijih bolesnika nije potrebna prilagodba doze ako je njihova bubrežna funkcija normalna.

Kako i kada uzimati Xyzal

Tablete treba progutati cijele s vodom, a mogu se uzeti s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više lijeka Xyzal nego što ste trebali

Ako uzmete više lijeka Xyzal nego što ste trebali može se pojaviti jaka pospanost u odraslih. U djece može u početku doći do uzbudjenosti i nemira praćene jakom pospanošću.

Ako mislite da ste uzeli preveliku dozu lijeka Xyzal, obavijestite svog liječnika koji će odlučiti što učiniti.

Ako ste zaboravili uzeti Xyzal

Ako ste zaboravili uzeti Xyzal, ili ako uzmete nižu dozu od one koju je propisao liječnik, nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Sačekajte vrijeme predviđeno za uzimanje sljedeće doze te uzmete uobičajenu dozu propisanu od Vašeg liječnika.

Ako prestanete uzimati Xyzal

Prekid liječenja lijekom Xyzal prije predviđenog vremena ne bi trebao imati štetne učinke.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Kod prvih znakova reakcije preosjetljivosti, prestanite uzimati Xyzal i odmah se javite liječniku. Simptomi reakcije preosjetljivosti mogu uključivati: oticanje usta, jezika, lica i /ili grla, poteškoće s disanjem ili gutanjem (stezanje u prsima ili piskanje), koprivnjaču, nagli pad krvnog tlaka praćen kolapsom ili šokom koji može biti smrtonosan.

Često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba):
suga usta, glavobolja, umor i jaka pospanost/omamlijenost.

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba):
iscrpljenost i bolovi u trbuhu.

Zabilježene su i druge nuspojave poput osjećaja lutanja srca, ubrzanog pulsa, napadaja, osjećaja trnaca i bockanja, omaglice, kratkotrajnog gubitka svijesti, nevoljnog drhtanja, poremećaja okusa, vrtoglavice (osjećaja zanošenja), poremećaja vida, zamućenog vida, okulogiracije (nekontrolirani kružni pokreti očiju), bolnog ili otežanog mokrenja, nemogućnosti potpunog pražnjenja mjehura, otoka, pruritusa (svrbeža), osipa, urtikarije (oticanje, crvenilo i svrbež kože), izbijanja kožnih promjena, nedostatka zraka, povećanja tjelesne težine, bolova u mišićima, agresivnog ili uznemirenog ponašanja, halucinacije, depresije, nesanice, ponavljajućih misli o ili preokupacije samoubojstvom, noćnih mora, hepatitisa, poremećaja jetrene funkcije, povraćanja, povećanog apetita i mučnine. Nakon prekida liječenja moguć je pruritus (intenzivan svrbež).

Prijavljanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u [Dodatku V](#).

Prijavljanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Xyzal

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji iza oznake „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Xyzal sadrži

- Djelatna tvar je levocetirizindiklorid.
Jedna filmom obložena tableta sadrži 5 mg levocetirizindiklorida.
- Pomoćne tvari su mikrokristalična celuloza, laktosa hidrat, koloidni bezvodni silicijev dioksid, magnezijev stearat, hipromeloza (E464), titanijev dioksid (E171) i makrogol 400.

Kako Xyzal izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete su bijele do prljavo bijele, ovalne, s oznakom Y na jednoj strani, dimenzija 4,5 x 8 mm. Dostupne su u blister pakiranju od 10 i 30 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja

UCB Pharma SA
Allée de la Recherche 60
1070 Anderlecht (Brussels)
Belgija

Proizvođač lijeka

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Italija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medis Adria d.o.o.
Buzinska cesta 58
10 010 Zagreb - Buzin
Tel: +385 (0) 1 230 34 46

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana u srpnju 2023.