

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

neo-angin pastile
2,4-diklorbenzilni alkohol
amilmetakrezol
levomentol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao liječnik ili ljekarnik.

- Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
- Ako trebate dodatne informacije, obratite se svom ljekarniku.
- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
- Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su neo-angin pastile i za što se koriste
2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin pastile
3. Kako uzimati neo-angin pastile
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati neo-angin pastile
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su neo-angin pastile i za što se koriste

neo-angin pastile su antiseptik i blagi analgetik za usta i ždrijelo čije se djelovanje temelji na kombinaciji djelatnih tvari 2,4-diklorbenzilnog alkohola, amilmetakrezola i levomentola.

Lijek je namijenjen za kratkotrajno potpuno liječenje upale sluznice ždrijela praćene tipičnim simptomima kao što su grlobolja, crvenilo ili otečenost.

Namijenjen je za primjenu u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 do 4 dana primjene ovog lijeka.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati neo-angin pastile

Nemojte uzimati neo-angin pastile

- ako ste alergični na djelatne tvari ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
- ukoliko imate astmu i druge bolesti dišnih puteva s osjetljivošću dišnih puteva kod kojih može doći do bronhokonstrikcije zbog ulja paprene metvice i mentola.
- Pastile se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete neo-angin pastile u slučaju prethodnog dugotrajnog kašljanja, iskašljavanja ili promuklosti. Kod ustrajnih simptoma, porasta temperature ili

pogoršanja općeg stanja, potrebno se odmah posavjetovati s liječnikom jer će stanje možda biti potrebno liječiti s drugim lijekovima.

Ako imate žgaravicu ili hijatalnu herniju ponekad može doći do pogoršanja ovih simptoma nakon uzimanja ulja paprene metvice, te je u tom slučaju potrebno prekinuti primjenu ovog lijeka.

Dijabetičari

Lijek neo-angin sadrži 1,14 g glukoze i 1,42 g saharoze u jednoj pastili što odgovara otprilike 10 kcal (42 kJ). Ovo treba uzeti u obzir u bolesnika koji imaju šećernu bolest.

Djeca

Nemojte davati neo-angin pastile djeci mlađoj od 6 godina. Za liječenje neo-angin pastilama, djeca moraju biti u stanju kontrolirano sisati pastile.

Drugi lijekovi i neo-angin pastile

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Interakcije s drugim lijekovima nisu poznate.

neo-angin pastile s hranom i pićem

neo-angin pastile nemojte uzimati neposredno prije i tijekom obroka ili uzimanja tekućine.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Nema dostupnih kliničkih podataka o izlaganju neo-angin pastilama tijekom trudnoće. Ispitivanja na životinjama ne pokazuju da neo-angin pastile izravno ili neizravno štetno djeluju na reprodukciju.

Zbog nedovoljne količine informacija, nije moguće u potpunosti isključiti rizike za nerođeno dijete, pa se stoga ne preporučuje uzimanje ovog lijeka tijekom trudnoće ili dojenja.

Dojenje

Nema dovoljno podataka o izlučivanju djelatnih tvari/metabolita u majčino mlijeko. Stoga se neo-angin ne smije koristiti tijekom dojenja.

Plodnost

Podaci o utjecaju na plodnost nisu dostupni.

Upravljanje vozilima i strojevima

Utjecaj ovog lijeka na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima nije vjerojatan.

neo-angin pastile sadrže boju Ponceau 4R (E124), glukozu i saharozu

Ovaj lijek sadrži boju Ponceau 4R (E124) koja može uzrokovati alergijske reakcije.

Također sadrži 1,14 g glukoze i 1,42 g saharoze po pastili, što odgovara približno 10 kcal (42 kJ). O tome treba voditi računa u bolesnika sa šećernom bolesti. Ako Vam je liječnik rekao da imate poremećaj nepodnošenja nekih šećera, prije uzimanja ovog lijeka posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ovaj lijek može sadržavati sumporni dioksid ili sulfite, što rijetko može uzrokovati teške reakcije preosjetljivosti i bronhospazam.

Boja u ovom lijeku sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po pastili, tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati neo-angin pastile

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je:

Odrasli, adolescenti i djeca starija od 6 godina trebaju polako otopiti jednu pastilu u ustima svakih 2 do 3 sata. Maksimalna dnevna doza je sveukupno 6 pastila.

Ako Vam se simptomi pogoršaju ili ne nastupi poboljšanje u roku od 3 do 4 dana, javite se liječniku.

Ako uzmete više neo-angin pastila nego što ste trebali

Nema prijavljenih slučajeva predoziranja. U slučaju predoziranja, koje je vrlo malo vjerojatno, nuspojave opisane ispod u dijelu 4. mogu se javiti u intenzivnijem obliku te se preporučuje javiti svom liječniku. U tom slučaju preporučuje se simptomatsko liječenje.

Ako ste zaboravili uzeti neo-angin pastile

Nemojte uzeti dvostruku dozu lijeka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Prestanite uzimati neo-angin pastile i odmah se javite svom liječniku ako primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): nadražnost sluznice usta i želuca.

Nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka): mogu se javiti alergijske reakcije poput oticanja usta i jezika.

Dodatne nuspojave u djece

Ulje paprene metvice može uzrokovati grč grkljana u dojenčadi i djece do 2 godine starosti.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u [Dodatku V](#). Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati neo-angin pastile

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvajte na temperaturi ispod 25°C. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekovi baciti u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što neo-angin pastile sadrže

- Djelatne tvari su 2,4-diklorbenzilni alkohol, amilmetakrezol, levomentol.
1 pastila sadrži 1,20 mg 2,4-diklorbenzilnog alkohola; 0,60 mg amilmetakrezola; 5,90 mg levomentola
- Drugi sastojci su: saharoza; glukoza, tekuća; boja Ponceau 4 R (E124) koja sadrži natrij; tartaratna kiselina; eterično ulje zvjezdastog anisa; eterično ulje paprene metvice.

Kako neo-angin pastile izgledaju i sadržaj pakiranja

neo angin pastile su crvene, okrugle, blago bikonveksne, gotovo prozirne pastile.

24 (2x12) pastile u PVC/PVDC//Al blisteru.

48 (4x12) pastila u PVC/PVDC//Al blisteru.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

DIVAPHARMA GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Njemačka

Proizvođač

Klosterfrau Berlin GmbH

Motzener Strasse 41

12277 Berlin

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Clinres farmacija d.o.o.

Srebrnjak 61, 10 000 Zagreb

Hrvatska

Telefon: 01/2396 900

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je posljednji put revidirana u kolovozu 2025.